Der
Feldbau
chemisch untersucht
um ihn
zu seiner letzten Vollkommenheit zu erheben.

Von

G. Christ. Albrecht Rückert

Hofapotheker zu Ingelfingen.

Zweyter Theil.

O fortunatos nimium, sua
si bona norint
Agricolas!

VIRGILIVS.

Erlangen,

bey Johann Jacob Palm. 1789.

Magnalia naturae fere extra vias trifas et orbitas jacent.

Baco de Verulamio.

Vorrede.

Der Beyfall, welchen Männer von längst entschiedenen Verdiensten dem ersten Theil dieses Werkes schenkten, und der Wunsch mehrerer Liebhaber der Landwirthschaft, die vorzüglichsten Arten von Futterkräutern untersucht und den Tabellen des dritten Bandes beygefüget zu sehen, muntert mich auf — damit ich letzterem entsprechen, und des ersteren mich würdig machen konnte — den ersten

Plan beyzubehalten, jede Messe einen Theil erscheinen zu lassen, und dahero das Versprechen des Verlegers, Herrn Palms, auch den dritten Theil diese Messe dem Publikum in die Hände zu geben, zurück zu nehmen.

Bey Uebergebung dieses zweyten Bandes habe ich übrigens nichts zu bemerken, als

Erstlich, die gütigen Leser wegen der in dem ersten Theil vorgefallenen Druckfehler, welche theils die Entlegenheit des Druckorts, theils die Kürze der Zeit, die dem Verleger noch bis zur Ablieferung der Exemplarien übrig war, verursachte, um Nachsicht zu bitten, und dann

Zweytens, eine Uebereilungssünde zu bekennen, die ich im ersten Theil bey Bestimmung des dem Esparsette (Hedysarum Onobrychis L.) zugehörenden Erdreichs, aus folgender Veranlassung begieng.

Noch ehe ich, und dieß wegen dem Aufenthalt, den die Untersuchung der Getreidearten bewirkte, die Zerlegung des Esparsetts, welche ich bis auf die des erdichten Theiles vollendet hatte, zu beendigen im Stande war, nahete die Zeit zur Ablieferung der Manuscripte, die zwar schon über 2 Jahre lang verfertiget da lagen, heran; und ich verweilte, fest überzeugt, daß die genauen mit 5, 6 Gattungen Erdreichs, worinnen ich den Esparsette vorzüglich schön aufwachsen sahe, vorgenommenen Untersuchungen, mich so, wie bishero, allezeit sicher führen würden, die gänzliche Zerlegung desselben vorzunehmen. — Allein wie sehr trügte mich hier nicht das auf der Oberfläche, der an Bergen befindlichen Aecker, aus einer Tiefe von drey Zoll herausgehobene Erdreich! — Einstimmig zeigten mir die noch in Händen habenden Arten desselben, daß Esparsette in einem thonichten von Kalkerde ganz freyem Felde aufs beste gedeyhe, denn in 100 Theilen derselben waren nicht mehr als 1 bis 2 Procent, in Scheidewasser auflösbarer Erdarten vorhanden, und nun im Gegentheil die Untersuchung,

daß Erde die erste und vorzüglichste Nahrung dieses Gewächses seye. Ich fand nehmlich, daß in zwey Pfund grünen Esparsetts, welche 24 Loth Kleeheu, und diese 5 Quint feuerfeste Theile gaben, drey und ein halb Quint in Scheidewasser, völlig auflösbarer von Kieselerde gänzlich freyer Erdarten, und anderthalb Quint fixer wasserfreyer Salze enthalten seyen. Dieser Widerspruch, den die vor Augen liegenden ausgeschiedenen Bestandtheile nothwendig auf meine erstere Meynung machten, veranlaßte mich, nachdem ich die Versuche mit dergleichen Klee, von verschiedenen Gegenden, mehrmals wiederholet hatte, sogleich aus mehreren Wiesen die Erde, so tief als die Wurzeln des Esparsetts giengen, herausgraben zu lassen, und solche dann zu untersuchen.

Hier zeigte sich nun die Ursache meines Irrthums; die Ursachen, warum das Wachsthum dieser so vortreflichen Kleeart in den ersten Jahren, zum Nachtheil der Landwirthschaft, so langsam von statten gehe; warum er nicht in allem und jeder Erd-

reich gedeyhe; warum er öfters da, wo er auch im ersten Jahre sehr schön stehet, in der Folge wieder ausgehet; und warum endlich hier die Anwendung des Gypses vorzüglich nütze, und dort z. B. in unserer Gegend schade?

Meine aus der Tiefe herausgeholten Erden brausten mit Säuren stark, und besaßen 15, 20 Procent in Scheidewasser auflösbarer Erdarten, eine Entdeckung die zwar wichtig, mir selbst aber nicht neu war, und von der ich bereits, nur bey andern Gelegenheiten in dem ökonomischen Journal: Weisheit und Thorheit, Nachricht gab, sie hier aber bey dem Klee ganz und gar nicht in Betrachtung zog. Da ich aus dieser Untersuchung und Erfahrung zu schließen berechtiget war, wenn man den Esparsette in ein Erdreich bringen würde, welches sowohl auf der Oberfläche als in der Tiefe, in der Tiefe von 3, 4 Schuhen, 40, 50, auch mehrere Procent auflösbarer Erdarten besäße, das Wachsthum desselben welches blos wegen dem Mangel an allen der erforderlichen Erdarten im ersten und zweyten Jahr so langsam von statten gehet, außerordentlich und

gleich den übrigen Kleearten seyn müßte, so suchte ich, um mich durch die Erfahrung hiervon zu überzeugen, ein diesen Eigenschaften ganz entsprechendes Erdreich aus, ein Erdreich, welches nach der Prüfung mit Scheidewasser 42 Procent auflösbarer Theile besaß, besäete solches, um allen selbstigen Einwürfen zu entgehen, ohne Beysetzung des geringsten animalischen oder mineralischen Dungs, in der Mitte des May mit Esparsette-Saamen, welchen ich nebst den Saamen von 15ley Arten Futter-Gewächsen, die ich dieses Jahr selbsten zur Untersuchung anbauete, der Gütigkeit des Herrn Senators und Kaufmanns Becks in Göppingen, bey welchem solche ächt und in sehr billigen Preißen zu erhalten sind, zu verdanken hatte, und wartete so die Entscheidung meines Schlußes ab. Der Erfolg war so wie ich ihn erwartete, der Saame gieng auf, umstockte sich stark, und erlangte bis Ende Julius eine Höhe von 18, 20 Zoll, die Blätter selbst waren zweymal so breit als gewöhnlich, so, daß ich kaum bey dem ersten Anschauen sie für Esparsette erkennen wollte. Ich schnitt ihn ab, und ich zweifle nicht, wie dieß

seine gegenwärtige Höhe, welche Anfang Septembris bereits 8 Zoll betrug, mir versichert, ihn nicht noch zweymal zum Schnitt zu bringen.

Da dieses Gewächs bekanntlich größtentheils im ersten Jahre kaum einer Spanne hoch aufwächst, und nur selten in dieser Zeit auch bey stärkerem Wachsthum Nebenäste hervor bringt, welche hier bey dem zweyten Wuchse bereits hin und wieder vorhanden waren, so ist hieraus abzunehmen:

1) Wie nützlich und brauchbar dieses Futtergewächs dem Landmann werden wird, wenn er die, zu dessen Anbau bestimmten Felder mit kalkartigen Stoffen, mit Kalkschutt, Kalk, (gebrannt oder gestossen) Märgel und Schlamm von 50 bis 80 Procenten, Seifen- Pottaschensieder-Asche ꝛc. so stark als möglich, (denn hier kann ein Uebermaas nie schaden) vermischet, und dem aufgewachsenen Esparsette alle 1, 2 Jahre mit Haalbötzig ꝛc. dünget, und

2) wie sehr er das Wachsthum des bereits stehenden Esparsette vermehren könne, wenn er

solchen alljährlich, statt Mist, neben dem angezeigten Dungsalz, mit kalkartigen Stoffen, aufs dichteste überstreuet. Was die Düngung mit Gyps anbetrift: so habe ich wahrgenommen, daß diese, wenn man ihn unvermischt aufstreuen will, allein auf Feldern, welche auch auf der Oberfläche auflösbare Erdarten führen: also auf gutem Erdreich vorgenommen werden dürfe und anzuempfehlen seye; daß man sie aber auf schlechtem Felde, d. i. auf solchem, welches wenig oder gar nicht mit Säuren brauset, gänzlich, es seye denn der Gyps zuvor mit zweymal so viel Asche, Kalk ꝛc. vermischt, übergehen, und allein mit kalkartigen Körpern, Haalbötzig, Steinkohlen ꝛc. düngen müsse.

Die Ursache, warum der Gyps auf schlechtem Felde schadet, ist diese: wenn Gyps, dessen Auflösbarkeit in Wasser bekannt ist, auf ein Erdreich, das auf der Oberfläche ganz arm an auflösbaren Theilen ist, gestreuet wird; so wird er von dem fallenden Regen aufgelößt, und, weil weder Kalk noch Bittererde, zu Zeiten auch nur wenig Alaun-

erde

erde vorhanden ist, allein, mithin in allzugroßer Menge den Pflanzen zugeführt und dadurch, da alles, was zu viel ist schadet, das Wachsthum der Gewächse verhindert.

Bey dem Anbau des Esparsetts muß man also dem bishero vorgetragenen und den übrigen Eigenschaften dieser Kleeart zufolge, hauptsächlich auf die Tiefe und Beschaffenheit des Erdreichs Rücksicht nehmen, und zwar

Erstlich: ob die 3, 4 Schuh tief herausgehobene Erde, unter welcher immerhin Steine oder Schiefern befindlich seyn dürfen, in Säuren auflösbare Theile besitze, und

zweytens: ob in dieser Tiefe Wasser vorhanden sey oder nicht?

Findet man, daß das aus der Tiefe herausgehobene Erdreich, welches man besonders prüfet, nicht im geringsten, oder doch nur äusserst wenig mit Scheidewasser brauset, so ist, wenn auch die obern 3 4 Zolle hoch liegende eigentliche Damm-

erde,

erde, die größte Menge auflösbarer Theile besitzet, eine dergleichen Stelle zum Anbau dieser Kleeart sowohl, als des luzerner Klees, welcher den Bestandtheilen nach sehr viel mit dem Esparsette übereinkommt, nicht geschickt, und man thut wohl den Anbau daselbst gänzlich aufzugeben. Ist aber der nach Abzug der 4 Zolle Dammerde 3 Schuh mächtige Grund an auflösbaren Erdarten reich, d. h. führet er 8, 10, 20, 30. Procente (weniger als 8 Procente sind nicht des Anbaues würdig,) so mag die Dammerde beschaffen seyn wie sie will, führet sie nur 1) einige der den Klee formirenden Bestandtheile: Thonerde, Eisen, Bittererde oder Kalkerde; und 2) in der Tiefe kein Wasser, so ist sie allezeit zum Anbau des Esparsetts und luzerner Klees tüchtig. An allen denjenigen Orten also, wo der Anbau dieser Kleearten nicht gelingen will und das obenliegende Erdreich dennoch fruchtbar ist, da wird man allezeit bey einer Ablaufung von 3, 4 Schuhen finden, daß entweder das in der Tiefe liegende aus Sand, reinem Thon, Letten, Sand-

Sandsteinen ꝛc. überhaupt aus einem nicht mit Säuren brausenden Erdreich bestand, oder aber Wasser hatte.

So viel hier von meinem Irrthum! — Weitläuftiger mich über den Anbau zu erklären und die angestellten chymischen Untersuchungen zu erzählen, erlaubte theils hier die Stelle und der Ort, theils der Plan dieses Werkes nicht; da ich, wie ich schon oft erwähnt habe, die Resultate der chymischen Versuche allein für den dritten Theil, in welchem sie in Anwendung gebracht werden, bestimmt habe.

Die übrigen Abhandlungen, die sogleich angezeiget folgen, werden, wie ich hoffe, da ich ihnen auch, theils um den Landwirth mit den Wegen, welche die Chymisten, die Körper zu zerlegen, gehen, bekannt zu machen, theils ihn selbst in den Stand zu setzen, aus der Untersuchung meine Theorie zu beurtheilen und Anwendung von ihr machen zu können, die Analysis und den Gang der Zerlegung so plan als möglich beschrieben, beyge-

fügt

fügt habe, ihren Endzweck, wo nicht ganz erreicht, aber doch auch nicht weit verfehlet haben.

Ich schließe, und indem ich meine Arbeiten dem Publiko zur gütigen Beurtheilung und Aufnahme empfehle, wünsche und bitte ich: daß Männer edlen patriotischen Sinnes, Landwirthe, und Freunde der Landwirthschaft, mir ihre allenfalsige Zweifel, Erfahrungen, Vorschläge und Wünsche möchten freundschaftlichst bekannt machen und dadurch mich in den Stand setzen, diesem Werke denjenigen Grad der Vollständigkeit zu geben, welchen ich ihm durch meine Bemühungen zu geben im Stande bin.

Ingelfingen,
im Monat Sept. 1789.

Der Verfasser.

Inhalt

Inhalt des 2ten Bandes.

Seite

I. Ueber das Haalbötzig, den Pfannenstein und Dornschlag 1.

II. Ueber die Seifenpottasche und Salpetersiederasche 23.

III. Ueber die Steinkohlen und Eisensteine 49.

IV. Ueber den Rind- Pferd- und Schaafmist 65.

V. Daß es nach den Grundsätzen der Naturlehre möglich sey, die Brache abschaffen und alle Feldungen alle Jahre mit Vortheil besäen und beerndten zu können 105.

VI. Briefwechsel über Gegenstände der Landwirthschaft, den Gyps und den Märgel betreffend 135.

VII. Gedanken bey dem Getreidemangel in Deutschland, von 1770—71. über dessen Quelle und Mittel wider denselben für künftige Zeiten 173.

VIII. Ist es vortheilhafter das Hornvieh im Stalle zu füttern oder weiden zu lassen, sowohl in Absicht auf die Viehnutzung als auf den Dung? 187.

IX. Beantwortung der Frage über die Abstellung der Huthweiden 205.

X. Maximen aus dem Lebenslaufe eines Bauern, welcher durch dieselben vermittelst eines geringen Vermögens ein reicher Mann geworden ist 221.

Inhalt.

Seite

XI. In welchen Fällen ist es nöthig, den Getreidebau und den Grasbau auf dem nemlichen Strich Landes abzuwechseln, und wie muß dabey nach der Natur und Lage des Landes verfahren werden? 275.

XII Die tüchtigste und wohlfeilste Zubereitung des verschiedenen Viehdungsmistes in Absicht auf die Verschiedenheit der Pflanzen und des Erdreichs 287.

XIII. Noch etwas vom Gyps. Streit über die Würkungen des Gypses. Vorschlag wie das ausgefallene Getreide in der Erndte gleich dem Johanniskorn genützet werden könne. Gedanken über scharfigen Roggen und tauben Dinkel oder Spelzen 301

XIV. Schreiben an Herrn Canon. Wöllner zu Halberstadt. Welche Art von Gemenge findet man zur grünen Sommerfütterung am besten? 351.

XV. Ob es rechtlich und nützlich sey, den Schaafen die Weide auf den Brach- und abgeerndten Wintergetreidefluren zu verstatten ꝛc.? 396.

XVI. Antwort auf eine Anfrage über den Wurmfraß auf den Saamenfeldern und über die Raupen. Vom Flachsbau und der Zubereitung des Flachses. 397.

I.

Abhandlung

über das

Haalbötzig, Pfannenstein,

und den

Dornschlag

Der seit einigen Jahren sehr beträchtliche Abgang dieser vortreflichen Dungsalze beweiset deren nützliche Wirkung.

Delius.

I.

Abhandlung über das Haalbötzig.

Unter dem Worte: Haalbötzig, verstehe ich, ein bey Salinen verfertigtes Dungsalz, welches auch unter den Namen: Salzbötzig, Haalerde und Salzasche, bekannt ist. Die äusserlichen Kennzeichen desselben sind folgende: Es ist, was die Farbe anbetrift, schwarz oder grau, welches von dem, der Asche noch beygemischten Kohlen und der gemeinen Erde, wozu man Garten- oder Holzerde wählet, herrühret. Den Geschmack und Geruch betreffend, so ist es, was erstern anbetrift, salzicht-bitter, und in Rücksicht des letztern, brenzlicht-eckelhaft. Wegen dem in demselben befindlichen vegetabilischen Laugensalz und den vielen erdichten Salzen, welche die Feuchtigkeit der Luft stark an sich ziehen, ist es ferner, wenn es auch unbenetzt Jahre lang liegt, mehr feucht als trocken. Der Landmann richtet

bey Erkaufung desselben gewöhnlich sein Augenmerk: 1) auf die Farbe, wo die schwarze bey ihm den Vorzug vor allen hat, und 2) auf die darinnen mehr oder minder befindlichen Stücke Salzes: insgemein Pfannenstein oder Mutterlaugensalze. Es wird in den mehresten Gegenden einzig und allein auf Wiesen und Kleefelder, weil hier dessen Nutzen, wenn man im Frühjahr die rechte Zeit, nemlich Regen versprechende Täge abwartet, unausbleiblich und gewiß ist, verwendet; jedoch gebraucht man es auch häufig da, wo dasselbe mehr aus vitriolicht-erdichten Salzen und dem vegetabilischen Laugensalz als aus Kochsalz bestehet; mit nicht minderen unverkennbaren Vortheil bey Früchten und Gewächsen jeder Art: bey Weizen, Korn, Dinkel, Gerste, Hafer, Flachs, Hanf, Erbsen, Linsen, Wicken, Erdäpfeln, Rüben ꝛc., und rechnet auf einen Morgen von 160 Ruthen mit erstgenannten Früchten angebauet, ohngefähr 100 bis 125 Pfund; auf Wiesen und Kleeäcker aber 4 bis 5 Centner *). Da die Bereitungsart desselben

*) Dieß angegebene durch die Erfahrung erprobte Verhältniß stimmt vollkommen mit meinen Untersuchun-

ben eben so verschieden ist, wie die Bestand-theile der Salzsohlen selbst, so sind bey Anempfehlung dessen, weder ein bestimmtes Gewicht, noch das Erdreich, noch die Gewächse mit Gewißheit anzugeben. Denn hier kann es aus Kalk- und Bittererde, aus Gyps, vitriolisirten Weinstein, Englisch Digestiv- und etwas Kochsalz; anders wo aus Thon, Sand, einen geringen Antheil Kalk, aus Wundersalz, vegetabilischen Laugensalz und sehr vielen Kochsalz zusammengesetzt seyn. Es wäre daher um den aus der Verschiedenheit entspringenden Schaden, sowohl auf Seiten des Oekonomen, als der Salinen selbst (denn beyde verliehren durch fehlgeschlagene Versuche,) räthlich: die Bestand-theile des bereiteten Haalbötzigs alljährlich durch einen Chymiker bestimmen zu lassen; und nach dieser Bestimmung die im folgenden dritten Theil angezeigten damit zu düngenden Gewächse dem Landmann zu benennen. Wie groß der Nutzen hievon nothwendig seyn müßte, dieß

 wird

suchungen überein, denn diesen zufolge besitzen die Getreidearten, Wurzelgewächse ꝛc. einen weit geringern Antheil: kaum $\frac{1}{6}$ fixer salzichten Theile als die Futtergewächse.

wird uns aus Folgendem ersichtlich werden. Nach dem allgemein angenommenen Grundsatz wird das Wachsthum der Pflanzen allein durch solche Körper befördert und zu wegen gebracht, welche denenselben in Ansehung der Bestandtheile homogen sind. Ein Gewächs also, das z. B. was die salzichten Theile anbetrift, vitriolisirten Weinstein, Gyps, Digestiv- und Laugensalze (ein Fall, der bey den mehresten Getreidearten sich ereignet) als Bestandtheil führet, wird durch ein Dungsalz, das größtentheils aus Koch- und Wundersalz bestehet, entweder im Wachsthum gehindert, oder gar vertilget werden; und eben so gehet es mit den erdichten Theilen desselben. Ein Haalbötzig das

1) aus schlechter Erde, in welcher Thon und Sand die herrschenden Bestandtheile sind, und

2) aus Salzabgängen, die vermöge der Sohle, von welcher sie abstammen, gar kein erdichtes Bittersalz, nur wenig Kalkkochsalz, hingegen vielen Thon, Eisen ꝛc. besitzen, bereitet ist, wird bey Gewächsen, welche Bitter- und Kalkerde nöthig haben, wenn das Erdreich selbst hieran Mangel leidet, mehr Schaden als Nutzen verursachen. Die Anwendung

des

des Haalbötzigs also erfordert richtige Kenntnisse von dessen Bestandtheilen, eben so wie die der Gewächse. Bey dem Getreidebau, wenn es hiezu angewendet werden soll, ist dieß besonders nöthig; mindere Vorsicht bedarf man bey Wiesen und Kleefeldern. Alle Arten Klees, und die mehresten der auf den Wiesen wachsenden Pflanzen, führen Bestandtheile des Haalbötzigs, wenn auch immerhin von obiger Verschiedenheit. Die in ihnen vorhandenen feuerfesten Salze sind gewöhnlich: 1) Beide Arten vom fixen Laugensalz: vegetabilisches und mineralisches. Ersteres ist in der, einen vorzüglichen Bestandtheil des Haalbötzigs ausmachenden Holzasche, und letzteres in dem Koch- und Glaubersalz, von welchen keines der Dungsalze frey ist, vorhanden. Die Bestandtheile des Koch- und Glaubersalzes und die Art, wie der alkalische Theil derselben entweder durch die Natur allein, oder mit Beyhülfe der Kunst losgemacht, und dadurch 2) der zweyte und dritte Bestandtheil dieser Pflanzen: das Digestivsalz und mineralische Laugensalz, ersteres gebildet und letzteres ausgeschieden wird, habe ich in dem

ersten Band an mehreren Orten angezeiget. 3) Vitriolisirter Weinstein: eine Salzart, welche in der Holzasche in nicht geringer Menge vorhanden ist; und 4) Gyps, welches erdichte Mittelsalz entweder aus der Salzsohle oder aber aus der Holzasche herrühret. In ersteren wird er sehr häufig angetroffen, und ist daselbst nicht selten in so großer Menge befindlich, daß er während der Veredlung (Gradierung) der Sohle an den Dornen sich ansetzet und solche in einigen Jahren einen halben bis zu einen Zoll dick überziehet. Wird nun eine dergleichen Sohle, die immerhin noch eine, dem Gewicht der Flüßigkeit entsprechende Menge Gypses führet, zu Salz gemacht; so fällt dieser, noch ehe dieses geschieht, den Gesetzen der Auflößbarkeit zufolge, aus der Sohle nieder, wo er dann in den s. g. Satzpfannen nebst den sich dabey ausscheidenden Erdarten: der Bittererde und dem Thon, aufgefangen, und zur Verfertigung des Haalbötzigs aufbewahret wird; letztere: die Asche betreffend, so ist er in solcher häufiger vorhanden, als man bisher vermuthete: die zu dessen Auflösung erforderliche Menge Wassers,

welche,

welche, wie ich überzeugt bin, beynahe allzeit umgangen wurde, hinderte theils dessen Entdeckung, theils beförderte sie, wenn welcher aufgelöset wurde, wegen des vorhandenen alkalischen Salzes, dessen Zerlegung. Was die Bestandtheile des Haalbötzigs anbetrift, so werde ich solche, wenn ich zuvor die Verfertigungsarten desselben werde beschrieben haben, anzeigen.

Erste Art der Zubereitung.

Es bleibt bey Verfertigung des Kochsalzes in den Sogg-Pfannen bekanntlich eine Sohle zurück, welche insgemein von brauner Farbe, fettem Ansehen und bitteren Geschmack ist, und aus welcher kein reines Kochsalz, es sey denn durch chemische Handgriffe, erlanget werden kann. Diese Sohle, welche bey den folgenden Süden nach sonstigen Gebrauch gelassen, ausser mehreren Unbequemlichkeiten, dem Kochsalz einen wiedrigen Geruch und Geschmack, so wie ein unreines Ansehen giebt, suchte man nun verschiedentlich zu benutzen. Einige Salinen lassen solche auf chymische Salze verarbeiten

und verwenden die Abgänge auf Haalbötzig; wieder andre lassen sie zur Trockne einsieden und verkaufen es als Viehsalz, und mehrere behalten sie zur Bereitung des Haalbötzigs, welches seit vielen Jahren als ein Handlungsartikel betrachtet wird. Um den Debit dieses wichtigen Artikels, dessen Ertrag sich bey sehr vielen Salinen auf 10,000 fl. alljährlich belauft, immer mehr zu begünstigen, hat man zu dessen Verfertigung besondere Magazine errichtet, in welche die Mutterpfohle oder deren ausgeschiedene Theile, so wie alle sonstige Abgänge, als: a) der Schaum, der sich währender Garsiedung der Sohle ausscheidet; b) die aus der Kochpfanne gesammelte Erde, welche allezeit wegen der noch fehlerhaften Einrichtung der Siedereyen, mit einer beträchtlichen Menge Koch- auch je nachdem die Bestandtheile der Sohlen sind, mit Glaubersalz, versetzt ist; c) der Schlamm aus den Gradierkästen und Reservoirs; d) die Erde von den Siedhäusern und Gradiergebäuden; e) Ruß; und f) die in den Feuerheerden gesammelte Asche, welche zum Theil, und dieß der schwarzen Farbe wegen, glühend ausgezogen, und mit Salzwasser abgelöscht

löscht wird — gebracht werden. Ist hier nun hinreichender Stoff zu dessen Bereitung vorhanden, so mischt man die besagten Artikel genauest, und setzt so viel als nöthig ist, Mutter- oder Salzsohle bey. In den mehresten Salinen wird aus Mangel einer hinreichenden Menge Asche, Garten- oder Holzerde beygesetzt; ein Verfahren, welches bey guter Auswahl der Erde nicht mißbilliget werden kann, das aber dennoch, da diese immerhin so schlecht als kaum zu erwarten ist, getroffen wird, eingeschränkt zu werden verdiente.

Zweyte Art der Zubereitung.

Ganz abweichend in der Bereitung und nicht wenig verschieden in seinen Bestandtheilen und Wirkung, ist das auf die so gleich zu erzählende Art, erhaltene Haalbötzig, welches man eigentlich allein Salzasche, das vorhin beschriebene aber Haalbötzig, weil es aus allen existirenden salzichten Abgängen der Salinen verfertiget wird, nennen und als verschiedene Arten Dungsalzes betrachten sollte. Man bereitet es also. Wenn die Dornwände der Gradierhäuser, zu deren Errichtung Weiß- auch Schlee

dorne erwählet werden, so stark versteinert sind, daß die Gradierung dadurch erschwehret und verhindert wird; so können solche abgeworfen, getrocknet, und nach dem auf die in der Folge angeführte Art der steinichte Ueberzug so gut als möglich davon getrennt, die übriggebliebenen Dornen aber zur Asche verbrennt werden. Die Verbrennung geschieht folgendermassen. Man macht nächst ihm ein lebhaftes Feuer von dürren Holze an, und legt auf dieses eine Parthie der nochmahls getröckneten Dornen; während dem da diese in Flamme gerathen, wird eine nochmahlige Dornlage so locker als möglich aufgelegt, die unterdessen, als die untenliegenden brennen, dürr werden, und in der Zeit auch anfangen in Flamme zu gerathen; worauf mit der Gabel wieder frische aufgelegt werden, und so immer fortgefahren wird, bis man einen ganzen Haufen abgebrennt hat. Man richtet bey dieser Beschäftigung sein vorzügliches Augenmerk darauf, daß die Dorne nicht verkohlen, sondern zu Asche brennen. Um dieses zu verhindern, dürfen solche nicht zu fest, auch nicht zu viel von ihnen auf einmahl aufgeleget wer-

werden. Da die von aussen an dem Aschenhaufen herumliegende Dorne früher verbrennen, als die innern, welche meistens nur verkohlen; so wird allzeit, ehe eine frische Lage aufgelegt wird, der Meiler mit einer Gabel auseinander gebreitet, jedoch mit der Vorsicht, daß er nicht allzugroß werde, weil dieses die Einäscherung allzusehr begünstigen und die Anzahl der Stippiche vermindern würde. Will man keine Dornen mehr auflegen, so wird der Meiler abgelöscht, damit er nicht zu sehr verbrenne. Zum Ablöschen nimmt man Sohle. Während der Begießung wird der Aschenhaufe, theils damit das weitere Glühen desselben überall verhindert, theils damit das Salz gleichförmig vertheilet werde, mit der Gabel wohl auseinander gescharret und nachdem alles erkaltet, in Stippiche gefüllt und während dem Einfassen in diese wohl gestampft *). Man ersieht aus der angeführten Bereitungsart: 1) Daß die Salzasche einer Vermischung aus gleichen Theilen Gyps und unausgelaugter Asche, vermischt mit einer Auflösung von Koch und Viehsalz entspreche; 2) Daß

*) s. deutsche Encyclopoedie L. H.

2) daß deren Wirkung vollkommener bey Gras und Früchten seyn werde, als die des Dornschlag und Gypses; 3) daß sie bey mehreren Gewächsen, und zwar bey allen denjenigen anwendbar sey, bey welchen neben dem Gyps, auch Kalkerde, fixe Laugensalze, vitriolisirter Weinstein, Koch- und Digestivsalz, ein Bestandtheil ist; und dann aber auch 4) daß die Art der Zubereitung wegen der allzufrühzeitigen Ablöschung, wodurch die Einäscherung, mithin die Wirkung der nützlichsten Stoffe verhindert wird, einen sehr wesentlichen Fehler habe. So viel von der Zubereitung dieser Dungmittel. Wir gehen zur nähern Betrachtung derselben über. Ich erwähnte bereits in dem Anfang dieser Abhandlung: 1) daß die Bestandtheile unserer Dungmittel eben so verschieden seyen, als die der Salzsohlen; daß also 2) diese nach jenen müßten beurtheilt werden, und 3) daß die Bereitungsart, d. i. der Zusatz von Erde und Asche, einen nicht geringern Einfluß darauf habe, und also in Anschlag müsse gebracht werden. Dieß also auseinander zu setzen nehme ich hier, nach den bisherigen Erfahrungen, zweyerley Arten von Sohlen sowohl als Erde und Asche an.

Nehm-

Nehmlich was erstere die Sohlen anbetrift: 1) Sohlen, deren heterogene Theile größtentheils Glauberſalz, Kalkkochſalz und Gyps ſind; und 2) Sohlen die neben dem Kochſalz: Englischſalz (Bitterſalz) ſalzſaures Bitterſalz, und Glauberſalz führen. In Rückſicht lezterer: Die Erden und Aſche anbelangend: 1) Solche, die 6, 10, 15 Procent Kalk-, Bitter- und Alaunerde, und 2) andre die 30, 40, 50, auch 60 bis 70 Procente dieſer Erdarten beſitzen. Nehmen wir alſo ein Düngſalz aus erſteren Stoffen bereitet an; ſo finden wir was die herrſchenden Beſtandtheile anbetrift überhaupt in ſolchen: 1) Kochſalz; 2) Glauberſalz; 3) Vitriolisirten Weinſtein; 4) Vegetabiliſches Laugenſalz; 5) Gyps (Selenit.); 6) Thonerde; 7) Kieſelerde; 8) Kalkerde; 9) Sand; 10) Eiſen; 11) Bergöhl. In dem aus lezteren Beſtandtheilen verfertigten aber: 1) Kochſalz; 2) Englischſalz; 3) Glauberſalz; 4) Digeſtivſalz; 5) Kochſalzſaures Bitterſalz; 6) Vitriolisirten Weinſtein; 7) Vegetabiliſches Laugenſalz; 8) Kalkerde; 9) Bittererde; 10) Alaunerde; 11) Kieſelerde; 12) Eiſen; 13) Bergöhl. Daß nach der zweyten Art verfertigte Dungſalz aber: 1) Gyps;

2) Koch-

2) Kochsalz; 3) Vegetabilisches Laugensalz; 4) Vitriolisirter Weinstein; 5) Kalk- und Alaunerde. Dieses wären ohngefehr die Bestandtheile der verschiedenen Gattungen Haalbötzigs. Betrachten und erwägen wir deren Wirkungsart auf das Wachsthum der Pflanzen; so finden wir aus der Vergleichung derselben mit den in dem ersten Theil angeführten Bestandtheilen der Gewächse, daß solche auf eine materielle Weise geschehe, und zwar dadurch: 1) Daß es den Gewächsen die erforderlichen Erdarten und bereits gebildeten Salze übergibt; 2) auf die in dem ersten Band angeführte Weise die Erdarten auflösbarer macht, und 3) mehrern Arten unbrauchbarer Pflanzen, als: Moos, Rehwasen ꝛc. durch Zuführung eigenschaftswidriger Nahrungstheile ausrottet. Aus dem bishero Angeführten erhellet also, daß man bey dem Gebrauch des Haalbötzigs, da die Wirkung desselben nur allein auf eine materielle Weise geschieht, mehr auf die Bestandtheile der Gewächse, als auf die des Erdreichs Rücksicht nehmen, und daß man ebendaher zur Vermeidung alles Schadens in Ansehung der Wahl desselben, vorsichtig seyn müsse.

II.

Abhandlung über den Pfannenstein.

Der Name dieses bey Salinen verfertigten, und in deren Bezirken gangbaren Dungsalzes bezeichnet genau dessen Ursprung. Es wird dasselbige nehmlich bey allen denjenigen Salinen in Menge erhalten, wo Vorurtheile, Geringschätzung der Feuermaterialien und Geräthschaften, oder kürzer, Mangel an chymischen Kenntnissen herrschen. Man findet es, was die Bestandtheile anbetrift, von so verschiedener Art, daß eine genaue Bestimmung der Körper, welche es formiren, eine ganz unmögliche Sache ist. Die Zusammensetzung der Sohlen, welche durchaus von einander abweichen, erzielen eben so wie die verschiedenen Arten der Siederey einen beträchtlichen Unterschied. Gradierung, geschwindes oder langsames Einkochen; die Art die Sohlen zu reinigen; der Beysatz oder die Wegnahme der vorhandenen Mutterlohlen; Reinlichkeit ꝛc. kurz, alles dieses und andere Dinge bewirken eine merkliche Veränderung. Wir nehmen nach diesem und der Erfahrung zufolge, sechs Gattungen desselben an;

nehmlich Pfannenstein, welcher 1) größtentheils aus Kochsalz, nur etwas wenigen Glaubersalz und erdichten Theilen bestehet; 2) der aus Bittererde, Thon, Gyps, Kalkerde, Eisen, etwas Koch-, Glaubersalz und erdichten Salzen; 3) aus Glaubersalz, etwas Bittererde und Gyps; 4) aus Glauber- und Englischen Salz, etwas Koch- und Kalkkochsalz; 5) aus Englischen Salz, etwas Glaubersalz, Kochsalz und erdichten Theilen, und 6) aus Koch- Glauber- Englischen Salz, aus Bittererde, Kalkerde, Thon, Gyps und Eisen, zusammengesetzet ist. Nro. 1. 3. 4. 5. 6. ist vorzüglich auf Wiesen und Kleefelder, und Nro. 2. 5. 6. wenn letztere mit Asche oder Erde vermischt werden, auf Saamenfelder anwendbar. Der Gebrauch dieser Dungsalze ist folgender: der Pfannenstein wird gepocht oder auf eine sonstige Art zu einem gröblichten Pulver gemacht; alsdenn vermischt man ihn entweder mit etwas Asche, mit Erde, Kalk, Gyps ꝛc. und streuet ihn im Frühjahr, kurz vor einen Regen, ganz dünne auf die Wiesen, Klee- oder Saamenfelder. Seine Wirkungsart kommt mit der des Haalbötzigs überein, und geht also auf eine materielle Weise

von statten. Da er beynahe von Jahr zu Jahr, wird er anders nicht in allzugroßer Menge aufgestreuet, von den Gewächsen aufgenommen wird, so ist ein alljährlich wiederholter Gebrauch höchst nöthig.

III.

Abhandlung über den Dornschlag.

Der Dornschlag ist ein aus Gyps, zu Zeiten auch aus etwas Kalk und Koch- oder aber Glaubersalz bestehender, an den Dornwänden der Gradierhäuser aus den Salzsohlen abgesetzter Tophstein. Man findet ihn, da die Bestandtheile der Salzquellen sehr von einander verschieden sind, nicht bey allen Salinen; denn bey einigen sind die Salzquellen an luftgesäuerten Kalk und bey mehreren an Gyps so arm, daß letzterer auch in 20. 24. löthiger Sohle aufgelößt bleiben kann, und erst durch das Sieden seines Auflösungswassers beraubt in den Salzpfannen niederfällt; ersterer aber kaum in 20. 30. Jahren eine merkliche Incrustation hervorzubringen vermögend ist. Da wo er, wie z. B. in der Schweiz, im Sächsischen

fischen und Schwäbischen, in den Sohlen in Menge vorhanden ist, so daß man alle 6. 8. Jahre die Dornwände abzuwerfen genöthiget ist, da sind zu dessen Zubereitung zum Verkauf besondere Einrichtungen getroffen worden. Man überlegt nehmlich da, wo man aus dem Gradierhaus Dorne nehmen will, die Gradierkästen mit Diehlen, wirft hierauf die Dorne aus den Dornwänden darauf, schlägt mit Dreschstangen die Dornsteine von denselben loß, wirft alsdenn die Dorne über das Gradierhaus hinaus und füllt die liegen gebliebene Steine in Stippiche. Oder man bringt die Dornbünde unter die Kochpfanne, verbrennt sie daselbst; zieht alsdann, wenn der Sud beendiget ist, die calcinirten mürbe gemachten Steine nebst der Asche heraus; löscht sie mit Salzsohle ab, und zerstößt sie, so bald die dadurch fest gewordene Masse trocken worden, mit hölzernen Stempfeln. Was den auf diese Weise zum Verkauf bestimmten Dornschlag anbetrift; so wird dieser von dem Landmann entweder im Wergeltrog zermalmt, gepocht, oder auf sonstige Art klein gemacht, und auf Wiesen und Aecker gleich dem Gyps im Früh-

jahr

jahr (besser im Spätjahr auf Winterfrüchte) ausgestreuet. Seine Wirkung zeiget sich nicht selten früher, wegen den zwar in sehr geringer Menge ihm anklebenden Kochsalz, Glaubersalz und beygemischten Kalk, als die des Gypses, und man trägt daher, bewogen mehr durch Vortheile als durch Gründe, kein Bedenken, ihn um den mehr als doppelten Preis des Gypses zu erkaufen; 10. 15 Meilen weit mit schweren Kosten zu verführen, und ihn den Namen eines der ersten Dungmittel beyzulegen. Für Salinen ist dieser irrige Wahn, der auch als eine Geburt der salzreichen Theorie anzusehen ist, ein sehr nützliches Wesen, denn er vermehret den jährlichen Ertrag ihrer Werke, um drey, vier tausend Gulden. Ein Land, das Gyps, Steinkohlen oder Gypsmärgel führet, begehet durch die Erkaufung des Dornschlags, falls solches ausserhalb dessen Gränzen geschieht, eine wirkliche kameralistische Sünde. Denn die Bestandtheile desselben sind so wenig von denen des Gypses verschieden, daß ein Zusatz von 2 Procenten Viehsalzes den ganzen Unterschied aufzuheben vermögend ist. Man nehme also statt Dornschlags, da wo er fehlt, Gyps, Stein-

kohlen oder Gypsmärgel, und setze jeden von diesem 2 Procente in Wasser aufgelößtes Koch- oder Viehsalz, auch Pfannenstein bey; hingegen Dornschlag, statt Gypses, Steinkohlen und Gypsmärgels, da wo diese nicht zu haben sind. Schlüßlich hier die Gewächse und Plätze zu nennen, auf welche der Dornschlag mit Nutzen gestreuet wird, so sind diese alle diejenigen, welche den Gyps als Bestandtheil führen, und zwar: Weizen, Gerste, Dinkel, Roggen, Hafer, Erbsen, Wicken, Linsen ꝛc. Wiesen und Kleefelder ꝛc. Allen diesen und denen in der Folge noch angeführten Gewächsen dienet er als wirkliches Nahrungsmittel.

II.

Abhandlung

über die

Seifen- Pottaschen-

und

Salpetersiederasche.

Die ausgelaugte Asche der Seifen- und Pottaschensieder erweiset sich durchgehends auf den Aeckern weit kräftiger und von längerer Dauer als die rohe.

v. Benekendorf.

Längst durch die Erfahrung bestätigt ist der Nutzen, und die, an Dauer und Kraft alle Arten von Dünger, (richtig gewählte Gattungen Märgels ausgenommen,) weit übertreffende Wirkung dieser erdichten Dungmittel. Ueberflüßig wäre dahero mein Lob, und unnütz meine Anpreisung desselbigen, da nur wenige Oekonomen den Nutzen derselbigen verkennen, aber wie mich dünket minder überflüßig eine Erklärung, eine mit der Erfahrung übereinstimmende Erklärung: wie und auf welche Art, die Wirkung derselbigen geschehen, und auf welchen Feldern, und bey welchen Gewächsen, solche mit Nutzen verwendet werden können? der Oekonom lehrte bishero, daß Oehl und Salz, oder überhaupt ein aus beyden entstehendes seifenartig-schmieriges Wesen, die Fruchtbarkeit alleinig bewirke, und daß also jeder Körper der solche besitzen und äusern solle, einen dieser Bestandtheilen othwendigerweise besitzen müsse. Nach diesen bekannten und allgemein bejaheten Sätzen bestimmte man dahero die Güte der verschiedenen Arten von Holzasche, nach der mehrern oder mindern Reichhaltigkeit an Salz; ein Ver-

fahren welchen die Erfahrung, selbst nach dem Geständniß der Lehrer dieser Theorie, gerade zu widerspricht; denn diese zeiget: daß ausgelaugte Asche, in welcher, (wie dieses leicht zu erachten ist,) kaum Spuren von salzichten, geschweige denn von öhlicht- oder schleimichten Theilen vorhanden sind, sich besser und kräftiger auf den Aeckern beweise als unausgelaugte Asche. Diese unläugbaren Erfahrungen, nach obiger Theorie zu erklären ist eine ganz unmögliche Sache, und wahres gordisches Bestreben. Wie ungewiß, trüglich, grundloß und unanwendbar sind also nicht Lehrsätze dieser Art? Geleitet von der Erfahrung sehen wir, daß Salz und Oehl freye Körper: der Märgel, Kalk, Thon, ausgelaugte Asche ꝛc. bey richtiger Wahl, an Wirkung, an lang andauernder Wirkung, jeden animalischen Dünger weit übertreffen; daß die vielen salzichten Theile der Gewächse sich zu den erdichten wie 1. zu 141. verhalten; daß Gewächse ohne Erde nicht, wohl aber ohne Salz und Oehl bestehen können; daß die salzicht und öhlichten Theile der Pflanzen unendlich, sowohl von einander selbst, als auch

vorzüglich von dem ohnehin, in Ansehung des Gewichts, in gar keinen Anschlag zu bringenden ranzichten, in der Erde oder in den animalischen Dünger vorhandenen Oehl und Salz verschieden seyen; daß z. B. ein Kleeland, von welchen man jährlich 100 Cent. Klee erlangt, 3840 Pf. reinen Oehls abwerfe, da es doch selbst kaum einige Pf. eines aus verfaulten Pflanzen erst abgesezten, denselben also nicht ursprünglich zugehörenden Oehls besaß; und endlich daß, wie ich dieses in den nächstfolgenden Abhandlungen zeigen werde, die öhlichten Theile der animalischen Dünger, da sie in 10 Fuhren Mists nicht mehr als 29 Pf. betragen, wirklich unter die Chimären gerechnet werden müssen. Warum wollen wir ferner also einer Theorie anhangen, die so ganz dem Gepräge einer schwärmerischen, aus Luftsalzen, Lebensgeistern, Oehl und unnennbaren nie gesehenen Salzen entstandenen Geburt, entspricht? die uns Oehl und Salz in der Luft, welche doch bishero keiner unserer neuesten Physiker und Chimisten, der hundertmahligen Untersuchung ohngeachtet, je entdeckte, verheißet; die von chimisch-mineralogischen Kenntnissen leere Systeme nach Gefallen ohne Gründe und Plan, so wie es die Umstände verlangen

langen bildet, und dem Mineralogen neue nicht existirende Bestandtheile der Steine und Erdarten, z. B. ein scharfes alkalisches Salz in dem Kalk, im Gyps und Märgel, einen Ueberfluß von Oehl im Thon der aus Pflanzenfasern entstanden seyn soll, aufdringen und ihm, was noch mehr ist, lehren will: daß Thon unter die schweren, und Lehmen, der doch nur eine Abart von diesem ist, unter die leichten Erdarten gezählet werde. Daß Märgel verhärteter Thon, und die von Gewächsen ausgeschiedene Erdarten von der Luft und dem Wasser ausgeschiedene Körper seyen? Wir haben an der Asche, deren Wirkungsart wir nur nach dieser Ausschweifung betrachten wollen, den auffallendsten Beweis: daß die Erde wegen ihrer in Ansehung des Verhältnisses ungleich grösseren Menge, ein weit wichtigerer Bestandtheil seye als die Salze, und daß man also da sie ohnehin wie wir mehrmahlen erwähnten die Grundlage der unentbehrlichsten Theile der Gewächse: der Fasern ausmacht, vorzüglich auf sie Rücksicht nehmen, aber auch dabey, da die Verschiedenheit der Erden so wie der Bedürfnisse der Pflanzen eine Auswahl erheischet, vor jeder Anwendung eines

Dung-

Dungmittels, oder vorzunehmender Verbesserung der Felder mit Erdarten, die Bestandtheile dieser Körper erforschen und mit denen der Pflanzen vergleicheu müsse. Nach diesen abermahligen Aufenthalt gehe ich zur Erzählung der mit Seifensiederasche angestellten Versuche über: die hiezu angewendete Asche wurde in hiesiger Gegend gesammlet und stammte daher theils von Reben- und Buchen, theils von Eichenholz ab, der hiezu angewendete Kalk aber führte, da er größtentheilts aus Steinmärgel und Schneckensteinen verfertiget wird, 8. bis 10 Procent heterogener Theile, worunter ich Eisen, Thon und Kieselerde, größtentheils aber Bittererde verstehe. Von dieser trockenen zuvor abgeriebenen, und etwas geglüheten Asche nahm ich 5 Quint, (300 Gran.) rührte sie in einem geräumigen mit einer Schraube versehenen Glas mit Wasser zu einem ganz dünnen Brey an, und trug nach und nach so viel reines doppeltes Scheidewasser ein, nachdem ich jederzeit zuvor das Aufbrausen abgewartet hatte, als zur Sättigung nöthig war. Das Aufbrausen war heftig, und es schienen nach der Sättigung ohngefehr drey viertel Theile der Asche auf-

aufgelößt zu seyn. Ich fügte hierauf noch etwas Scheidewasser hinzu, und ließ das Glas im Sande über Nacht wohl digeriren. Den andern Tag goß ich durch behutsames Abneigen die über dem Unaufgelößten stehende helle Flüssigkeit in eine porzellainene Schaale, füllte mit lauwarmen Wasser das Glas voll; rührte Alles untereinander; ließ es bis zur Aushellung stehen; goß die helle Flüßigkeit abermahls in die Schaale ab, und wiederholte dieses so lange, bis das Abgegossene keinen sauren Geschmack mehr hatte. Nun nahm ich eine abgewogene Tute von Druckpapier, sezte sie in einen gläsernen Trichter der auf einer Bouteillie aufsas, filtrirte die sämtliche abgegossene saure Flüssigkeit; süßte durch wiederholtes Anfüllen die Tute mit Wasser aus; brachte in solche das zurückgebliebene Unaufgelößte; und befreyte das Glas durch Wasser von der ihm anhängenden Erde. Ich trocknete hierauf solche anfangs in der Luft, alsdenn aber innerhalb 6. 8 Stunden in einer eisernen Pfanne, worinnen zur Vorsicht ein Blatt Schreibpapier lag, bey demjenigen Grad von Hitze, bey welcher das Schreibpapier unverbrannt blieb; wog die Tute noch warm, und fand daß sich von 100 Theilen, genau

nau 79. aufgelößt hatten. Die unaufgelößte Erde knirschte auf den Zähnen; braußte mit Säuren nicht; blieb in der größten Menge Wassers gekocht, unaufgelößt, und verhielt sich also, wie dieß auch das Schmelzen mit Laugensalz bestätigte, als eine wirkliche Kieselerde, die auser etwas Eisen nichts Fremdes enthielt. Ohngeachtet dieser Versuch hinreichend für den praktischen Oekonomen wäre, indem diesen nichts als die Kenntniß der Menge der in einem Körper auflösbaren Theile nöthig ist, so will ich dennoch in der Kürze zur bequemeren Erreichung meiner Absicht, die fernere Zerlegung, der aufgelößten Theile erzählen. Ich ließ in die filtrirte Flüßigkeit zur Entdeckung der Schwererde einige Tropfen Vitriolsäure fallen, und solche 24 Stunden lang stehen, da sich während dieser Zeit keine Spur eines Niederschlags gezeiget hatte, eines Niederschlags der erfolgt seyn würde wenn diese Erdart vorhanden gewesen wäre; so brachte ich die Auflösung in eine porzellainene Schaale, fügte 2 Loth sehr reines verwittertes Glaubersalz bey, und ließ sie bis auf ohngefehr 2 Loth abrauchen. Es zeigte sich während diesen ein häufiger, theils nadelförmich, theils schuppichter

Nie-

Niederschlag, der sich nach dem Erkalten nebst einigen Crystallen Glaubersalzes an den Flächen der Schaale gelagert hatte. Ich schüttete hierauf zu dem noch vorhandenen wenigen Flüßigen, 1 Loth Weingeist, übergab alles einer abgewogenen filtrir Tute; befreyete den Niederschlag von dem ihn allenfals noch anklebenden erdichten Salzen durch höchst rectificirten mit 2 mahl so vielen Wasser vermischten Branntwein, lößte solchen alsdenn in kochenden Wasser auf, und präcipitirte, nachdem ich mich zuvor durch kaustsches flüchtiges Laugensalz von der Reinheit der Gypsauflösung: ob ihr nehmlich nicht Alaun und Bittererde anklebe, überzeuget hatte, mit Weinsteinsalzauflösung die mit Vitriolsäure gebundene Kalkerde. Der Niederschlag wog nach dem Aussüßen und Trocknen 171 Gran. Anmerkung: der Zusatz von Glaubersalz geschahe, um die in der Auflösung allenfalls vorhandene Kalkerde, deren Gegenwart jederzeit ein erfolgender Niederschlag, der schwer auflösbar im Wasser ist, anzeiget, davon zu scheiden. Der Niederschlag ist erzeugter Gyps, welcher nach den Gesetzen der Wahlanziehung allzeit entstehen muß, wenn zu einer Auflösung der Kalkerde in

Scheide-

Scheidewasser, oder Salzsäure, Vitriolsäure, oder ein aus dieser Säure und den Laugensalz entstandenes Mittelsalz, z. B. Glaubersalz gebracht wird. Die Vitriolsäure des Glaubersalzes nehmlich verbindet sich vermöge einer näheren Verwandschaft mit der Kalkerde, macht solche von dem Scheidewasser loß, und fällt denn der schweren Auflößbarkeit des erzeugten Gypses zufolge, in der Flüßigkeit nieder. Nachdem diese Erdart ausgeschieden war, setzte ich zur Ausscheidung des Eisens, das in den Pro- und Edukten der Pflanzen stets befindlich ist, (und daher auch hier zu erwarten war) nach und nach so viel Blutlaugensalz bey, als zur gänzlichen Fällung desselben erforderlich war; sammelte hierauf den entstandenen Niederschlag, süßte ihn aus, glühete und wog ihn. Sein Gewicht betrug nach Abzug des in dem Blutlaugensalz befindlichen Eisens 15 Gran. Die zurückgebliebene Lauge zerlegte ich durch Weinsteinsalz-Auflösung nach bereits erzählter Art in 64 Gran Erde; ich hatte also 13 Gran mehr, als ich nach Abzug der Kalkerde und des Eisens hätte erhalten sollen, welcher Gewichtzuwachs von der mindern Austrocknung des Nieder-

schlags herrührte. Diese 64 Gran Erde lößte ich in verdünnter Vitriolsäure auf, setzte, unter beständigem gelinden Abdampfen, so lange wohl getrocknete reine Bittererde hinzu, bis kein Aufbrausen mehr entstund, und der zuletzt hinzugefügte halbe Gran ungesättigt (welches durch den Zusatz einiger Tropfen destilirten Eßigs erprobet wurde) liegen blieb. Ich erhielt, nach dem ich alles mittelst Brandweins, der mit destilirten Wasser zur Hälfte vermischt war, auf ein Filtrum gebracht, mit etwas Wasser ausgesüßt, und mit Laugensalz zerleget hatte, 18 Gran Alaunerde. Anmerkung: Zur Scheidung der Bitter- und Alaunerde, wenn solche in einer Auflösung miteinander vermischt sind, kennt man zur Zeit keinen sicherern Weg, als den so eben betretenen. Die Alaunerde nehmlich, welche hier in mehr Vitriolsäure aufgelößt war, als sie, im engsten Verstande betrachtet, nöthig hatte, wird, da sie zuvor durch die Uebersättigung mit dieser Säure ein leicht auflößbares Salz formirte, durch die hinzugesetzte Bittererde dieser überflüßigen Säure beraubt, und dadurch in ein schwer auflösbares Salz, ihrer Eigenschaft gemäß, umgeändert,

welches

welches dann, da ihm durch die Vereinigung dieses Theils der Vitriolsäure das benöthigte Auflösungswasser entzogen wird, sich als sogenannter unauflößlicher Alaun auszuscheiden genöthiget wird. Was endlich die noch übrige Auflösung, welche die Bittererde enthielt, anbelangt; so präcipitirte ich hieraus mit aufgelößten Laugensalz die darinnen vorhandene Erde; süßte solche gehörig mit heißen Wasser aus; trocknete sie; nahm dieß zum Niederschlag verwendete Gewicht an Erde hinweg; glühete sie gleich der Asche, die ich hiezu verwendet hatte, in einen porzellanenen Tiegel in etwas aus, und erhielt alsdenn 32 Gran vollkommen reine Bittererde. Um mich von der Reinigkeit der ausgeschiedenen Körper zu überzeugen, lößte ich die Alaun-, Bitter- und Kalkerde, jede besonders, in Vitriolsäure auf, und ließ die Auflösung nach und nach crystallisiren; ich erhielt Alaun 104 Gran, 96 Gran Bittersalz und $4\frac{3}{4}$ Quint Gyps. Diesen Versuchen also zufolge sind in 100 Theilen trockner Seifensiederasche befindlich:

5 Theile Eisen;
57 - - Kalkerde;
11 - - Bittererde;
6 - - Thonerde;
21 - - Kieselerde.

100 Theile.

Jeder meiner gütigen Leser wird von selbst nach der von mir bisher vorgetragenen Theorie — hat er solche anderst seiner Aufmerksamkeit gewürdiget — aus den hier angeführten durch Scheidewasser bestimmten auflößbaren Theilen zu schließen in den Stand gesetzt worden seyn, daß dieß erdichte Dungmittel auf allen denjenigen Feldern mit Nutzen werde verwendet werden, welche 1) nach der in dem ersten Theil S. 257 angezeigten Prüfungsart, weniger als 40 Procente auflößbarer Theile führen, und worauf 2) Gewächse, welche ein fruchtbares Erdreich lieben, als: Weitzen, Gerste, Spelz, Roggen, (Dinkel, Korn,) Hafer, Linsen, Erbsen, Wicken, Bohnen, Lein (Flachs), Hanf, Hirse, rother ewiger und türkischer Klee ꝛc. angebauet werden sollen. Was die Wirkung, deren Andauer und den Gebrauch dieses Dungmittels anbetrift; so geschiehet erstere auf eine materielle Weise, und zwar dadurch: 1) daß die zu erbauende Gewächse die ihnen angemessenen Erdarten in erforderlicher Menge erhalten, und 2) das Unkraut durch sie hinweggeschafft wird. Die Andauer betreffend, so wird und darf solche, wenn man das Erdreich damit überfahren hat, sicher zu 15. 20. Jahre, oder

so

so lange, als noch eine sattsame Menge dieser erdichten Nahrungstheile vorhanden ist, angenommen werden. Eine genauere Bestimmung der Andauer ist, sowohl wegen der Verschiedenheit der Gewächse, des Dungmittels und des Erdreichs, als auch der Lage der Felder selbst nicht möglich, es sey dann, daß man 1) das Gewicht des aufgeführten Dunges, 2) die Güte, d. i. die Procente der auflößbaren Theile des Feldes, 3) die Tiefe, welche der Pflug gehet, 4) die Schwere eines Cubik-Schuhes der Ackererde, 5) das Gewicht der alljährlich abgeerndeten Früchte, und 6) die Menge der in einem Centner derselben befindlichen fixen sowohl als flüchtigen erdicht-salzichten Theile, bestimme. Hat man sich von diesem allen hinreichend unterrichtet, so wird es bey ebener Lage der Felder nicht schwer fallen, die Andauer der Fruchtbarkeit theoretisch mit vieler Gewißheit anzugeben. Den Gebrauch desselben anbelangend, so richtet sich dieser entweder nach den Umständen oder nach der Lage. Wenn ein Feld, das man z. B. durch Kauf oder Handel an sich gebracht hat, bereits eingesäet oder besaamet ist, der Prüfung zufolge der Verbesserung bedarf, so

würde es unweise gehandelt seyn, mit dieser so lange zu verziehen, bis die Erndte vorüber ist, in dem jährlich nur eine gewisse Menge, nicht aber die sämtlich vorhandenen auflößbaren Erdarten dem Felde durch die Gewächse entzogen werden. Hier in dieser Lage also richtet sich der Gebrauch nach den Umständen, das heißt: man streuet die Seifensiederasche so dichte als möglich auf Wiesenfrüchte im Herbst oder Winter, auf die Sommerfrüchte aber im Frühjahr; je früher dieses geschehen kann, desto vortheilhafter ist es, desto ergiebiger wird die Erndte. Ein Feld mit Weizen oder Gerste aber, mit Esparsette oder ewigen Klee angebaut, bedarf darin ungleich mehr als wenn es mit Dinkel und Roggen (Spelz und Korn) besaamet wäre. Alles richtet man hier nach den Bedürfnissen der Gewächse, nach den in diesem sowohl als dem folgenden Theil angegebenen Bestandtheilen der Gewächse. Was das zweyte: die Lage anbetrift, so verstehe ich hierunter entweder a) Mangel an dergleichen Asche; b) Entlegenheit der Felder; c) schlechte unfahrbare Wege, und d) Mangel an hinreichenden Kräften zur Ausführung. Alle diese Unvollkommenheiten erzie-

erzielen Veränderung in der Art der Anwendung. So verhindert uns 1) der Mangel an Asche, wenn es auch an dem Vollbringen nicht fehlen würde, an einer gänzlichen Ueberführung der Felder; 2) die Entlegenheit der Güter und unfahrbare Wege erschweren auch bey dem größten Ueberfluß die besagte Verbesserung, und 3) der Mangel an Geld verscheuchet auch schon jeden Gedanken dieser Art. Es erhellet also aus dem Gesagten, daß die Anwendung dieser Dungmittel entweder a) alle 1, 2 Jahre, oder b) alle 15, 20 Jahre geschehen müsse. Hier bey letzterer überführt man die Aecker so lange mit Asche, bis sie gemischt bey Korn- und Dinkelfeldern 25, 30 auch 35, bey Weizen und Gerstenfeldern aber 40, auch bey ersteren 50 Procente auflößbarer Theile besitzen; und dort bey ersterer bestreuet man sie entweder gleich nach der Saat noch vor dem Eineggen, oder aber, wenn der Saame bereits aufgegangen ist, so dichte als es möglich ist. Eine reiche Gabe in den ersten Jahren führt die Besitzer solcher Güter in kurzem zu dem erwünschten Ziel: nach und nach auch ohne animalischen Dung und ohne sonderlichen Aufwand, ihre armen Felder

in fruchtbare zu verwandeln. Ich hörte längst bey Anpreisung dieses Dungmittels die Frage entstehen: woher aber dieses, auch nur bey alljähriger Verbesserung ungeheure Bedürfniß von Seifensiederasche komme? Diese Frage, die so ganz vollwichtig und natürlich ist, und daher eine genugthuende Antwort allerdings verdienet, suchten mehrere Oekonomen dadurch zu beantworten, daß sie die selbstige Zusammensetzung derselben aus Kalk und ausgelaugter Asche anriethen. Ob nun aber auch hiedurch diese Frage vollkommen erörtert und der besorgte Mangel gehoben worden sey? Dieß dünkt mich müsse, da die Holzasche, ohne welche doch bisher keine Seifen- Pottaschen- und Salpetersiederasche gedacht werden konnte, bey weiten nie in der erforderlichen Menge erhalten werden kann, allerdings mit Nein beantwortet werden. Also ist die Frage immer noch: Woher erhält man die benöthigte Menge von Holzasche? Will man sie beantworten, und dieses fällt nach meiner Theorie nicht schwer, so muß man derselben eine zweyte und dritte, und zwar: 1) aus was bestehet die ausgelaugte Holzasche überhaupt, und 2) woher erhalten die Gewächse

wächse diese Bestandtheile? entgegen setzen. Die Erfahrung zeigt uns, daß die Pflanzen die in ihnen vorzufindenden Erdarten: die Kalk-, Kiesel-, Alaun-, Bitter-, und Schwererde aus der Erde ziehen, in der sie stehen, und die Untersuchung: daß diese größtentheils die Kalk-, Alaun-, die Bitter-, und Kieselerde sey. Ich folgre nun aus dieser unumstößlichen Wahrheit: daß jeder Körper, jede Stein- und Erdart, welche die in der Asche befindlichen Erdarten in gleichem Verhältniß und gleicher Art besitzet, zur Ersetzung derselben, wenn er, gleich dieser, zu Staub gemacht wird, geschickt sey. Es wurde aus der erst angeführten Untersuchung besagter Asche ersichtlich, daß solche aus 21 Procenten Kiesel, 6 Procenten Thon, 10 Procenten Bitter, 57 Procenten Kalkerde, und 5 Procenten Eisen bestehe, und aus der in dem ersten Theil befindlichen Abhandlung über den Märgel und Kalk bekannt: 1) daß beynahe in jeder Märgelart auser Thon-, Kiesel-, und Kalkerde, auch Bittererde befindlich sey; 2) daß es Märgel von 50. 60 Procenten Kalkerde, 10. bis 20 Procenten Bittererde, 25. 30 Procenten Thon d. i. 6. 8 Procenten Alaunerde und 20. 22 Procenten Kieselerde, und 5. 6

Procenten Eisen gebe, und 3) daß viele Arten Steine von gleicher Zusammensetzung vorgefunden würden. Da also, wo Mangel an Asche ist, nehme man irgend eine in Menge vorhandene Erd- oder Steinart, und prüfe ein bestimmtes Gewicht, z.B. 1, 2, 300 Gran derselben, 1) mit Scheidewasser nach der im ersten Theil pag. 257. Anmerk. 69. angeführten Art; bemerke das Gewicht des Aufgelößten, und nehme 2) diese nehmliche Menge der zerriebenen Erd-, oder Steinart, übergiese sie statt des Scheidewassers mit so viel verdünnter Vitriolsäure (Acidum Vitrioli tenue.) als zur Sättigung nöthig ist, das ist: bis das Aufbrausen nachgelassen hat, und die Säure dem Geschmack nach vorsticht, und rauche alsdenn in einem gewöhnlichen Trinkglase oder Coffeeschaale, welche Gefäße man in eine Pfanne stellet, worinnen eines Messerrücken hoch gesiebter trockner Sand liegt, und sie so weit, als die Flüßigkeit reichet, mit dergleichen Sand behutsam umgiebt, die sämmtliche Vermischung bis zur Trokenheit ab. Nach dem Erkalten wird das Abgerauchte zu verschiedenen mahlen jederzeit mit 3. 4 mahl so viel Brantwein übergossen, und, wenn er einige Stunden darüber gestanden hat, durch Abnei-

gung

gung des Glases in einen besondern Gefäße gesammlet; zuletzt, nachdem man den abgegossenen Brantwein durch ein Filtrum zur Absetzung der Erde hat laufen lassen, das Unauflösliche vollends mit Brantwein, der mit noch einmahl so viel Regenwasser vermischt worden ist, ausgesüßt; in einem porzellainenen Gefäß bis auf 3. 4 Loth, um den allenfals mit aufgelößten Gyps davon zu scheiden, abgeraucht, und alsdann so lange in der Wärme, aufgelößte Pottasche hinzugesetzt, bis, wenn etwas weniges von der Vermischung auf ein zu diesem Versuch bestimmtes abgewogenes Filtrum gebracht wird, das davon abfiltrirte helle Flüßige sich durch einen abermahligen Zusatz von Pottasche-Auflösung nicht mehr trübet. Der Niederschlag wird hierauf erhitzt, auf das Filtrum gegossen, und so lange und oft mit heißen Wasser ausgelaugt, bis er und das davon fließende Wasser keinen Geschmack mehr hat, nach diesen aber stark getrocknet, und gewogen. Das Gewicht zeiget die in der Stein- oder Erdart befindliche Alaun- und Bittererde an, welches man von dem in Scheidewasser aufgelößten abziehet. Findet man nach dieser Untersuchung, daß die Stein- oder Erdart den Bestandtheilen nach mit den der Asche übereinkommen:

men, so läßt man solche entweder in einem Kalkofen brennen, und also gebrannt, oder mit Wasser nach bereits angeführter Art gemischt, auf die Felder in angezeigter Menge führen; oder aber auf einer Gyps-Mühle so zart als möglich zerstossen, und der Asche gleich mit dem Erdreich vermischen. Die Erfahrung, welche uns seit Jahrhunderten von der grossen 20. 30. auch 40 Jahre andaurenden Wirkung richtig gewählter Märgel-Arten gab, bestätiget diesen aus der Analogie der Körper erwiesenen, und von mir seit 3 Jahren vielfältig auf Aeckern und in Gärten erprobten Vorschlag. Gleichförmige, beynahe ganz mit der Seifensieder-asche übereinstimmende Wirkungen äusert auf den Feldern:

die Pottaschensieder-Asche.

Man gebrauchet und mischet sie mit Nutzen mit allen demjenigen Erdreich, welchen es an auflösbaren Theilen fehlet. Die von harten, vorzüglich von Buchenholz, ist die wirksamste; ihr folget die von den Weinreben; denn die von Eichenholz, und dieser die von den weichen Holzarten. Da ich zur Zeit noch nicht Gelegenheit hatte die Asche von allen denjenigen Holzarten

zu

zu erhalten, welche zur Feurung angewendet wer-
den, indem in der Gegend, in welcher ich lebe,
blos Buchen- und Eichenholz, und zwar nicht
selten beyde untereinander zu diesem Gebrauch
hauptsächlich angewendet werden; so bin ich
außer Stande die Grade der Güte durch Ver-
suche bestimmt anzuzeigen. Ich bemerke daher
blos: 1) daß die Asche von Buchenholz, wenn
sie ihres Brennbaren gänzlich beraubt, also von
weißer Farbe ist, sich ganz in Scheidewasser
auflößte; 2) daß sie größtentheils aus Kalk-
übrigens aber auch aus etwas Bitter- und
Alaunerde bestehe, und 3) daß in der Eichen-
holzasche, welche aber mit etwas Asche von Bu-
chenholz vermischt war, an 80 Procenten auf-
lösbarer Theile vorhanden waren. Da hier
überhaupt einfache Zerlegungen der verschiede-
nen Gattungen von Holzasche von keinem aus-
zeichnenden Nutzen seyn würden, indem die Asche
der Seifen- Pottaschensieder und Wäscherinnen
von verschiedenen Brennmaterialien herrühren,
und es dahero allezeit unumgänglich nothwen-
dig ist, solche vor deren Anwendung mit Scheide-
wasser zu prüfen; so wollte ich dießfals keine be-
sondere Versuche anstellen. Gebrauch und Wir-
kung ist übrigens, was die Asche von harten

Holz

Holz anbetrift, derjenigen der Seifensiederasche entsprechend, vorzüglich wenn man einen Zusatz von lebendigen Kalk gemacht hat, denn dieser zeiget wegen seiner durch die Calcination erlangten Eigenschaft: sich leichter als im rohen Zustande im Wasser aufzulösen, eine augenscheinliche Wirkung.

Salpetersieder-Asche

wird gleichfalls an mehreren Orten zur Verbesserung der Felder verwendet. Sie bestehet aus Erde und ausgelaugter Holzasche. Die Erde anbelangend, so ist diese bald kalk-, bald thonartig, indem man zur Ausfüllung der Ställe, deren Erde die Salpetersieder ausgraben, das nächste Erdreich als das beste, ohne Wahl anwendet. Mit der Asche hat es gleiche Bewandniß, denn diese wird bald da bald dort aufgekauft und kann dahero so wie das Erdreich entweder kalkartig, oder thonicht-kalkartig seyn. Unmöglich ist es also, hier bestimmt und mit Gewißheit von ihrem Gebrauch zu reden, und Maas, Gewicht und Feldart anzuzeigen; alles dieses muß erst durch die niemahls trügende Probe mit Scheidewasser erforschet und bestimmet werden.

Findet

Findet man nehmlich dergleichen Asche nach der Untersuchung arm an auflößbaren Theilen, so wird ihre Anwendung auf Felder der nehmlichen Art von sehr unbedeutenden Nutzen seyn, und die Unkosten nie vergüten. Man sey demnach vorsichtig in der Wahl, und bediene sich keiner andern als solcher, welche wenigstens 30 Procent Auflößbares besitzet. Zum Beschluß noch einen hieher gehörenden Vorschlag. Die weiße Farbe des Kalks, und die bey der Ablöschung desselben, wenn er gebrannt ist, entstehende Hitze, erzeugte bey einem sehr grossen Theil der Landleute den irrigen Gedanken: daß der Kalk ein wahrhaft schädlicher Körper sey, ein Körper der nicht allein, (und dieß der weißen Farbe wegen,) als ein Gift betrachtet, sondern auch aus allen und jeden Erdreich, worinnen nutzbare Gewächse gebauet werden sollen, falls er zufälliger Weise darinnen vorhanden, ausgesucht und ganz von solchen wegen seiner hitzigen, die Nahrungstheile verzehrenden Eigenschaft, entfernt gehalten werden müsse. Noch ganz ergeben diesen Wahne, wirft man dahero alle kalkartige Abgänge, worunter ich vorzüglich den Bauschutt verstehe, entweder in das Wasser, oder aber führ-

ret solchen auf öde unbenutzte Plätze. Um diesem schädlichen Verfahren einiger maßen Einhalt zu thun, und die so nützlichen brauchbaren Stoffe zu retten, rathe ich also an, alle kalkartigen Abgänge in besonders hiezu errichteten Gruben, welche von der Gemeinde oder Bürgerschaft angeleget werden müssen, zu sammlen und aus solchen die zum Auffüllen der Ställe, Keller ꝛc. benöthigte Erde jederzeit zu nehmen. Man würde auf diese Art eines der brauchbarsten Mittel zur Verbesserung thonichter - und sandichter thonichter Felder, Gärten, Wiesen und Weinberge, welche unter 30. 35 Procent auflößbarer Theile besitzen, erhalten; der nicht selten belästigende Bauschutt würde mit Vortheil und Nutzen untergebracht und die Erzeugung des Salpeters außerordentlich begünstiget werden.

III.

III.

Abhandlung

über die

Steinkohlen und Eisensteine.

Intrandum est in rerum naturam, et penitus, quid ea postulat, pervidendum.

CICERO.

I.

Abhandlung über die Steinkohlen.

Nur wenigen Lesern wird es unbekannt seyn, daß unter dem Namen: Steinkohle, eine schwarze, dichte, feste, zerbrechliche, brennbare Substanz, von mäßiger Härte, blättrichten Gewebe, und mehr oder weniger glänzendem Ansehen verstanden werde; daß sie aus dem Mineralreich herstamme, und theils zur Feurung statt des Holzes und Torfes, theils auch, wenn sie mit vielem Schwefel versehen, zur Verfertigung des Vitriols und Alauns verwendet werde. Man findet dreyerley Arten und verschiedene Gattungen derselben. Die eine Art hinterläßt nach dem Verbrennen eine Asche; die andre eine Schlacke, und die dritte behält ihre Gestalt und gewissermassen ihre Härte bey. Erstere Art enthält das meiste Steinöhl, und brennt, je nachdem solches in einem mehr oder mindern dichten Zustande, z. B. als Oehl oder

Asphalt darinnen vorhanden ist, lebhaft oder langsam. Das specifische Gewicht der hieraus entstehenden verschiedenen Gattungen ist: 1, 4. bis 1, 37. Sie geben alle durch die Destillation a) fixe Luft; b) eine saure Flüßigkeit; c) brennbare Luft; d) ein leichtes, dem Steinöhl ähnliches Oehl; e) ein flüchtiges Laugensalz, und f) ein dichtes pechiges Oehl. Das Rückbleibsel ist beynahe $\frac{3}{4}$ des Ganzen, und giebt durch die Einäscherung 6 höchstens 16 hundert Theile Asche, wovon 4 Eisen, das übrige aber Thonerde ist. Die zweyte Art bestehet aus der erstern mit einem merklichen Theil Eisenkies und Erde größtentheils der Kalk- und Bittererde vermischt. Sie brennt mit einem Schwefelgeruch und läßt eine Schlacke zurück. Das Wasser wirkt auf solche, d. i. löset die darinnen befindliche luftleere Kalkerde auf. Ihre specifische Schwere ist 1, 5. Man verfertiget aus ihr häufig Vitriol, Alaun und auch etwas Bittersalz. Die dritte Art ist in Deutschland, so wie die vorhergehende vorzüglich zu Hause, und dient zu gleicher Absicht. Ihre Grundlage ist Erde, nehmlich: Märgel, Schiefer oder Gneus. Es sind diese Steinarten, so stark von Schwefel, Bergöhl

oder Erdharz durchdrungen, daß sie, gleich einer Kohle, so lange brennen, als nur von besagten brennbaren Theilen etwas vorhanden ist. Der bittererdichte Märgel bildet am häufigsten diese Kohlenart. Was den ökonomischen Gebrauch und die Wirkungsart dieser Kohlen überhaupt anbetrift, so ist dieser verschieden. Von ersteren Arten verwendet man vorzüglich die Asche und den Ruß, welche gleich dem Haalbötzig gebraucht werden, und erzielet dadurch: 1) durch die Asche, welche aus Thonerde und etwas Eisen bestehet, auf Feldern: die 20. 30. 40 Procente in Scheidewasser oder aber 5. 10 Procent in Vitriolöhl auflößbarer Theile besitzen und in beyden Fällen arm an dieser Erdart sind, bey Gewächsen: welche, wie beynahe alle neben andern Erdarten dieser Erde, die Thonerde nehmlich, zur Nahrung verlangen; und 2) durch den Ruß (der aus zarter Erde [allerdings hier der Alaunerde]; flüchtigem Laugensalz und Brennbarem zusammengesetzt ist) eine aus dem bereits gesagten leicht erklärbare, sichtbare materielle Wirkung. Die zweyte und dritte Art wird insgemein gleich dem Gyps gemahlen oder gepocht, und so wie dieser

auf Wiesen, Klee- und Saamenfelder im Frühjahr oder Herbst ausgestreut. Die Wirkung hievon ist so auffallend und andaurend, daß sie die durch Gyps zu erlangende bey weitem überwiegt, und daher einer genauern Betrachtung allerdings würdig ist. Die gewöhnlichsten und vorzüglichsten Bestandtheile der Getreidearten und Futterkräuter sind: Kalk-, Thon-, Bittererde, Eisen, vitriolichte, laugenhafte und salzgesäuerte Salze: Körper, woran der größte Theil der Felder Mangel leidet, daraus aber die mehrsten Gattungen Steinkohlen zusammengesetzt sind, mithin wirklichen Ueberfluß haben. Wir finden nehmlich in ihnen: Kalk-, Bitter-, Thonerde, Eisen, und, nachdem der Schwefel verwittert ist, Vitriolsäure zur Bildung der mehrmahls angezeigten vitriolichten Salze: des Gypses, vitriolisirten Weinsteins ꝛc. Werden also zu Staub gemachte Steinkohlen oder deren Brandschiefer auf Aecker oder Wiesen gestreuet; so fängt ein Theil des in denselben vorhandenen Schwefels an zu verwittern, das Brennbare entweicht, und die nun freye Vitriolsäure (denn der Schwefel besteht aus Vitriolsäure und Brennbarem) verbindet

bindet sich, nachdem ein Regen gefallen ist, mit etwas Kalkerde, bildet dadurch den Gyps, und wird von denjenigen Gewächsen, die solchen oder aber vitriolichte Salze zur Nahrung bedürfen, aufgenommen; die übriggebliebenen von der Säure nicht berührten Erdarten aber werden, nach Maasgabe ihrer mehr oder mindern Zartheit und der Menge des fallenden Regens, entweder aufgelößt oder unaufgelößt in diejenigen Pflanzen-Fasern, welche zu ihrer Aufnahme geschickt sind, oder technischer gesprochen: sie zur Nahrung bedürfen, eingeführt. Ein Feld, das also arm an diesen Erdarten war, und worauf Gewächse, welche solche unumgänglich nöthig hatten, aus Mangel dürftig aufwuchsen, wird, da dieser Mangel gehoben oder das Fehlende durch sie ersetzet worden; so lange noch für dergleichen Gewächse sich fruchtbar zeigen, als von den angezeigten Erdarten und dem mineralischen Salze: der Vitriolsäure, eine hinreichende Menge vorhanden ist. Es erhellet demnach aus dem bishero Angeführten: 1) daß die Wirkung der Steinkohlen auf eine materielle Weise geschehe; 2) daß sie stärker, anhaltender, und 3) ihre An-

wendung, wegen der angezeigten Erdarten, sicherer und minder gewagt sey, als die des Gypßes; 4) daß die Bestandtheile der Kohlen oder des Brandschiefers zuvor untersucht und bestimmt werden müssen, damit man nicht statt kalkicht-bittererdichter Kohlen, welche thonichter Art, auf thonichte Gründe, und kalkicht-bittererdichte Kohlen auf kalkichten Feldern, anwende; 5) daß man da, wo Steinkohlen mangeln, aus 3 Theilen bittererdichten Märgel und 1 Theil Gyps, oder aber aus eben so viel bittererdichten Thonmärgel und Gyps, eine Vermischung gleicher Art verfertigen könne; 6) daß man nächst diesen auf die Bedürfnisse der zu erbauenden Pflanzen Rücksicht nehmen, und 7) die Kohlen so frühzeitig als möglich aufstreuen müsse. Um die Gewächse namentlich zu bestimmen, welche durch beyde Arten von Steinkohlen, der kalk- und thonartigen genähret werden, so sind diese, was die Kohlen, Schlacken oder Brandschiefer der ersten Art anbetrift: alle Arten Klee; alle Grasarten und Futterkräuter; alle Sommer- und Winterfrüchte, Halbkorn, Einkorn und Dinkel (den französischen sowohl als deutschen) wenn das Erdreich über 20 Procente in Scheidewasser auflößbarer Theile führet, abgerechnet;

net; und die der zweyten Art: der Sommer- und Winterdinkel, Einkorn, Heidekorn (Buchweizen), und übrigens alle Kleearten, Futterkräuter, Sommer- und Winterfrüchte, Hülsen- und Schottengewächse, wenn solche in einem Erdreich stehen, das der Probe mit Vitriolöhl und Scheidewasser zufolge, nach ersterer unter 20 Procent, und nach letzterer über 30 Procent auflößbarer Theile führet. Werden übrigens die Steinkohlen nur alle 2. 3 Jahre in nicht allzugroßer Menge, etwa 4 Centner auf den Morgen zu 180 Ruthen gerechnet, aufgestreuet; so werden, wenn auch der erdichte Theil derselben unwirksam bleiben muß, die salzichten und metallischen Theile: die Vitriolsäure, das flüchtige Laugensalz und das Eisen, fruchtbare Wirkungen äußern.

II.

Abhandlung über die Eisensteine.

Herr v. Cancrin gibt in seinen vermischten ökonomischen Schriften eine neue Art Wiesen zu düngen an, und versichert, daß er sich derer mit sichtbarem Nutzen, auf schlechten sowohl als guten Wiesen, bedienet habe. Das Dungmittel

ist der Eisenstein, und seine Art es zu gebrauchen folgende. Eisensteine, von welcher Art sie auch seyn, werden entweder, wenn man Gelegenheit hat, ein nasses Pochwerk zu errichten, gepocht und (es versteht sich da wo es die Lage erlaubt) das davon gehende trübe Eisenwasser, durch Hülfe eines langen Wässerungsgraben auf die Wiesen geleitet, das übrige Kleingepochte als Schlamm darauf geführet, oder aber zu Staub gemacht im Frühjahr auf die Wiesen gestreuet. Die Art diese zum Theil sehr harten Steine klein zu machen, kann nach seiner Meynung 1) durch das Rösten mit Holz und Gesträuche und 2) durch das Pochen geschehen. Da beyde Arten allzubekannt sind, als daß sie hier eines Auszugs verdienten, so führe ich blos den Nutzen an, den er durch ihren Gebrauch erzielte: 1) mit Moos und schlechten Grassorten versehene Wiesen lieferten wilden Klee, wilde Wicken und süsse Grasarten in grosser Menge, und 2) Wiesen welche mit arsenikalischem, von den Bergwerken herrührenden Schlamm, ganz bedeckt und dadurch unnütze gemacht worden waren, wurden wieder hergestellt. Um sowohl von der Gültigkeit dieses meines Bewustsenns

und des noch nicht durch die Nachahmung bestätigten Vorschlags richtig urtheilen zu können, als auch diejenigen Arten und Gattungen der Eisensteine kennen zu lernen, welche auf diese oder jene Feldart, dieß oder jenes Gewächs, mit unausbleiblicher gewisser Wirkung zu verwenden sind, da nicht das Eisen allein, sondern vielmehr die bey demselben befindlichen Erden und metallischen Salze den erzählten Nutzen bewirken, so wollen wir 1) nach der in dem ersten Theil angeführten Tabelle, von den Bestandtheilen der Gewächse, diejenigen Arten derselben ausheben, welche den Mineralogen bekannt, und mit diesen übereinstimmend sind, und denn 2) die Gewächse nennen, auf welche sie mit Nutzen angewendet werden können. Man verstehet eigentlich unter dem Namen Eisenstein, nur diejenigen Steinarten, in welchen Eisen nach dem Verhältniß von 30 oder mehreren Theilen im Hundert vorgefunden wird, da aber Erze oder Eisensteine dieser Art dem Oekonomen nur selten überlassen werden, und minder reichhaltige zu gleichem Endzweck führen, so zeige ich hier nur diejenigen Arten an, welche 15. 20. bis 30 Procent Eisen besitzen.

Erste Art.

Weißes oder spatiges Eisenerz, Stahlstein.

Die Farbe desselben ist, frisch gegraben, weißlich, an der Luft aber wird sie grau, braun, zuletzt röthlich, gelblich oder schwarz. Die Gestalt ist zu Zeiten würflicht, das Gewebe blätricht, schuppicht, körnicht auch zellenförmig; wird es im staubichten Zustande gefunden, so ist es schwärzlich braun. Es braußt mit Säuren, besonders wenn es zerstossen ist, und gibt 20. 27. Procent fixe Luft, 100 Theile aber geben 50 Theile Kalkerde, 24 Braunstein und 22 Theile Eisenkalk.

Zweyte Art.

Graues Eisenerz

Hat ein glänzendes metallisches Ansehen, giebt gemeiniglich mit dem Stahl Feuer, ist nicht im geringsten magnetisch und zeigt geschabt eine rothe Stelle. Es bestehet aus Eisenkalk und Wassereisen, oder aus Eisenkalk und Phosphorgesäuerten Eisen.

Drittes

Dritte Art.

1) Hochländische Thonerze.

Diese sind gelb, roth, braun oder gräulich, verhärtet und zerreiblich, oder locker und staubicht, oder in Körnern. Sie bestehen aus dem grauen Eisenerz, in lockerer Gestalt mit Alaunerde oder Thon vermischt, und enthalten daher Wassereisen und öfters Braunstein. Die in Säuren auflößbarsten sind die besten.

2) Sumpfichtes Eisenerz.

Dieß Erz ist trocken, braun oder bräunlichschwarz und zerreiblich. Es ist mit Thon und einer extraktartigen Materie vermischt, und bestehet aus ¼ Wasser, etwas Luftsäure und flüchtigem Laugensalz. Es ist die vorzüglichste Mutter des Wassereisens und führet auch zu Zeiten vielen Braunstein.

Vierte Art.

Bittersalzichtes Eisenerz.

Ist ein mit Eisen überladener Serpentin, und bestehet also ohngefähr aus 25. 30 Procent Bittererde, aus 8. 10 Procent Thon, übrigens aber aus Kieselerde und Eisen, zu Zeiten auch aus Schwererde, Gyps und Kalkerde.

Fünfte Art.

Eisenkieß.

Bestehet aus Schwefel, Thon und Eisenkalk, gibt mit dem Stahl Feuer und ist bald blaßgelb, bald röthlich braun. Es erhellet von selbst aus diesen bisher angeführten Bestandtheilen der Eisensteine, worunter ich die Erdarten und metallisch salzichten Theile: Kalk-, Bitter-, Thon und Schwererde, phosphorgesäuertes Eisen und Braunstein, verstehe, welche gleich dem Eisen müssen in Anschlag gebracht werden, wie wichtig deren bishero unterlassener Gebrauch für den Feldbau einst werden könne, wenn man vorsichtig bey deren Wahl zu Werke gehet. Eisen und Phosphorsäure sind zwey vorzügliche Bestandtheile der Gewächse, und wie viele Arten Steine besitzen diese nicht? da also wo Eisensteine, vorzüglich Wasserbley enthaltende Steine, in billichem Preis zu haben sind, versäume man deren Anwendung nie, nur mische man allezeit den Staub derselbigen, wovon 2 Centner auf einen Morgen von 180 Ruthen hinreichend genug sind, mit Kalk, Gyps, Märgel, Thon oder Haalbötzig und streue ihn im Früh- oder Spätjahr gleich

dem

dem Gyps auf Wiesen, Klee- und Saamenfelder. Die erste, zweyte und vierte Art wird auf Roggen, Weizen, Dinkel, Gersten, Hafer, Hirse, Linsen, Erbsen, auf Brabander- Türkischen- und Luzerner Klee und alle übrige Arten Futterkräuter, und die dritte und fünfte Art, auf alle Gewächse, wenn solche in einem Erdreich stehen, das unter 20 Procent in Vitriolöhl auflößbarer Theile besitzet, in gemeldeten Gewicht gestreuet, die unverbesserlichste Wirkung hervorbringen. Sollten übrigens bey allenfalsiger Beherzigung, dieses bereits erprobten Vorschlags, chymische Untersuchungen der vorhandenen Eisensteine mangeln: so sind die beyden Proben mit Scheidewasser und Vitriolöhl, zur Prüfung der Eigenschaften derselben, hinreichend. Man durchglühe nur ein Stück des von der allenfalls anklebenden Erde gesäuberten Eisensteines, zerstosse solches, nehme dann 5 Quint hievon zu der Probe mit Scheidewasser, und eben so viel zu der mit Vitriolöhl. Nach der Vergleichung des Aufgelößten, wovon das Scheidewasser die Kalk-, Bitter-, Alaunerde und das Eisen, das Vitriolöhl aber die Bitter-,

Alaunerde und das Eisen anzeiget, wird man, ohne zu irren, aus der mehr oder mindern Menge desselben sowohl die Güte und Brauchbarkeit des Eisensteins als auch die Feldart, worauf er mit Nutzen verwendet werden kann, zu bestimmen im Stande seyn.

IV.

IV.

Abhandlung

über den

Rind = Pferd = und Schaafmist.

Quaelibet res nihil praeſtare poteſt praeter id, quod in ſe eſt et continet.

GEBER.

I.

Abhandlung über den Rindviehmist.

Ehe ich anfange, von dem Gebrauch und Mißbrauch, dem Nutzen und der Wirkungsart dieses so sehr bekannten Dungmittels zu reden; ehe ich der ihm an Bestandtheilen und Wirkung gleichenden Mittel erwähne, will ich zuerst die mit solchen im verfaulten und unverfaulten Zustande vorgenommenen Untersuchungen erzählen, und alsdann aus den Resultaten derselbigen obigen Plan zu erfüllen mir Mühe geben. Ich nahm 2 Pfund und 20 Loth verfaulten Rindmist, welcher von fetten Ansehen und viel versprechender dunkelbrauner Farbe war; der über Winters gelegen hatte, aus der Mitte der Miststätte genommen war, und, nach dem Ausspruch mehrerer dungerfahrner Landwirthe, unter die vorzüglichsten in Ansehung der Güte gerechnet werden dürf-

te *): brachte ihn in eine kurzabgesprengte samt dem Helm abgewogene Phiole, versah solche mit einer Vorlage, an welcher ein Luft-Apparat befindlich war; fieng die Destillation bey gelindem Feuer an, und verstärkte solches nach und nach innerhalb 24 Stunden bis zum Glühen der Capelle. Nachdem bey diesem Grade des Feuers die Vorlage anfieng zu erkalten, und weder Luft noch Wasser mehr übergieng, ließ ich das Feuer ausgehen. Den andern Tag nahm ich den Luft-Apparat ab, und fand in solchem 34 Decimal-Cubikzolle entzündbarer, und 3 Zoll fixer Luft, in der Vorlage aber 32½ Unze (65 Loth) wässerichter Flüßigkeit, die braun von Farbe, empyrevmatisch an Geruch, und, vorzüglich aber, daß die Flächen des Glases und des Helmes, mit $\frac{5}{8}$ Loth eines schwarzen Theer ähnlichen Oehls bedecket waren. Ich sammelte dieses Oehl mit Hülfe einiger Loth Weingeist so gut als es geschehen konnte, schüttete es in eine kleine

*) Zur Einstreu dieses Mistes waren Blätter von Buchen- und Eichenholz und etwa 1/3 Stroh: zum Futter des Viehes aber dreyblättrichter und Luzerner Klee, Wiesenheu und geschnittenes Gerstenstroh genommen worden.

kleine Phiole, worinnen 2 Loth destillirtes Wasser befindlich waren, versah solche mit Helm und Vorlage, und fieng, nachdem die Fugen mit Blasen bestens verschlossen waren, die Destillation bey gelindem Feuer an: ich erhielt, nach deren Beendigung, $\frac{1}{3}$ Quint eines hellgelben, dem rectificirten Hirschhornöhl (Oleum animale Dippelii) gleichenden, also höchst unangenehm riechenden Oehls. In der Phiole blieb eine schwarze schwammichte Materie zurück, welche ich samt der, in der großen Phiole befindlichen 17 Loth schweren Kohle verbrannte, die davon erhaltene graue Asche, welche 9 Loth am Gewicht hatte, und nicht den mindesten salzichten Geschmack besaß, sammelte, und zu den folgenden Versuchen aufbewahrte. Was das Destilat anbetrift, welches in der Vorlage befindlich war, so verhielt sich solches mit gegenwirkenden Mitteln also: 1) Mit Lacmus blau gefärbtes Papier veränderte, wenn es damit angefeuchtet wurde, seine Farbe nicht; es enthielt dahero kein freyes saures Salz. 2) Mit Curcuma gelb gefärbtes Papier wurde dadurch augenblicklich dunkelbraun, es war also freyes flüchtiges Laugensalz vorhanden; 3) einige

Stückchen corrosivisches Queckſilber (Mercurius ſublimatus corrosivus) färbten die Flüſſigkeit rothbraun; 4) ein mit Salpeter- ſo wie mit concentrirter Eßigſäure naßgemachter gläſerner Stöpſel wurde, über ſolches gehalten, augenblicklich von rauchähnlichen Dämpfen umgeben, welche ſich um ein beträchtliches vermehrten, wenn zu denſelben etwas von der Weinſteinſalz-Auflöſung getröpfelt wurde. Beyde Verſuche beſtätigen das Daſeyn des flüchtigen Laugenſalzes, und zeigen die Gegenwart eines flüchtigen Mittelſalzes an. 5) Durch Eiſenvitriol erhielt es eine ſchwärzliche Farbe, welche adſtringirenden Stoff, d. i. Weinſtein-Phosphorſäure und flüchtiges Laugenſalz anzeigte. 6) Die Auflöſung der Bittererde in Salzſäure wurde davon zum Zeichen eines vorhandenen freyen flüchtigen Laugenſalzes gefällt. 7) Mit Säuren braußte es ziemlich ſtark. 8) Mit Salzſäure geſättigt und dann mit ſchwerſpaterde Auflöſung vermiſcht, erfolgte kein Niederſchlag; es war alſo Vitriolſäure nicht vorhanden, und 9) ſetzte man die Auflöſung des Silber-Vitriols hinzu, ſo zeigten ſich Spuren eines Niederſchlags, welche die

Gegen-

Gegenwart der Salzsäure anzeigten. Diesen Versuchen zufolge sind die Bestandtheile dieses wässerichten Destilats: 1) flüchtiges Laugensalz, und 2) vegetabilische und mineralische Neutral- oder Mittelsalze. Oder aber diese Körper einzeln betrachtet: 1) Flüchtiges Laugensalz; 2) Phosphorsäure; 3) Weinsteinsäure; 4) Salzsäure. Um mich mit der Menge des flüchtigen Laugensalzes genauer bekannt zu machen, nahm ich die von den erst erzählten Versuchen noch übrige Hälfte, also 32 Loth, Destillats, brachte sie in eine Phiole, in welcher ein halbes Loth Weinsteinsalz zur Zerlegung der ammoniakalischen Mittelsalze, welche dem 4ten Versuch zufolge vorhanden seyn mußten, befindlich war, legte eine Vorlage an, und zog die Feuchtigkeit bis zur Trockne ab. Das Abgezogene sättigte ich mit Salzsäure, und hatte hierzu 1½ Loth nöthig; sättigte alsdenn ein gleiches Gewicht der Salzsäure mit wässerichtem Salmiakgeist, inspissirte die Lauge bis zur Trockne, und erhielt $\frac{5}{8}$ Loth getrockneten Salmiaks. Da nun nach den angestellten Versuchen 100 Theile Salmiaks 40 Theile trocknes flüchtiges Laugensalz besitzen; so enthalten 32 Unzen dieses Destillats

2 Quint trocknes flüchtiges Laugensalz. Was die vorhin erwähnte Asche anbetrift, welche aus den Kohlen erhalten wurde; so laugte ich 4 Loth derselben mit verdünntem Brantwein zur Hinwegnahme der alkalischen Salze, deren Daseyn bey wässerichten Extractionen außer diesem die Zerlegung des allenfalls vorhandenen Gypses und sonstiger erdichten Salze erzielet, aus, kochte alsdenn die ausgelaugte Erde zweymahl, jederzeit mit 2 Pfund destillirten Wassers, brachte sie auf ein abgewogenes Filtrum und goß abermahl, theils zur Reinigung des Gefäßes, theils zur Aussüßung der Erde, 1 Pfund dergleichen heises Wasser nach; ich hatte also überhaupt 5 Pfund Wasser zur Auslaugung verwendet. Nach dieser Beschäftigung wurde 1) die geistige, und dann 2) die wässerichte Auflösung zur Ausscheidung der in denselbigen befindlichen Salze vorgenommen. Was die erstere anbetrift, so zog ich in einer kleinen Phiole im Sandbad den Brantwein ab, trocknete das Zurückgebliebene in einer abgewogenen porzellanenen Schaale vollends ein, und erhielt 5 1/2 Gran eines alkalisch schmeckenden Salzes. Diese 5 1/2 Gran übergoß ich mit höchstrectificirten

cirten Brantwein; sammelte das unaufgelößte in einem Filtro, dessen Gewicht mir bekannt war, und fand es nach dem Trocknen 2 Gran schwer; es war nach angestellter Probe Kochsalz. Den abfiltrirten Brantwein ließ ich an der Luft, um die darinnen allenfalls vorhandenen Mittelsalze durch die Crystallisation davon zu scheiden, verrauchen. Da sich aber nichts Crystallisirtes zeigte, so sättigte ich dieß eingetrocknete bräunlichte Salz mit verdünnter Vitriolsäure, und erhielt durch die Crystallisation 5 Gran vitriolisirten Weinstein, oder aber 4 Gran vegetabilisches Laugensalz. Die geistige Auflösung hatte also 2 Gran Kochsalz und 4 Gran vegetabilisches Laugensalz aufgenommen. Die zweyte Auflösung, welche aus 4 Pfund Flüßigkeit bestund, anbelangend, so rauchte ich diese zur gänzlichen Trockne ein, und erhielt 14 Gran einer weißgrauen nur wenig salzicht schmeckenden Erde. Diese Erde laugte ich kochend mit sehr vielem destillirten Wasser aus, filtrirte die Auflösung noch warm, sammelte das Unauflößbare in einem Filtro und fand es 2 Gran schwer; es war, wie die Untersuchung zeigte, reine Kalkerde. Die filtrirte Auflösung

inspissirte ich bis auf 2 Loth, trennte die während dieser Abrauchung niedergefallenen weisen Crystallen, welche nach dem Aussüßen mit Weingeist 8 Gran wogen und reiner Gyps waren, und schied durch Hülfe der Crystallisation aus der noch vorhandenen Flüssigkeit, 4 Gran vitriolisirten Weinstein. In 2 Pfund 20 Loth dieses Düngers waren daher an fixen Salzen vorhanden: 4 1/2 Gran Kochsalz; 9 Gran vegetabilisches Laugensalz d. i. Pottasche; 9 Gran vitriolisirter Weinstein, und 18 Gran Gyps. Nach dieser Bearbeitung gieng ich zur Untersuchung der ausgelaugten Erde oder Asche über. Ich nahm von ihr 105 Gran, vermischte solche mit 300 Gran Weinsteinsalz, welches ich aus Weinsteincrystallen verfertiget hatte, ließ die Vermischung in einem porzellanenen Tiegel einige Stunden glühen, brachte sie alsdann in ein geräumiges mit einer Schnauze versehenes Glas, worinnen destilirtes Wasser befindlich war, sättigte solche mit Salzsäure und überschüttete sie mit reiner Salpetersäure, erhitzte alsdann die Auflösung, welche eine grünlichte Farbe hatte, bis zum Kochen, goß durch Abneigung die obenstehende helle Flüßigkeit in

ein

ein besonderes Glas, süßte das Unaufgelößte mit heissem Wasser aus, filtrirte die Auflößung und trocknete das Zurückgebliebene. Es wog nach dem Glühen 48 Gran, und war reine Kieselerde. Um zu erfahren: ob nicht Schwererde in dieser Auflößung vorhanden sey, mischte ich zu ihr, nachdem ich 1 Maas Wasser zugesetzt hatte, etwas verdünnte Vitriolsäure, da sich nach Verlauf einiger Stunden etwas weniges weißen Niederschlags auf dem Boden des Glases gelagert hatte; so fügte ich noch ein Quint Vitriolsäure bey, ließ die Vermischung über Nacht ruhig stehen, filtrirte sodann die Lauge, süßte den erhaltenen Schwerspat aus, zerlegte ihn mit Laugensalz und erhielt 2 Gran luftvolle Schwerspaterde. Die filtrirte Auflößung rauchte ich hierauf bis auf 3 Loth ab, setzte 1 1/2 Loth zerfallenes Glauberfalz bey, trocknete die Vermischung ein, und übergoß sie nach dem Erkalten, zur Ausziehung der Salz- und Salpetergesäuerten Erden und Metalle, so lange mit einer Mischung aus rectificirten Branntewein und Wasser, bis dieselbe mit Weinsteinsalzauflößung vermischt keine Erde mehr fallen ließ. Den hier im Filtro zurückgebliebenen Gyps befreyte

ich

ich von dem noch anklebenden Glauberſalz, löſte ihn dann in kochendem Waſſer auf, präcipitirte die ihn formirende Kalkerde mit zerfloſſenem Weinſteinſalz, weil luftleeres flüchtiges Laugenſalz keinen Niederſchlag bewirken konnte, ſüßte ich ſolche aus, und trocknete ſie; ihr Gewicht war: 31 1/2 Gran. Zur geiſtigen Auflöſung ſetzte ich, zur Ausſcheidung des Eiſens, ſo lange Blutlaugenſalz, bis ſolches aus der zur Probe abfiltrirten Lauge keine blaue Farbe mehr zu ſcheiden fähig war. Ich ſüßte alsdann den blauen im Filtro zurück gebliebenen Niederſchlag aus, durchglühete ihn in einem abgewogenen Tiegel, und erhielt 9 Gran Eiſenkalk, wovon 4 Gran dem Blutlaugenſalz, welches 20 Procent Eiſen führte, zugehörten. Da ich theils der Farbe, theils dem Geruch der zur Auflöſung angewendeten Salzſäure nach, Braunſtein zu erwarten hatte, ſo ließ ich den Eiſenkalk mit friſcher Seifenſiederlauge auskochen, ſo warm als möglich filtriren, das Unauflöſsbare ausſüßen, das Abfiltrirte aber 8 Tage lang ſtehen. Es hatte ſich nach Verfluß dieſer Zeit etwas weniges braunes Pulver, das Braunſtein war, niedergeſetzt, welches geſammelt, ausgeſüßt und getrock-

trocknet 3/4 Gran wog. Es blieben demnach 4 1/4 Gran Eisen zurück. Obige, vom blauen Präcipitat abgesonderte Flüßigkeit vermischte ich nun mit vegetabilischem Laugensalz, ließ sie einigemal aufkochen, übergab alsobald den Niederschlag einem Filtro, süßte ihn mit heißem Wasser aus und wog ihn nach dem Trocknen: er hatte 20 1/2 Gran am Gewicht. Die Hälfte dieses so eben erwähnten Niederschlags löste ich in Vitriolsäure auf, und präcipitirte aus der ohngefähr 2 Loth betragenden erhitzten Auflösung, bey gehöriger Vorsicht, mit wohl getrockneter Bittererde 7 Gran schwerauflößlichen Alauns, der mit Laugensalz zerlegt, nach dem Aussüssen und Trocknen 3 1/4 Gran Alaunerde zurück ließ; die von diesem übrige Auflösung aber schlug ich mit fixem Laugensalz nieder, und erhielt, wie gewöhnlich behandelt, nach Abzug der hinzugesetzten Erde, 7 Gran reiner Bittererde. Die Bestandtheile der 105 Gran ausgelaugter Asche waren demnach: 1) 3 1/4 Gran Eisenkalk; 2) 2 Gran Schwererde; 3) 3/4 G. Braunstein; 4) 31 1/2 G. Kalkerde; 5) 6 1/2 G. Alaunerde; 6) 14 G. Bittererde; 7) 48 G. Kieselerde.

Nimmt man die sämmtlichen Bestandtheile dieses Düngers zusammen; so betragen solche im Centner, oder in 105 Pfund 1360 Decimalzolle entzündbarer Luft; 120 Decimalzolle fixer Luft; 81 Pfund Wasser; $3\frac{4}{12}$ Loth Oehls; 21 Loth flüchtigen Laugensalzes; 21 Pfund 28 Loth Kohle, diese Kohle aber: 10 Pfund 31 Loth 2 2/3 Quint Erde und 8 Loth 1 1/3 Quint Salz; oder bestimmter gesprochen: 3 Loth Gyps; 1 Loth 2 Quint vitriolisirten Weinstein; 3 Q. Kochsalz; 1 L. 2 Q. vegetabilisches Laugensalz; 6 L. 2 2/3 Q. Schwererde; 3 Pf. 11 L. Kalkerde; 1 Pf. 15 L. 2 Q. Bittererde; 22 L. 1/2 Q. Alaunerde; 5 Pf. 3 L. Kieselerde; 2 L. 2 1/5 Q. Braunstein; 12 L. 2 5/6 Q. Eisen.

Die öhlichten Theile verhalten sich daher zu den erdichten wie 1 zu 141, und die salzichten zu den erdichten, wie 2 1/2 zu 141. Nach dieser Angabe überkommt ein Morgen von 400 Ruthen (zu 12 Schuh) Feldes, wenn er, nach Herrn von Pfeiffers Berechnung, 12 Fuhren oder 312 Centner wohl verfaulten Mists erhält, an erdichten Theilen 3435 Pfund; an feuerfesten Salzen, worunter der die Hälfte des Gewichts

wichts ausmachende Gyps gerechnet ist, 81 1/4 Pfund; an flüchtigem Laugensalz 204 3/4 Pfund, und an destilirtem empyrevmatischen Oehl 29 Pfund 28 Loth. Da man mit Rindmist gewöhnlich alle 3 Jahre, mit Märgel aber nur nach Verfluß von 30 auch 40 Jahren zu düngen genöthiget ist, so ist man hieraus zu folgern berechtigt: daß ein Feld durch die Bemärglung 10. 12mahl so viel erdichter Theile erhalten müsse, als es durch die Düngung mit Mist erhält. Da nun nach Herrn von Pfeiffers Angabe 30. 40 Wagen Märgels (zu 4 Pferden berechnet), womit ein Morgen Feldes einen halben Zoll hoch überfahren werden kann, dem Gewicht nach 900 Centner Erde gleich sind, von diesen aber noch 1) die bey demselben befindlichen unauflöslichen verhärteten Steine; 2) der der Erfahrung zufolge jährliche Verlust an Erde, welchen ein Acker, der mit Mist annoch verbessert werden kann, durch die Gewächse erleidet; 3) die in dem für Ackergewächse unbrauchbaren Erdreich sich zerstreuenden Erdarten; 4) der Abgang der gehörigen, den Erdarten aus dem Mist gleichkommenden Trockne, und 5) das zehenfach zu berechnende angegebene

Gewicht

Gewicht der Misterde abgezogen werden müssen; so wird man, wenn Ersteres zu 1/5 oder 200 Ctr.; das Zweyte jährlich zu 10 Ctr.; das Dritte zu 100 Ctr.; das Vierte zu 50 Ctr. und das Fünfte zu 347 Ctr., annimmt, die Andauer der Wirkung des Märgels und des Mistes in Vergleichung mit deren Gewicht, so ziemlich gleichförmig finden; denn 200 + 300 + 100 + 50 + 347 entspricht 990 Centnern. Es verstehet sich aber, daß man keine andere Gattung Märgels annehme, als eine solche, die nicht unter 60 Procenten in Scheidewasser auflösbarer Theile besitzet, denn nur durch diese wird bey denjenigen Gewächsen des Ackerbaues, welche man am häufigsten anbauet, die besagte 30. 40jährige Wirkung erzielet.

II.

Abhandlung über den unverfaulten Kühmist.

Die bey vorhergehendem Versuch Nro. 1. angewendete Phiole wurde mit einer, dem Maas nach gleichen Menge ganz frischen Kühkoths angefüllt und mit einer Vorlage versehen. Ich

hatte

hatte hierzu 3 3/4 Pfund, also 1 Pfund 4 Loth mehr, als ich Rindmist bedurfte, nöthig *). Nachdem Vorlage und Phiole mittelst nasser Blasen genauest verbunden worden waren, fieng ich die Destillation bey dem gehörigen Grade des Feuers an, und setzte unter beständiger Erhöhung desselbigen, solche so lange fort, bis weder Dämpfe noch Tropfen, auch bey dem heftigsten Feuer, mehr übergiengen. Hierauf nahm ich Vorlage und Helm ab, und fand in ersterer: 3 Pfund 13 Loth einer blaßgelben nach Hirschhorngeist riechenden Flüßigkeit, und bey dieser 1 Loth schwarzes schmieriges Oehl von gleichem Geruch; in der Phiole aber 10 Loth einer schwammichten Kohle. Um zu erfahren, aus was für Theilen diese erhaltene Flüßigkeit bestünde, prüfte ich solche: 1) mit aufgelößtem Weinsteinsalz; 2) mit verdünnter Salzsäure. Es entstund aber durch keines von beyden das mindeste Aufbrausen; 3) mit Lacmus, und 4) mit Curcuma gefärbtem Papier. Es blieben beyde, das blau und gelbgefärbte Papier

*) Die Kuh war mit dreyblättrichtem Klee und Roggenstroh gefüttert worden.

pier in Ansehung der Farbe unverändert. 5) Mit Schwerspaterde-Auflösung in Eßig: es erfolgte aber keine Trübung, kein Niederschlag; ein gleiches erfolgte 6) mit Silber-Auflösung in Vitriolsäure; 7) mit Salpetersäure. Ein damit angefeuchtetes, über das Destillat gehaltenes Papier wurde von keinen nebelähnlichen Dämpfen umgeben; setzte man aber zu der Flüßigkeit etwas Weinsteinöhl, so zeigten sich sogleich die weißen Dämpfe. 8) Mit Eisen-Vitriol-Auflösung: die Vermischung wurde alsobald schwarz. Das Resultat dieser Versuche ist folgendes. Erstlich: freyes flüchtiges Laugensalz ist Nro. 2. 4. 7. zufolge nicht vorhanden. Zweytens: eine freye Säure mangelt nach Nro. 1. und 3. gänzlich. Drittens: weder Salz- noch Vitriolsäure ist, wie aus Nro. 5. und 6. erhellet, darinnen befindlich. Aber viertens: ein flüchtiges Mittelsalz, welches aus Weinsteinsäure, flüchtigem Laugensalz und Phosphorsäure zu bestehen scheinet, ist, dem 7. und 8ten Versuch zufolge, in demselben vorhanden. Was das abgeschiedene Oehl anbetrift, welches nicht flüßig, sondern der Butter ähnlich war; so brachte ich die Hälfte davon

von mit zweymahl so viel Kohlenpulver, das ich damit zu einem Teig angerieben hatte, in eine glöthige, mit 2 Loth Wasser versehene Retorte; legte eine Vorlage an und gab ein zur Destillation erforderliches Feuer. Die andere Hälfte versetzte ich mit 4 Loth rectificirten Branntwein, brachte die Mischung durch Hülfe eines gläsernen Trichters, der in den Bauch der Retorte reichte, in die Retorte, legte eine Vorlage an, und machte Feuer unter das Sandcapellchen. Die Erfolge dieses Rectificationsgeschäfts waren diese: Von dem mit Kohlenstaub versetzten Oehl giengen in Gesellschaft des Wassers 20 Gran von hellbrauner Farbe und empyrevmatischen Geruch über; von dem mit Branntwein vermischten aber 26 Gran von dunkelbrauner Farbe. Der rectificirte Branntwein roch gleich Hirschhorngeist, führte etwas flüchtiges Laugensalz, gab aber mit Wasser vermischt, kein Oehl. Die in der Retorte zurückgebliebene Kohle wurde eingeäschert, und 4 1/2 Gran Erde, welche aus Kiesel- und etwas Kalkerde bestund, erhalten. Was nun die Anfangs gemeldeten 10 Loth Kohlen anbetrift, welche von dem Dünger in der Phiole zurückgeblieben wa-

ren, so brannte ich solche auf einem Teste zu Asche; sie wog 4 2/6 Loth; war leicht, von grauem Ansehen, und hatte keinen salzichten Geschmack. Ich nahm von ihr 500 Gran ($2\frac{1}{2}$ Loth), brachte sie, mit 4 Loth höchstrectificirten Branntwein und 8 Loth Wasser vermischt, in eine Phiole; ließ sie innerhalb 24 Stunden zweymal damit aufkochen, und übergab dann alles einem abgewogenen Filtro. Dieses Verfahren wiederholte ich noch zweymal, jederzeit mit 2 Pfund destillirtem Wasser; filtrirte das Flüßige, trocknete und wog alsdenn die zurückgebliebene Erde; sie hatte 39 Gran am Gewichte verlohren. Das filtrirte Wasser rauchte ich bis auf 2 Loth ab, sammelte die niedergefallene Erde, welche aus Gyps zu bestehen schien, und fand sie nach dem Trocknen 21 Gran schwer. Ich übergoß sie mit verdünnter Salzsäure, und brausend wurde hier etwas von ihr aufgelößt; digerirte alsdenn die Vermischung einige Stunden lang stark, filtrirte und edulcorirte mit Weingeist das Zurückgebliebene, es wog 18 Gran, und war, nach angestellten Proben, Gyps, das Aufgelößte aber Kalkerde, am Gewicht 3 Gran. Nun schied ich, nach der bereits erzählten Art,

die

die in der noch übrigen Auflösung befindlichen Salze: es waren 4 Gran vitriolisirter Weinstein. Die geistige Auflösung zerlegte ich theils durch die Crystallisation, theils durch die Sättigung, in 2 Gran mineralisches, 5 Gran vegetabilisches Laugensalz, in 2 Gran Digestivsalz, und in 3 Gran Kochsalz. Es besitzen daher 3 1/2 Pfund dergleichen Excremente an crystallisirten fixen Salzen:

Vegetabilisches Laugensalz	10	Gran.
Mineralisches Laugensalz	4	—
Kochsalz	6	—
Digestivsalz	4	—
Vitriolisirten Weinstein	8	—
Gyps	36	—
	68	Gran.

Ein Gewicht, welches sich nach Abzug des Crystallisationswassers, das die Gewichtszunahme erzielte, zu den erdicht- und metallischen Theilen verhält, wie 1 zu 16 1/4. Um die Bestandtheile der ausgelaugten Asche zu erfahren, nahm ich von ihr 105 Gran, rührte sie mit Wasser zu einem dünnen Brey an, goß reine Salzsäure nach und nach hinzu, wartete unter öfterem Umrühren jederzeit das Aufbrausen ab; übers

sattigte dann die Auflösung mit Salpetersäure; ließ alles 12 Stunden lang digeriren, filtrirte die in ein mit einer Schnaupe versehenes Glas abgegoßene, und mit dem Aussüßwasser vermischte Flüßigkeit; brachte dann zuletzt die unaufgelößte Erde auf das Filtrum, und trocknete sie in solchem; ihr Gewicht betrug 68 Gran. Da die also gesammelte Kieselerde, der Farbe nach, noch fremde Theile zu enthalten schien; so vermischte ich sie mit 130 Gran Weinsteinsalz und calcinirte sie gehörig in einem porzellanenen Tiegel. Nachdem sie von daraus in ein mit destillirtem Wasser zur Hälfte angefülltes Glas war gebracht worden, welches dadurch eine röthlichte Farbe erlangte, ließ ich sie zur Scheidung des allenfalls vorhandenen Braunsteins über Nacht stehen; es ließ sich aber außer der Kieselerde nichts von solchem entdecken. Ich vermischte hierauf die Lauge bis zur Uebersättigung mit Salzsäure, digerirte die Mischung stark, filtrirte, edulcorirte und trocknete sie. Sie wog nach dem Glühen 64 Gran; war weiß; knirschte auf den Zähnen, und verhielt sich ganz wie Kieselerde. Die Salzsäure hatte also 4 Gran ausgezogen, und diese waren der vorgenom-

nommenen Probe zufolge, Eisen und Alaun-erde. Ich vermischte die beyden Laugen mit-einander und prüfte sie mit Vitriolsäure auf Schwerspaterde, es entstund aber kein Nieder-schlag. Hierauf wurde die Lauge mit Wein-steinsalz-Auflösung in 2 Perioden präcipitirt, und die Niederschläge gesammelt. Der erste war gelbbraun, 7 Gran schwer, und bestund größtentheils aus Eisen; der zweyte war blen-dend weis, ganz frey von Eisen und wog nach dem Trocknen 29 Gran. Ich löste sie beyde besonders in Königswasser, einer Vermischung aus Salpeter- und Salzsäure, auf, und prä-cipitirte mit Blutlaugensalz, welches 20 Procent Eisen enthielt, das in der 7 Gran wiegenden Niederschlag-Auflösung befindliche Eisen. Ich erhielt 19 Gran Berlinerblau, und aus diesem durch die Glühung nach Abzug des Blutlaugen-salz-Antheils 4 Gran dem Magnet folgsames Eisen. Die von diesem Niederschlag abfiltrirte Flüßigkeit vermischte ich mit der aus 29 Gran Erde verfertigten Auflösung, auf welche Blut-laugensalz nicht wirkte und daher Eisenfrey war, rauchte solche bis auf ohngefehr 1 1/2 Loth ab; setzte alsdenn eine gesättigte Auflösung von 1 Loth

zerfallenem gereinigten Glauberſalz bey, evaporirte die Lauge bis zur Trockne; ſüßte ſie mit einer Vermiſchung aus Branntwein und Waſſer aus; löſte das in Weingeiſt Unauflöſsbare in einer Maas Waſſer kochend auf; präcipitirte ſie mit Laugenſalz; filtrirte, edulcorirte, trocknete und wog den Niederſchlag; ſein Gewicht betrug 28 Gran. Die geiſtige Auflöſung füllte ich mit Laugenſalz: ſie wog ausgeſüßt 8 Gran; ich löſte ſie in Vitriolſäure auf, ſchlug mit wohlausgetrockneter ſehr reiner Bittererde in der Wärme die Alaunerde nieder, ſüßte den erhaltenen ſchwerauflöſslichen Alaun mit Weingeiſt aus, und fand ihn nach dem Trocknen 6 1/2 Gran ſchwer. Dieſe 6 1/2 Gran beſtunden den vorhergehenden Verſuchen zufolge aus 2 1/4 Gran Alaunerde. Die noch übrige Auflöſung wurde mit Laugenſalz nach Abzug der hinzugeſetzten Magneſia in 4 3/4 Gran Bittererde zerlegt. Um mich von der Reinigkeit der ausgeſchiedenen Körper zu überzeugen, löſte ich die Kalk-, Alaun- und Bittererde jede beſonders in Vitriolſäure auf, und cryſtalliſirte die hieraus zu erwartende Salze; ſie waren alle vollkommen rein.

Nachdem bisher Vorgetragenen enthält 1 Centner oder 105 Pfund dergleichen frischen Dungs: 1 Loth 1 1/2 Quint Oehl; 2 Loth Salz; 3 Pfund 16 Loth Erde; und 105 Pfund dergleichen Erde: 37 Pfund in Scheidwasser auflößbarer Erdarten, 4 Pfund Eisen, 64 Pfund Kieselerde; oder bestimmter: 64 Pfund Kieselerde; 4 Pf. Eisen; 28 Pf. Kalkerde; 4 3/4 Pf. Bitterde; 2 1/4 Pf. Alaunerde. Ferner: 105 Pfund ausgeglüheter unausgelaugter Asche: 1 Pfund 1 1/2 Loth vegetabilisches Laugensalz; 1 3 1/2 Loth mineralisches Laugensalz; 20 L. Kochsalz; 1 3 1/2 L. Digestivsalz; 26 1/2 L. vitriolisirten Weinstein; 3 Pf. 24 L. Gyps.

III.

Abhandlung über den Pferdemist.

Den Mist, welchen ich zu dieser Untersuchung erwählte, erhielt ich aus hiesiger herrschaftlicher Stallung, er wurde zu Mistbeeten angewendet, und war also unverfault. Das Futter, welches die Pferde erhielten, war: Hafer, Heu und geschnittenes Stroh von Spelz und Rogen. 3 Pfund 12 Loth desselben gaben durch

die Destillation: 1) 3 Pfund einer wässerichten gelben, nach Hirschhornöhl riechenden Feuchtigkeit. 2) 1 1/2 Loth schmieriges schwarzbraunes Oehl, und 3) 11 Loth Kohle. Das Destillat bestund, den damit angestellten Versuchen zufolge: 1) aus etwas flüchtigem freyen Laugensalz; 2) aus einem dergleichen Mittelsalz, und 3) aus sehr wenigem salzgesäuertem Salmiak. Das schmierige Oehl gab durch die Destillation mit Kohlen: 1 1/2 Quint eines hellgelben Oehls, und die Kohle nach der Einäscherung 4 Loth 3 Quint und 20 Gran einer geschmacklosen Asche. Diese 4 Loth 3 1/3 Quint Asche lieferten durch das Auslaugen 53 Gran salzichter Theile, und diese wiederum durch die Crystallisation:

1) Gyps	, ,	28 Gran.
2) Vitriolisirten Weinstein		8 —
3) Kochsalz	, ,	5 —
4) Vegetabilisches Laugensalz		12 —
		55 Gran.

105 Gran der ausgelaugten Asche wurden mit Scheidewasser digerirt, das Zurückgebliebene ausgesüßt und als Kieselerde, 76 Gran schwer, aufbewahrt, das Aufgelößte aber mit Glaubersalz vermischt, die Kalkerde als Gyps nieder-

niedergeschlagen; dieser durch Kochen mit Laugensalz in 21 Gran Kalkerde zerlegt; die noch vorhandene Auflösung aber mit Blutlaugensalz in 3 2/3 Gran Eisen, alsdenn mit getrockneter Magnesia in 1 1/3 Gran Alaunerde, und die Auflösung der Magnesia, nach Abzug der hinzugesetzten in 3 Gran Bittererde umgeschaffen. Es enthalten also 105 Gran dieser edulcorirten Asche:

Kieselerde	76	Gran.
Kalkerde	21	—
Bittererde	3	—
Alaunerde	$1\frac{1}{3}$	—
Eisen	$3\frac{2}{3}$	—
	105	Gran.

In einem Centner oder 105 Pfund unverfaulten Pferdemists, so wie er zu Mistbeeten verwendet wird, sind demnach enthalten:

	Pfund.	Loth.	Gran.
Erde	4	16	—
Salz	—	7	25
Oehl	—	12	—
Summa	5 Pf.	3 Loth.	25 Gran.

12 Fuhren also oder 312 Centr. dergleichen Mists besitzen:

	Pfund.	Loth.
An Oehl	117	—
An Salzen	69	8½
An Erde	1404	—
Summa	1590 Pf.	8½ Loth.

Oder aber: 1017 Pfund Kieselerde; 281 Pf. Kalkerde; 40 Pf. Bittererde; 18 Pf. Alaunerde; 49 Pf. Eisen; 37 Pf. 13 Loth Gyps; 10 Pf. 21 Loth Vitriol-Weinstein; 6 Pf. 8 L. Kochsalz; 15 Pf. 19 L. Laugensalz.

IV.

Abhandlung über den Schaafmist.

Zwölf Loth Schaafkoth, der von Stroh und Erde frey und gehörig trocken war, wurde in eine Retorte zur Destillation eingesetzt und mit 8 Loth destillirtem Wasser übergossen. Der Erfolg und die Produkte dieser Arbeit waren diese: Es gieng Anfangs eine blaßmilchfärbichte Flüssigkeit ohne das geringste Oehl über; ihr folgte, nachdem alles zugesetzte Wasser beynahe herüber-

gegan-

gegangen war, 3 1/2 Quint eines fetten schwerfließenden Oehls, das hellbraun von Farbe, und dem Hirschhornöhl, dem Geruch nach, ähnlich war. Es wurde, nachdem es etliche Tage an der Luft gestanden hatte, schwarz, und verlohr mit Erlangung dieser Farbe, auch die Eigenschaft eines Oehls: die Flüßigkeit. In der Retorte blieben 8 Loth einer leicht zerreiblichen aschenfärbichten Kohle zurück, welche eingeäschert 5 Loth grauröthlichter geschmackloser Asche hinterließen. Das Destillat verhielt sich mit gegenwirkenden Mitteln also: 1) Mit Lacmus blau gefärbtes Papier wurde röthlicht. 2) Mit Curcume gelb gefärbtes Papier blieb unverändert. 3) Corrosivisches Queckfilber (Mercurius sublimatus corrosivus) färbte sich nicht. 4) Mit Säuren vermischt zeigte sich nicht das mindeste Aufbrausen. 5) Ein mit Salpeter- und ein mit Eßigsäure naßgemachtes Papier erweckte keine Dämpfe; setzte man aber etwas Laugensalz bey, so entstunden sie sogleich. 6) Eisenvitriol färbte solches schwarz; 7) aus der Auflösung der Schwerspaterde in Eßig, und 8) des Silbers in Vitriolsäure wurde nichts gefället. Nach Nro. 1. ist etwas freye Säure

vor-

vorhanden. Nro. 2. 3. 4. 5. geben zu erkennen, daß ein flüchtiges ungebundenes Laugensalz nicht, wohl aber ein dergleichen Mittelsalz vorhanden sey. Nro. 6. zeigt adstringirenden Stoff, d. i. Weinstein, und etwas Phosphorsäure an, und Nro. 7. und 8. daß weder Salz, noch Vitriolsäure vorhanden sey. Was die zurückgebliebene Asche anbetrift, so laugte ich solche theils mit Brantwein, theils mit Wasser, so gut als es möglich war, aus, und erhielt auf den bekannten Wegen: 1) 5 1/2 Gran Gyps; 2) 8 Gran vegetabilisches Laugensalz; 3) 4 Gran vitriolisirten Weinstein; 4) 2 1/2 Gran Kochsalz. Zusammen also 20 Gran. Von der zurückgebliebenen Erde digerirte ich 105 Gran mit einer hinreichenden Menge Scheidewasser; filtrirte die Auflösung; süßte das Zurückgebliebene aus, trocknete und wog es. Es hatte 87 Gran am Gewicht; 18 Gran waren also durch das Scheidewasser aufgelöset worden. Da diese zurückgebliebene unauflößbare Erde noch ein graues Ansehen hatte, so vermischte ich solche mit dem doppelten Gewicht Weinsteinsalz, ließ sie 2 Stunden lang in einem porzellanenen Tiegelchen glühen, brachte sie nach dem Erkalten

in

in ein mit etwas destillirtem Wasser angefülltes Glas, sättigte sie mit Salzsäure und stellte solche, nachdem ich etwas Salpetersäure hinzugesetzet hatte, zur Digestion in Sand. Es lößte sich, wie dieß sowohl aus der nach dem Aussüßen zurückgebliebenen Kieselerde, die nun ganz weiß war, als auch aus der Auflösung, welche mit Laugensalz zerleget wurde, zu ersehen war, 16 Gran, mit ersterem also in allem von 105 Gran 37 Gran auf. Da ich zu genauerer Erforschung des Gewichts die beyden Auflösungen mit Laugensalz zerleget hatte; so lößte ich die gesammelten Niederschläge in so viel Vitriolöhl auf, als zur Sättigung und Auflösung derselben nöthig war; rauchte alsdann alles in einer porzellanenen Schaale bis zur Trockne ab, laugte die auflößbaren Theile mit Branntwein aus; trocknete den zurückgebliebenen Gyps und fand ihn 36 Gran schwer; die in Brantwein aufgelößten erdichten Salze aber zerlegte ich in 3 Gran Bittererde, 10 Gran Alaunerde, und in 3 Gran metallisches Eisen. 105 Gran der ausgelaugten Asche bestehen also, da 36 Gran Gyps 21 Gran Kalkerde entsprechen, aus:

21 Gran Kalkerde; 3 Gran Bittererde; 10 Gran

Alaun-

Alaunerde; 71 Gran Kieselerde, und 3 Gran Eisen. 1 Pfund dergleichen Schaafkoth besteht demnach aus: 2 Loth 1 1/3 Quint Oehl; 53 Gran Salzen; 13 Loth 1 Quint Erde. Oder aber, da dieses Oehl nach der Rectification nicht mehr als 1 Quint eines hellgelben Oehls lieferte, aus: 2 Quint 40 Gran Oehl; 15 Gran Gyps; 9 2/3 Vitriol-Weinstein; 21 1/3 Gran veget. Laugensalz; 6 1/3 Gran Kochsalz; 2 Loth 2 Quint 30 Gran Kalkerde; 1 Quint 30 Gran Bitterde; 1 Loth 1 Quint Alaunerde; 8 Loth 3 Quint 30 Gran Kieselerde; 1 Quint 30 Gran Eisen. 105 Pfund oder 1 Ctr. Schaafkoth bestehen also überhaupt aus: 43 Pfund 15 1/2 Loth Erde; 2 Pfund $14\frac{4}{12}$ Loth Oehl; $23\frac{2}{12}$ L. Salz. Oder aber bestimmter gesprochen, aus: 8 Pfund 9 Loth Kalkerde; 1 Pf. 7 L. 1 Quint Bittererde; 4 Pf. 3 L. 1 Q. Alaunerde; 29 Pf. 3 L. 3 Q. Kieselerde; 1 Pf. 7 L. 1 Q. Eisen; 2 Pf. 14 L. 1 1/3 Q. Oehl; 6 L. 2 1/4 Q. Gyps; 4 L. 1 Q. vitriol. Weinstein; 9 L. 1 1/3 Q. veget. Laugensalz; 2 L. $3\frac{1}{2}$ Q. Kochsalz.

Allges

Allgemeine Bemerkungen.

Wenn wir das Wesentliche der bisher erzählten Untersuchungen zusammen fassen, um aus diesem anwendbare Lehren und Sätze für den Feldbau zu ziehen; so finden wir: 1) daß der Rindmist unter den hier untersuchten Düngerarten: dem Pferd- und Schaafmist, die größte Menge sowohl an auflösbaren Erdarten als salzichten Theilen besitze; 2) daß der Schaafmist zwar ein ungleich größeres Gewicht erdichter Theile führe; daß aber solcher in Ansehung der Güte, d. h. der auflösbaren Erdarten diesem weit nachstehe; und 3) daß der Pferdemist mit dem von Schaafen den Bestandtheilen nach sehr übereinkomme. Wir schließen dann aus diesen Erfahrungen, welche ich mit dem hin und wieder Gesagten verbinde: Erstlich, was die Güte, Dauer und Wirkung dieser Dünger anbetrift: a) daß der Rindmist anhaltender in der Wirkung seyn müsse, als der Pferd- und Schaafmist; b) daß er auf jede Art Erdreichs mit Nutzen verwendet werden könne, welches aber von dem Pferd- und Schaafmist nicht der Fall ist; c) daß zwar letzterer: der Schaafmist,

1) wegen seiner schnelleren Verwesung und Auflösung, und 2) wegen des großen Uebermaases an Erde, eine frühere und auszeichnendere Wirkung erzielen werde, als jene; daß aber solche minder anhaltend seyn werde, als die des Rindmists; d) daß die nehmlichen Arten Mists: der Schaaf- und Pferdemist, wenn sie in einigem Uebermaas aufgeführt werden, mehr hohe als schwere Früchte hervorbringen werden, weil der Ueberfluß von zarter Kieselerde, welchen sie dem Felde mittheilen, und den Gewächsen zur Nahrung, zur homogenen Nahrung darbringen, mehr das Wachsthum des Strohes als der Körner, indem letztere ungleich weniger Kieselerde als erstere bedürfen, begünstige; e) daß die Wirkung des Schaafmists in Ansehung der Dauer sich zu der des Rindmists wie 2 zu 4 verhalten müsse; daß aber f) 1 Centner eigentlicher Schaafkoth mehr leiste als 2 1/3 Centner Rind- und 9 Centner unverfaulter Pferdemist; und g) daß diese Wirkung (es versteht sich dieses aber nur von Düngern im verfaulten Zustande, denn unverfaulte wirken auch instrumentaliter) auf eine materielle Weise und zwar theils durch die Erdarten, theils, jedoch in einem

nem

nem mindern Grad, durch die Salze geschehe. Zweytens: was den Gebrauch derselben anbetrift: a) daß dieser jederzeit erheischet werde und nöthig sey, wenn das Feld die gehörigen Erdarten nicht besitzet, welches durch Scheidewasser und Vitriolöhl erforschet wird, oder aber, welches eben das ist: wenn es auch bey guter Bestellung, gutem Saamen und günstigem Wetter sich unfruchtbar zeigt, b) daß bey Feldungen, die nicht über 30 Procent in Scheidewasser auflösbarer Theile führen, der Pferd- und Schaafmist, wenn solche vollkommen verfaulet sind, stets mit Nutzen werde verwendet werden; c) daß der Kuhmist von angezeigter Güte auf allen Arten Erdreichs, wenn man anders nicht auf solchem Gewächse erbauet, die Kiesel- und Alaunerde größtentheils zur Nahrung bedürfen, mit unausbleiblichem Nutzen werde geführet werden; d) daß der Rind- Schaaf- und Pferdmist auf thonicht- oder lettichtes, sogenanntes kaltes Erdreich, dessen allzugroße Fest- und Zähigkeit das Wachsthum der Pflanzen, theils wegen der dadurch beynahe unmöglich gemachten Auflösung, theils dem verhinderten Auffeimen und Umstocken der Saamen,

verhindert, gleich bey angehender Verwesung geführet und untergepflüget werden müsse. e) Daß man von unverfaultem Pferdmist, so wie er zu Mistbeeten genommen wird, nicht unter 35 Fuhren, von verfaultem aber nicht unter 16, wenn einiger Nutzen soll dadurch erzielet werden, auf einem Morgen Feldes, der mit 12 Fuhren Rindmist insgemein gedunget wird, nehmen müsse. f) Daß, wenn einem ganz unfruchtbaren Acker durch Mist allein die gehörige Fruchtbarkeit soll gegeben werden, man auf einem dergleichen Morgen von 400 Ruthen à 12 Schuh, von Rindmist wenigstens 30. 35 Fuhren à 15 Centner, von unverfaultem Pferdemist, der aber überhaupt hiezu weniger dienet, 80. 90. und von verfaultem 40. 45 Fuhren verwenden müsse, und g) daß man, um die Zeit bestimmen zu können, in welcher eine gewisse Anzahl Schaafe einen Morgen Feldes gehörig zu dungen im Stande sey, man 1) die Güte des Erdreichs durch Scheidewasser erforschen; 2) die Fruchtart, welche man zu erbauen gedenket, den Bestandtheilen nach betrachten; 3) durch einen Versuch erforschen: wie viel ein Schaaf innerhalb 24 Stunden an

Excres-

Excrementen dem Gewicht nach abwerfen und 4) dieses Gewicht mit der Anzahl der Schaafe und der Zeit, nach der ersten Untersuchung, auf Rindmist berechnen müsse. Und endlich drittens, was die Zubereitung derselben anbetrift: α) daß, da der verfaulte Rindmist 1) eine größere Menge flüchtigen Salzes, und 2) mehrere Erde besitze, man die Faulniß bestmöglichst befördern, und dann dabey vorzüglich Sorge tragen müsse, β) daß von denen ihm theils nur anklebenden salzigten Theilen nichts durch irgend eine Abspülung verlohren gehe; γ) daß da, wo es der Raum gestattet, mehrere Miststätten anzulegen, man 1) statt der vorhandenen einfachen Miststätte, deren zwey zu dieser Absicht bestimme, um, wenn die eine gefüllt ist, sie ungestört der Fäulniß überlassen zu können; 2) bey jeder derselben ein geräumiges tiefes Loch zur Gülle also anbringe, daß, wenn bey entstehendem starken Regen solche überfliessen sollten, das Ueberfliessende allezeit in dem Güllenloch sich sammlen müsse; (Man wird dieses leichtlich erreichen, wenn man die Miststätte so bald sie gefüllet ist, mit einem kleinen, aus brauchbarer Erde, verfertigten Erdenwall umgibt, und nur da,

wo das Güllenloch angebracht ist, solchen offen läßt.) 3) Nie mehr Feuchtigkeit, es sey Urin oder Waschwasser, in die eigentliche Miststätte laufen lasse, als zur Anfeuchtung erforderlich, indeme sonsten, durch das in allzugrosser Menge vorhandene Flüßige, die salzichten Theile ausgelaugt werden und denn größtentheils verlohren gehen, und 4) den der Fäulniß überlassenen Mist, wo möglich mit Dielen oder Brettern bedecke, und zwar so bedecke, daß zwar die Luft über solchen streichen könne, welches durch einige Unterlagen erzielet wird, die Einwirkung der Sonne und des Regens aber dadurch verhindert werde. d) Daß man nicht alle und jede Stoffe, welche faulen, ohne Auswahl zur Einstreu oder Mistwerdung nehme, indem 1) solche nicht als bloßes Vehiculum, sondern als ein selbst aus vielen erdichten- und salzigten Theilen bestehendes Wesen zu betrachten sind, und denn 2) nicht alle, wegen der Verschiedenheit der Bestandtheile, einen guten überall gleich wirksamen Dung geben. So kann und wird, um dieß mit einem Beyspiel zu erläutern, daß Stroh von Waizen, Gersten, Roggen, Rebs und das Laub von harten Holz, für Felder welche an Kalkerde Mangel leiden, einen viel, sehr viel brauchbareren Dung als das Stroh von Spelz, Einkorn, Heidekorn und das Laub und die Nadeln von weichen Hölzern liefern; und im Gegentheil jene für Felder welche reich an Kalk- und arm an Alaunerde sind, minder brauch-

brauchbar seyn als diese, ε) Daß man die Güte des Düngers, und die Anzahl der zu einem Morgen Felds erforderlichen Wagen, nicht dem Ansehen sondern der Qualität und der Menge des Futters nach bestimmen müsse, indem 2 Wagen voll Mists von einem fetten Vieh, das Futter vollauf erhielt, mehr nützen, als 3 dergleichen von magerem Vieh, das kärglich gefüttert wurde; und auf die Art derjenige Mist, welcher bey gleicher Stärke des Viehes, von Körnern, Esparsette, ewigem Klee ꝛc. abstammet, sich 3 mahl wirksamer und kräftiger zeigen wird als solcher, der da, wo man mit rothem Klee und Wiesenheu fütterte, erhalten wurde; ζ) Daß da wo es die Geschäfte oder die Lage der Güter nicht erlaubt, die Gülle alle in Fässern zu verführen, man zur Verconsumirung derselbigen alle kalkartige und thonichte Abgänge und zu Staub gemachte Steine: Bauschutt, Backofenerde, Lehmenwände, ausgelaugte Asche, Tuphstein Abgänge, zermalmten Märgel, gepochte Backsteine und Ziegelstücke, Holzerde, Spreu, Stubenkericht, gestossene Knochen ꝛc. in besondere Gruben sammle, solche mit der Gülle von Zeit zu Zeit übergieße, und wenn alles gehörig verfaulet, auf die Felder und in die Gärten führe; η) daß man zur Einstreu, da wo Stroh auf sonstige Art gut untergebracht werden kann, statt dessen von den so eben benahmten oder andern Körpern diejenigen nehme, welche man theils am leichtesten

erhalten, theils aber auch ihrer Eigenschaft nach benutzen kann, und o) daß man alle Stallungen wegen dem beständigen Versinken des Urins statt gemeiner Erde mit Kalkschutt, den man zu dieser Absicht von Jahr zu Jahr sammlet, ausfülle. Ich ziehe hier zum Beschluß aus allem dem bishero Gesagten noch einige Lehren. Es sind diese: 1) man setze das Feld durch die erforderlichen Erdarten in die bekannte Vermischung; 2) bearbeite das Feld zur gehörigen Zeit sorgfältig und wohl; 3) Wähle zur Saat den besten, von fremder Beymischung befreyten Saamen; 4) meide alle Künsteleyen; 5) baue das Feld alljährlich an, und befreye es durch schickliche Wahl der Gewächse so gut als es möglich von Unkraut; 6) ersetze von Zeit zu Zeit die verlohren gegangenen Erden; 7) übergebe alljährlich dem Felde, oder vielmehr den Gewächsen, welche man darauf erbauet, die benöthigte Menge und Arten Salzes; 8) vermehre den Viehstand, nicht des Dunges wegen, sondern nur alsdann, wenn die Viehzucht reichlicheren Gewinn als der Früchte Anbau verschaffet; 9) dünge mit Dung, wenn er nach Nro. 8. vorhanden ist, und mit Erde und Salzen, wenn es hieran fehlet; und sammle endlich 10) alle erdichte den Feldungen nützliche Abgänge; denn Erde ist es, was die Felder fruchtbar macht.

V.

Daß es nach den Grundsätzen der Naturlehre möglich sey, die Brache abschaffen, und alle Feldungen alle Jahre mit Vortheil und zur Beförderung der Bevölkerung der Staaten besäen und beerndten zu können.

Ich möchte Niemand gerne dadurch, daß ich die Wahrheit gesagt habe, beleidigen und erzürnen.

Heinrich der IV.
Motto de M. B.

Die Geschichte des Ackerbaues unterrichtet uns, daß schon die Alten auf eine zweyfache Weise die Aecker zu nutzen bedacht, und sie wirklich auf die zweyfache Weise zu nutzen gewohnt waren; davon redet Varro ganz deutlich, wenn er den Unterschied der Bauarten angiebt, und sagt: daß man einige Aecker von einem guten Grunde alle Jahre besäe, andere aber nur ein Jahr ums andere anzubauen pflege. Man kann von den Römern bis zur Errichtung des gemeinen Wesens der Juden hinauf steigen, wo ihnen Moses schon das Gesetz gab: alle Jahre ihr Feld zu bauen, zu besäen und zu bernden, sie aber im siebenten Jahre ruhen zu lassen, und auf ihnen, ob sie sich gleich darinnen von selbsten besäen würden, nicht zu ernden oder zu sammeln, s. 2 B. Mos. XXV, 10. 11. 3 B. Mos. XXV, 1. 12.; welches letztere sie aber so wenig befolgten, da sie das erstere so willig beobachteten, daß Gott gezwungen war, sie mit den strengsten Strafen dazu zu vermögen, s. 2 B. Mos. XXVI, 1. 2 Chron. XXXVI, 21. Dieser beyden Völker Bauart erweiset also die

Mög-

Möglichkeit, keine Brache zu halten *), und diejenige des jüdischen Volkes widerlegt (wann hier ein theologischer Gedanke erlaubt ist) den Freygeist, dem es unbegreiflich und unmöglich seyn will, daß ein so enges Land eine so große Menge Volkes habe erhalten können, indem sie uns eine frohe Aussicht auf die Zukunft verschaffet, und die Hoffnung giebt, daß wir beym Fleiß werden stets Brod haben, wenn unsrer noch eine viel größere Summe die Erde bewohnen wird. Sie rechtfertiget den Ge-

*) Nach den Beobachtungen des Schwedischen Reisenden Herrn Björnstählς, dauert diese Gewohnheit bey den Bewohnern des Morgenlands noch dato fort, ja sogar auch ohne die Aecker zu düngen, und dennoch erhalten sie von ihnen 70 auch 100fältige Früchte. Die eigenen Worte dieses gelehrten Reisenden sind im 4ten Bande S. 195 folgende: „Der Acker ist hier gut und trägt reichlich: der größte Beweis davon ist der, daß er selten gedünget wird, und gleichwohl fast jedes Jahr trägt: selten ruhet er aus oder liegt brach, wie bey uns, sondern hier wird die Erde beständig in Arbeit erhalten. Das eine Jahr trägt sie Weizen, das andere Haber oder Gersten, bisweilen Bohnen und Erbsen, dann wieder Weizen ꝛc.

Gedanken Beaumells gegen den Zweifler, daß, wenn der eheloſe Stand aufhören würde, viele Kinder aus vielen Ehen ihre Verſorgung und Brod zu finden außer Stand wären. Es kommt nun darauf an, daß ich die Art und Weiſe der Aufhebung aller Brache und die alljährliche Anbauung alles Ackerfeldes hier vorlege; die Beweiſe aus den Naturgeſetzen und der Erfahrung für ihre glückliche Erfolge hinzuthue, und die Annahme oder die Verwerfung meines Vorſchlages jedem Belieben anheim gebe. Ich will eines, wie das andere, hier zu leiſten und zu befolgen verſuchen.

Einige Grundſätze aus der Naturlehre, als die Gründe meiner Gedanken und des Vorſchlags, muß ich hier nothwendig vorausſchicken und anſetzen, nämlich: 1) Alle Körper und Pflanzen beſtehen aus vier Hauptthei-len: Waſſer, Salz, Oehl, feiner Erde, die aber von verſchiedenen Arten in verſchiedenen Maaſen und Gewichten unter einander in jeder Pflanzenart gemiſcht ſind. 2) Dieſe Beſtandtheile aller körperlichen Weſen gehen immer von einem Körper zu dem andern, wenn ſie vorher durch die Gährung aufgelöſt und verfeinert

wor-

worden sind. 3) Bey einer solchen Verfeinerung werden diese Bestandtheile sehr flüchtig, gehen in die Luft über, oder bleiben in der Erde hin und her kleben, wie jene aus der Luft nach und nach wieder auf die Erde herabfallen, und sich endlich mit dem Saamen eines Gewächses zu seinem Wachsthum wieder verbinden. 4) Je mehr also die Erde solcher Bestandtheile enthält, oder je mehr in dieselbe nach und nach aus der Luft herabkommen, je fruchtbarer wird sie auch. Je dichter aber ein Körper oder Erdreich ist, je mehr hat es Theile, je mehr hat es Berührungspunkte, je anziehender ist es; wenn aber seine Dichtigkeit zu groß ist, so fällt das, so es anziehet, nur auf seine Oberfläche, und dringt nicht in dasselbe ein: daher seine gemäßigte Lockerheit, die ihm die Natur oder der Fleiß oder beydes zugleich giebt, nicht vermisset werden darf. 5) Wenn die Bestandtheile der Pflanzen nur in der Oberfläche der allzudichten Erde liegen, und werden von der Sonnenhitze des Tags nie erhitzt, so gehen sie in der Kühle der Nachtluft mit der Ausdünstung wieder weg und in die Luft über. 6) Je schwerer der Körper ist, je mehr bindet er das,

so

so er enthält; je leichter er ist, je eher läßt er es entgehen und verfliegen. Wenn man also andere Körper mit der Erde verbindet, die in der Gährung sich in ihr auflösen, so werden deren Bestandtheile in einer schweren Erde sich häufiger als in einer leichtern anhängen, und in dieser eher verfliegen, als in jener. 7) Wenn auf einem Erdboden Pflanzen stehen, so ziehen sie die Pflanzen-Bestandtheile, die in ihm enthalten sind, und die, die aus der Luft dahinkommen, allesamt an, und halten sie fester und in größerer Menge als der Erdboden selbst, so lange nehmlich ihr Leben und Bestehen fortdauert. 8) Diejenigen Theilchen, welche die Pflanzen anziehen, sind eigentlich ihre Bestandtheilchen, und machen die Salze und Oehle oder das eigentliche Pflanzenfett aus, daher ist auch kein Körper durchaus zur Dungung im Pflanzenreich so schicklich, als die Pflanzen selbst, oder die Körper der Thiere, die durch sie genährt werden, entstehen und erwachsen. (Wallerius chemische Grundsätze des Feldbaus l. 15. §. 5. p. 201. Berlin). Ich will diese Sätze da nicht erweisen, weil sie theils für sich schon klar, aus der Naturlehre als erwiesen bekannt,

bekannt, und in andern meiner Abhandlungen als unumstößliche Wahrheiten schon dargethan sind; auf sie aber mein System von Abschaffung aller Brache, und einer alljährlichen Benutzung der Ackerfelder, gründen. Beym Ackerbau kommt vor allen Dingen I) der Erdgrund in Betrachtung; nach meinen Grundsätzen Nro. 4. 5. 6. muß er weder zu schwer noch zu locker seyn. Dieses Erdreich muß, II.) damit die Bestandtheile der Pflanzen nach Nro. 4. meiner Grundsätze aus der Luft besser eindringen können, gehörig gebauet, und vor der Saat öfters herumgeworfen werden; III.) muß dasselbe, um viele dieser Bestandtheile zu erhalten, noch mit andern Körpern, welche dergleichen Bestandtheile häufig enthalten, gemischt werden; welches Pflanzen oder die Theile lebendiger Geschöpfe sind; oder man muß ihm solche Körper zusetzen, welche die Bestandtheile aus der Luft vorzüglich anziehen Nro 6. 7. IV.) Jede Pflanzenart ziehet ihre eigene Theilchen in ihrer eigenen Vielheit oder Wenigkeit an, und mischet sie zusammen nach Nro. 1. 7. 8. Es muß also beym Anbau verschie-

schiedener Fruchtsorten so verfahren werden, daß sie da aufgesäet werden, wo ihre Bestandtheile nicht schon ausgesogen sind.

Um mich über diese vier Hauptstücke eines gesegneten Feldbaues zu erklären, so berufe ich mich bey dem Ersten auf meine vorhergehende Abhandlungen, das Zweyte betreffend, führe ich nur folgendes an: Ein Feld, welches also seine nöthige und hinlängliche Schwere und Lockerheit erhalten hat, ziehet nicht nur die in der Luft sich befindende Pflanzentheilchen: Wasser, Salze, Oehle, die im Regen und Schnee herabfallen, und durch andere Wege herab kommen, besser an; sondern, da das Feld öfters gepflügt und geackert wird, so hängen sie sich in allen und jeden Erdtheilchen an, und werden auch besser verschlossen, welche endlich die Pflanzen durch ihre Wurzeln häufiger aussaugen. Man siehet aus diesen natürlichen Gedanken, die sich durch beständige Erfahrungen wahr machen, daß ein Feld, ohne aufgelockert und herumgeworfen zu seyn, zur Saat nicht tüchtig, je öfter also dieses geschieht, je besser es zur Saat vollkommen seyn kann; und sogar den Gra-

den der Bearbeitung nach geschickt seyn werde *). Das Dritte: daß die Luft der Pflanzen Bestandtheile enthalte und an die Pflanzen abgebe, das wird nur der läugnen, der nicht weiß, daß das Wasser die ganze Nahrung aller Gewächse durch seinen Gehalt des Oehls, der Salze und der feinsten Erde ausmache **). Dieses Wasser steigt

*) Das Auflockern und Herumreißen des Feldes geschiehet hauptsächlich: 1) daß der ausgestreute Saamen unter die Erde kann gebracht werden, welches außer diesem nicht wohl möglich ist; und 2) daß das Unkraut nicht allzusehr Wurzeln fasse. Die Wiesen und Grasgärten bestättigen meine Behauptung, denn diese werden selten — ja, in kaum denklichen Jahren herumgeworfen, und tragen dennoch alle Jahre das schönste Gras. Daß übrigens aber das Herumreissen des Feldes außer erstgemeldeten zwey Punkten auch auf die übrigen Einfluß haben könne: daß nämlich durch die Bearbeitung das Erdreich mürber, mehr zur Aufnehmung der Feuchtigkeit und der Luftsäure, mithin zur Auflösung geschickter gemacht werde, gebe ich sehr gerne zu.

**) Die Luft reicht den Gewächsen nichts als Feuermaterie und Wasser, selten salzigte, und nur durch Zufall erdigte Theile. Erstere werden größtentheils

steigt in den Ausdünstungen der Erde, und aller derer darauf sich befindenden Körper, in die Luft auf, und sinkt durch erlangte Schwere wieder zur Erde nach und nach herab; da dieses nach und nach geschiehet, so wird durch eine längere Zeit davon die Erde hinlänglich geschwängert; weil aber doch der Trieb der Natur durch ihren Kreißlauf immer auch durch die Ausdünstungen viele Oehle und Salze wieder wegschickt, so wird das Erdreich zu den Gewächsen, die eine grosse Menge solcher Bestandtheile fordern, durch alles Pflügen und Herumwerfen niemahlen so viele in sich behalten, als zu dem Wachsthum dergleichen erfordert werden *). Folglich müssen da Zusätze geschehen,

 und

theils in denselben aus Feuermaterie, Wasser, Brennbarem und Erde gebildet; und Letztere, die erdichten Theile, sind von dem Erdreich durch sie hinweg geführet worden. Enthält übrigens das Wasser salzicht, öhlicht, oder erdichte Substanzen, so sind solche als fremdartige, nicht als wirkliche Bestandtheile desselben anzusehen.

*) Ein mit den gehörigen Erdarten versehenes Erdreich gibt aber dennoch, wie dieses die Erfahrung

und zwar 1) durch den Fleiß und die Kunst der Menschen, oder 2) durch eine ausserordentliche reiche Abgabe der Natur. Dieses geschiehet, wenn man dem Erdreich solche Körper einmischet, welche entweder für sich schon viele Pflanzentheilchen enthalten, oder dieselben aus der Luft vorzüglich und reichlich anziehen. Das letztere ist der Gypsstaub, und ein jeder anderer fester oder schwerer Stein, wenn er zerstossen und aufgestreuet wird. Siehe die Abhandlung vom Gyps. Das erstere ist ein jeder Auswurf aller lebenden Thiere, ja selbst die Theile ihres ganzen Körpers sind es. Die Pflanzen selbst sind die Nahrung anderer Pflanzen: die Auflösung ihrer Theile durch die Gährung, dadurch sie so verfeinert werden, daß sie in die Ansauglöcherchen anderer Pflanzen eingehen können, machen sie dazu vollkommen geschickt. Es ist also, wenn dieses nicht geläugnet

rung lehret, auch ohne Dung 20 und 30 Jahre, oder so lange, als nach den darauf stehenden Gewächsen angemessene Erdarten vorhanden sind, die reichlichste Ernde, und wird sie stets fortdaurend liefern, wenn man ihm die verlohrenen Erdarten wieder giebt.

net werden kann, ein sehr seichter und falscher Gedanke, daß das Unkraut auf einem Acker denselben so aussauge, daß er dadurch zur Saat untüchtig werde, ich glaube, je mehr Unkraut er zeuget, je mehr ist er zur Saat tüchtig und geschickt, wenn wir nehmlich auf die Nahrung, die der Acker dadurch erhält, allein sehen *). Ich will es aus Begriffen von forn und auch aus der Erfahrung erläutern und darthun. Das Unkraut auf den Aeckern zieht, welches nicht zu läugnen ist, die Bestandtheile 1) aus der Erde und saugt sie also ein; aber auch sehr viele nimmt es 2) unmittelbar aus der Luft. (s. Wallerius l. c. p. 32. C. II.) Solche Theilchen nun, die es aus der Erde bekommt, würden derselben durch die Ausdünstung von selbst entflohen seyn, und die, so das Unkraut aus der Luft unmittel-

*) Wenn das Unkraut von der Art ist, daß es stark und tief wurzelt, auch vor der Blüthe abgemähet, und dem Felde zur Verwesung überlassen wird; so ist es im Stande, wegen denen aus der Tiefe herausgehohlten, der Oberfläche fehlenden Erdarten, und denen aus ihnen gebildeten feuerfesten Salzen, zu nutzen, in gegenseitigen Fällen aber auch zu schaden.

bar ansog, würde sie zum Theil gar nicht erhalten haben; nun aber sind sie alle zusammen in dem Unkraut verschlossen, und können also nicht so leicht wieder entkommen. Gesetzt also, daß man alles dieses Unkraut unterackert, so, daß es zur Gährung gebracht wird, sollte nun der Acker nicht zweymahl dadurch mehr Nahrung für andere darauf gesäete Pflanzen erhalten, als wenn er von dem Unkraut nicht wäre bewachsen gewesen? Ich glaube allerdings *). Hier öffnet sich die Natur zu unserer Einsicht, zu wissen: woher es komme, daß ein Feld mit Gras bewachsen, ein, zwey, drey Jahre hindurch, wenn es herumgebrochen wird, das allerträchtigste Feld ist, ohne daß es gedüngt wird. Das darauf stehende Gras, welches nun faulet, war das Behältniß der gesammelten Pflanzen-Bestandtheile, die es der Erde in der Gährung zur Nahrung für andere übergab. Wenn man also auf dem Brachfelde das Unkraut

*) Wenn das Unkraut mit den darauf gebauten Pflanzen gleichartige Nahrung hatte, so kann und wird der Hr. Verf., so weit sich nämlich von einigen fixen Salzen und einigen Pfunden Erde etwas erwarten läßt, recht haben.

Kraut hasset und vertilget, so geschieht es nicht deßwegen, als wenn es dem Felde seine Nahrung entzöge. Es entziehet solche zwar, giebt sie aber zweyfach wieder heim, und geschiehet nur deßwegen, weil es, wenn man, bevor es verfault ist, andere Früchte aufsäet, diesen die Nahrung voraus wegnimmt, und den Saamen also im Wachsthum aufhält, und endlich selbsten vertilget. Glücklich also darf sich der Ackersmann preisen, der Felder hat, die auf das stärkste mit Unkraut von allerhand Art bewachsen sind, welches er vorher zur Gährung gebracht hat, und nachher Früchte einsäet *). Die beste und reichste Erndte ist ihm alsdenn

*) Noch glücklicher ist er meines Erachtens alsdann, wenn er des Unkrauts wenig, der Früchte aber alljährlich viel säet. Ist das Feld geschickt Unkraut zu nähren, warum sollte es nicht auch zur Hervorbringung ein und andrer brauchbaren Gewächse geschickt seyn? Ob übrigens dieser Vorschlag, Unkraut zu bauen, und damit andere Gewächse zu nähren, derjenigen Theorie, welche das freche Heranwachsen des Unkrauts auf Feldern, die zum Getraidebau unfähig worden sind, entspreche; bedarf ich wohl keiner Worte, dieses zu entziffern.

und dabey ohne allen andern Dung, auf etliche Jahre gewiß. Ja, er muß wohl thun, wenn er seinen Acker mit Unkrautsaamen, der gerne frech wächst, besäet, ihn, so er aufgewachsen ist, herumwirft, das Unkraut zur Gährung bringt, und seinen Getreidesaamen sodann ohne allen andern Dung aufsäet *). Auf das Vierte meine weitern Gedanken zu sagen: Es ist eine Erfahrung, die allgemein ist, daß Früchte einerley Art, auf einem und eben dem Acker hintereinander aufgesäet, nicht gedeihen, da doch eine andere Fruchtsorte, wenn das Feld damit bepflanzt wird, gut fortschlägt, und daß die erstere, nach etlichen Jahren wieder da gebauet, nicht nur nicht mehr versagt, sondern vielmehr

wieder

*) Dieser in sehr vielen Gegenden eingeführte Gebrauch, Pflanzen mit Pflanzen zu nähren, trägt das Gepräge einer schwankenden Theorie an der Stirne. In welchem Unbefangenen muß nicht, wenn er diese Düngungsart siehet, die Frage entstehen: Woher erhielten denn diese Gewächse ihre salzicht- und öhlichte Theile? Sind sie auch mit denen der Getraidearten homogen? Und sind es diese, warum bauet man nicht statt dieser sogleich brauchbare Gewächse, da doch 1 Cent. von ihnen, nicht mehr als höchstens eben so viel hervorbringen und ernähren kann?

wieder vollkommen gut aufwächst. Den Beweis kann man mit allen Fruchtarten machen, er ist aber an keiner Fruchtsorte so sichtbar, als bey dem Lein und den Erbsen *). Nichts ist also natürlicher gedacht, als sich zu entschliessen, mit der Aussaat jährlich zu wechseln. Diejenige Bauart des Ackerfeldes, bey der man die meisten Früchte erhält, ist die beste, diese aber ist die nicht, wo jedes Jahr von dem Felde nur zwey Theile besäet werden, der dritte Theil aber Brache liegt, um auf die Saat des Winter-Getreides, die allezeit die beste ist und am meisten in der Erndte abwirft, zubereiten zu kön-

*) Wenn ein Feld fruchtbar erhalten werden soll, so muß der Anbau desselben also eingerichtet werden, daß man das erste Jahr Gewächse erbauet, die größtentheils Kalk-, das andre aber solche, die größtentheils Kieselerde u. s. f. zu ihrer Nahrung bedürfen: denn bauet man jährlich Gewächse, die, obwohl äusserlich verschieden, dennoch einerley Nahrung d. h. Erdarten verlangen; so muß das Erdreich nothwendigerweise an einer Erdart arm, dadurch also für diese Gattung Gewächse unfruchtbar werden; wie diesem zuvorzukommen, wird der dritte Theil lehren.

nen, welches nothwendig ist. Könnte man aber den dritten Theil der Aecker auch aussäen und erndten, und ihn zugleich zur Wintersaat gehörig anschicken und bereiten, so wäre der Feldbau um 1/3tel verbessert. Ich will diese Bauart hier ansetzen und entwerfen. 1) Man säe im ersten Jahr (das Feld in 4 Fluren abgetheilt) auf das erste Viertel im Herbst Roggen, Dinkel, Wielerweizen, im folgenden Frühling in das zweyte Viertel Sommerroggen, Sommerdinkel, Weizen, Gersten, in das dritte Hafer, Erbsen, Linsen, und auf das vierte lauter Gemisch von Hafer, Erbsen, Wicken u. dergl. In das zweyte Viertel aber durchaus dreyblätterichten Klee. 2) Wie nun das Gemisch nach und nach abgegraßt worden ist, so wird auch die Stelle von 14. zu 14 Tagen mit Mist befahren, herumgeackert und zur Wintersaat zubereitet. Würde nun nach Bartholomäi diese Fütterung ein Ende nehmen, so müßten die Wiesen etwas beytragen, um Jacobi bis Michaelis würde man auch schon den Klee auf dem einen Viertel abmehen können, sonderlich wenn dasselbe im Frühlinge mit Gypsstaub bestreuet worden wäre; folglich würde man für den ersten Sommer

Füt-

Fütterung genug haben, zumahl so man sich mit Vieh nicht überstallen würde. Anmerkung: Außer dieser Art kann der Anbau der Felder also eingetheilet werden: 1) Winterfrüchte, 2) Sommerfrüchte mit Klee, 3) Klee, der sodann im Herbst umgestürzt und oben drauf Wintergetreide eingesäet wird. Oder: 1) Wielergetreide, 2) Reps, 3) Wintergetreide. Oder aber in 6. halben Abtheilungen auf 3 Jahre angelegt. Erstes Jahr: 2 Abtheilungen mit Winterfrüchten. Zweytes Jahr: eine mit Sommerfrüchten, Hafer, Gersten, mit rothem Klee angesäet; die andre mit Wurzelwerk: Kartoffeln, Turnips, Burgunderrüben, Viehmangold ꝛc. Drittes Jahr: eine Abtheilung mit Klee, der im Herbst oder Frühjahre gedüngt, im folgenden Herbst aber umgebrochen und mit Winterfrucht besäet wird; die andere mit Sommergetreide: Gersten, Linsen, Erbsen ꝛc. welches gleich nach der Erndte gedungt, und noch 2. 3 mahl zur Wintersaat gepflüget wird. 3) So nun also das zweyte Jahr herbey kommt, so hat man auf dem einen Viertel Klee, auf dem zweyten Wintergetreide, auf das dritte wird Sommergetreide und dar-

darunter wieder Klee gesäet, in das vierte aber, welches gleich im Frühling gedünget wird, kommen 4) Kartoffeln, Turnips oder Dickrüben, Sommerreps, auch Frühgersten u. d. gl. 5) Alle Herbst wird das Kleeviertel herumgestürzt, und wie an dem nehmlichen Herbst dahin, wo Kartoffeln, Turnips und dergleichen stunden, Wintergetreide gesäet wird, so werden im kommenden Frühling auf dieses im Herbst herumgeworfene Kleeviertel wieder Kartoffeln ꝛc. gebauet. So fährt man nach diesem Schema alle Jahre fort, und dünget nach Belieben mit Mist 1. oder 2 Viertel, oder bedient sich des übrigen Mistes, dessen man, wie ich bald zeigen werde, genug und im Ueberflusse, wann der Gedanke landwirthschaftlich gedacht seyn kann, haben wird. Ein Feld, also gebraucht und behandelt, ist auf allen Seiten und in allen Aussichten am besten benutzet. Selbst die nöthige Lockerheit und Schwere wird theils allemahl durch das Aufreissen des Kleeackers und dessen Inhalts, der Graßwurzeln, befördert und nach und nach durch den stets aufzustreuenden Gyps erhalten und gewonnen, so daß man die noch ziemlich beschwerlichen Auffuhren des Märgels

oder

oder des Sandes u. d. gl. nicht bedürfen wird. Man wird es allenthalben wahrnehmen, daß ein neugerissenes Wiesenfeld, es sey der Urstoff des Erdreichs schwer oder leicht, die zum Wachsthum der Frucht nöthige Beschaffenheit selten und wohl gar niemahlen vermisset. Es ist wahr, wenn ich ein Drittel meiner Felder mit Winterfrüchten angebauet habe, daß ich mehr an solchen Früchten einsammle, als wenn damit nur ein Viertel eben dieses Feldes eingesäet worden ist; allein da man hier in dem zwoten Viertel eben die Fruchtart, Roggen, Dinkel und Waizen (so man solche Ansaat auf recht guten wohlgedüngten, oder mit Gyps bestreuten Aeckern gegen die Regel der Abwechslung belieben wollte,) ersetzen kann, und man überdieß noch deren oder anderer Getraide Sorten vielmehr gewinnet, wenn mit dieser oder jener Fruchtart nun die Hälfte der Güter gesäet wäre, und Hafer ꝛc. und Klee die andere Hälfte befruchten, wer wird zweifeln, daß eine solche Benutzung der Ackerfelder nicht weit mehr Gewinn, als die gewöhnliche, abwerfe? Ein Viertel zum Düngen erfordert allezeit weniger Mist als ein Drittel mit Mist zu versehen, da-

her

her diese Feldbauart auch in Absicht auf den Dung ihre Vortheile verspricht. Ich will mich aber dieses Vortheils nicht bedienen; statt daß ich nur 1/4tel zu düngen habe, so will ich zwey oder gar drey Viertel mit leichterer Mühe düngen als vormals ein Drittel des Feldes. Man setze, daß das Hofackerfeld 21 Morgen wäre, so würden ja 5 1/4 Morgen ein Viertel ausmachen und also 5 1/4tel Morgen mit Klee besäet seyn. Aus erprobten beständigen Versuchen kann man Sommers hindurch von einem solchen Morgen zu 256 Quadratruthen wohl 8. bis 10 Stücke Vieh füttern, ich nehme aber nur 5 Stücke an, so erhalte ich damit Sommerfütterung für 26 Stück Vieh, zumahlen da das Kraut der Kartoffeln eine vortrefliche Fütterung und die Blätter von dem Turnips noch hinzukommen, die ich alsdenn des Winters hindurch mit meinen 9 Morgen Wiesen, Kartoffeln, Turnips u. d. gl. im vollauf zu ernähren im Stande bin. Auf einem solchen Hofe von 21 Morgen Aecker, 9 Morgen Wiesen, können bey dem gewöhnlichen Feldbau kaum 8 höchstens 9 Stücke Vieh erhalten und durchs ganze Jahr gefüttert werden. Man setze, daß ich statt 9 nun

26 Stück Vieh, also beynahe noch zweymahl mehr halte, so muß ich auch durch diesen Mist noch zweymahl mehr dungen können; wird es mir also schwer seyn, wenn ich mit dem Dung von 9 Stücken ein Drittel dünge, daß ich mit 26 Stücken zwey oder drey Viertel dünge? Ich meyne es nicht. Zumahlen ein Kleefeld herumgebrochen sich allemahl selbst dünget, und des Mistes gar nicht bedarf; denn die Kleestöcke geben dem Erdreich, wann sie gähren und faulen, noch einmal so viel wieder an Pflanzenbestandtheilen und Nahrung zurück, als sie aus ihm angezogen haben und empfiengen. Zumahl, da der Gyps, den man im Herbst oder im Frühling auf den Klee 2 Jahre nach einander aufsäet, zur Beförderung des Fruchtbaues ausserordentlich viel beyträgt, und dem allerbesten Dung nicht nur nicht nachstehet, sondern ihn auch noch sehr weit übertrift. Wenn nun ein Feld seinen nöthigen Dung überflüßig erhält, und hinlänglich zur Saat gebauet oder locker gemacht werden kann, und sich die Dungkraft des Mists überallhin austheilet, noch mehr, die untergeackerten Kräuter, Gras und Klee, darinnen auch zur allmähligen Gährung gebracht

wer-

werden, so kann ein solches Feld, bey gesegneter Witterung, unmöglich versagen. Das alles aber wird bey einer solchen Art des Feldbaues erhalten. Ich habe gesagt und angegeben, daß man das Kleestück allemahl im Herbst herumstürzen, im Frühling aber mit Kartoffeln, Turnips, weissen Rüben, Reps oder Gersten und Buchweizen anbauen solle. Dabey kann aber das Feld zur Wintersaat vollkommen bearbeitet werden. Die Kartoffeln, Turnips und die weissen Rüben werden den Sommer hindurch zweymahl behackt, das geschieht nun im Herausnehmen vor Michaelis, also zur rechten Saatzeit nochmahl, und dann wird der Acker zur Saat beackert. Ein Feld so oft herumgeworfen, ist gewiß besser gebauet, als bey der gewöhnlichen Bauart. Unter dem Sommerreps, Buchweizen und Frühgersten kann man zwar nicht arbeiten, aber da die drey Sorten bald zeitigen und vom Felde kommen, so kann das Feld bis zur Saatzeit noch vollkommen gut bearbeitet werden. Anmerkung: Zur Wintersaat muß das Feld bearbeitet und öfters herumgeworfen seyn; also muß man den Sommer hindurch entweder eine Frucht darauf

haben,

haben, die bald geerndtet werden kann, damit der Acker, bis die Wintersaat angehet, noch kann gebauet werden, oder man muß eine Fruchtsorte da bauen, unter und bey welcher das Feld den Sommer hindurch zugleich kann bearbeitet werden. Die erste Sorte ist der Sommerreps, Buchweizen, die zweyte Kartoffeln, Turnips und Rüben. Sollte aber der Arbeit, bey einer solchen Feldbauart und mit dergleichen Gewächssorten, nicht zu viel werden? So mögte es scheinen; allein wenn man überleget, daß man die Felder auch da, wenn sie in der Brache liegen, mehr als einmahl unter die Arbeit zu nehmen haben wird; wenn man überdenkt, daß nur die Rüben, es seyen die Turnips oder die weissen, mit der Haue und der Hand zu bebauen seyn werden, die Kartoffeln aber durch den Pflug im Anbau durchaus besorget werden können, so wird man sich damit die Arbeit nicht vermehret haben. Die Bauart der Kartoffeln: man ziehet mit dem Pfluge außen am Acker zwey Furchen; indem die dritte gezogen wird, so legt ein Kind, so hinter dem Ackersmann hergehet, die Kartoffeln in die Furche, die vierte decket diese zu, die fünfte oder sechste bleiben leer, in die siebente oder achte werden wieder

die Kartoffeln gelegt, und so geht es, ohne ein Beet zu formiren bis zum Ende fort; sind die Kartoffeln zwo Hand hoch gewachsen, so bespannt man den Pflug mit einem Pferde oder einem Ochsen, und schlägt eine oder zwo Furchen auf die eine, und eben so viel auf die andere Reihe der Kartoffeln, so sind sie gehäuft; beym Herausnehmen kann man sich der Haue oder auch des Pfluges bedienen und sie herauswerfen, so wird man über die Vermehrung der Arbeit wohl nicht klagen. So lange man das Feld, nach der gewohnten Weise, nur in drey Fluren abtheilet, so lange ist man nicht im Stande, die so natürlich nothwendige Umwechselung der Ansäeung der Getreidesorten so zu beobachten, als wenn das Feld in vier Fluren getheilt ist. Ich gewinne damit ein Jahr, und das macht hier schon ein nicht geringes aus; denn je seltner einerley Fruchtsorte auf einem und eben dem Acker ausgesäet wird, je besser muß eine Fruchtsorte durch die indessen erfolgte Sammlung ihrer Bestandtheile erfolgen. Wenn ich angegeben habe, Sommerroggen, Dinkel und Weizen auf das dritte Viertel zu säen, so ist es nicht

nöthig,

nöthig, solches für beständig zu thun; die Sommergerste von dreyerley Arten, Buchweizen und andere Fruchtgattungen, können zur Abwechselung gebraucht und gesäet werden *). Man hat sich vor der Kostbarkeit des Anbaues des Klees gar nicht zu fürchten. Mit 4 Maas säet man einen Morgen von 256 Ruthen an, und wenn man den Kleesaamen darauf selbst zu ziehen gedenket, so würde man ohnfehlbar darauf 50 bis 60 Maas wieder gewinnen; ein geringer Platz also würde die 4 Maas ersetzen. Der Saame wird so erzogen, daß man den Klee im Frühling das erstemahl abgraßt, dann

*) Bey der Abwechslung muß man nicht auf den Wechsel der Pflanzen allein, sondern auch bey diesem auf die Nahrung derselben Rücksicht nehmen: fehlet man hier, so muß das Feld in kurzer Zeit unfruchtbar werden; denn es finden sich Sommer- und Winterfrüchte, Hülsen- und Wurzelgewächse, die bey ihrer äusserlichen Verschiedenheit dennoch eine und die nämliche Nahrung verlangen. Bauet man diese also nach einander, was kann hierdurch anders bewirket werden, als eine Entkräftung des Feldes?

läßt man ihn bis zu dem Herbst fortwachsen und zeitigen, alsdenn wird er wohl gedörrt, gedroschen, und der Saame durch das Sieb gesäubert. Wer den Klee häufig ziehen wollte, würde damit mehr gewinnen, als wenn der Acker Früchte von irgend einer Art getragen hätte. Das Maas oder 3 Pfund werden bey uns für 1 Gulden verkauft, also würde der Morgen eine reichere Abgabe gewähren, als wenn man ihn dreymahl als Haferfeld beerndtet. Aber wo weiden Schaafe, Schweine, Gänse, wenn alle Brache abgeschaft ist? Da wollte ich antworten, wo Menschenhände nichts zu säen und zu erndten vermögen, wenn sie keine dergleichen Feldstrecken hätten, so würden Schweine und Gänse zu Hause gefüttert, die Schaafe aber würden aus einem solchen Lande verwiesen, oder man säete auch für sie einige solche Stücke mit Klee an, um sie da bis auf die Erndte zu weiden, wo sie alsdenn wieder Futhen genug haben. Soll man denn den kleinen Gewinn dem größern vorziehen? soll man nicht lieber 1000 fl. statt 200 fl.

Gewinn nehmen wollen? 100 Morgen Brachäcker ernähren nicht so viele Schaafe. Gesetzt aber, daß sie da ernährt werden, daß sie 200 fl. lautern Gewinn geben, welches viel ist, sollten nicht 100 Morgen Brachfelder mit Getreide besäet, 1000 fl. gewissen Gewinn abwerfen? Ich meyne es wohl! Es ist nichts mehr übrig, als zu sagen: wie ich denke, daß ich damit erwiesen habe, daß man des Volks in irgend einem Lande noch lange nicht genug, vielweniger dessen zu viel habe, und daß Jahrhunderte werden dahin gehen, bis man werde Ursache finden, den Unterthan für so gering zu schätzen, als es jetzt geschieht. Würde ein Land seyn, wo man die Vielheit der Unterthanen wünschte, so wüßte ich keinen bessern Vorschlag, als diesen, den ich damit gethan habe: Je mehr man Raum machet zu wohnen, je mehr Paare werden sich heurathen und ansetzen. Oede Plätze, Huthungen, wie auch unmäßig große Bauernhöfe, selbst die kleinern, wenn sie tüchtig gebauet werden, können um die Hälfte, wenigstens noch ein Drit-

tel mehr, abwerfen, wenn sie getheilt und neuen Eheleuten zugesprochen werden, geben Raum für viele Millionen Menschen, die dadurch Deutschland zu bewohnen, ihr Gewerbe zu treiben, ihr Brod zu gewinnen, und da im Verlauf zu leben, in Stand kommen.

VI.

Briefwechsel

über

verschiedene Gegenstände der Landwirthschaft, den Gyps und den Märgel.

P. P.

Ew. ꝛc. ꝛc. sehr geehrtes Antwortschreiben, mit beygefügtem Modelle, vom 14. p. m. hatte ich das größte Vergnügen mit voriger Post zu erhalten. Ein eben gegenwärtiger geschickter Mühlenmeister fand an dem Mergeltrog eine Verbesserung anzubringen, und ihm wurde aufgegeben, davon ein Modell zu machen; so bald es geliefert seyn wird, werde ich die Ehre haben, ein nachgemachtes Modell davon an Ew. ꝛc. zu übersenden. Diesem Müller haben meines Herrn Principals Excellenz *) den Bau der anzulegenden Gypsmühle, zur Bereitung des Gipses, Duchsteines und des Märgels **) aufgetragen. Von

*) Herr von Schulenburg.

**) Die Zermalmung des Märgels und Tuphsteins, welche sehr leicht von statten gehet, müßte nachgeahmt auf alle Fälle von sehr großem Nutzen seyn; denn erstlich würde man den Nutzen der Bemärglung gleich im ersten Jahre genießen; zweytens, die Hälfte der Fuhren ersparen; und drittens, dem Felde nicht durch ein Uebermaas Schaden verursachen können, welches außer diesem nicht selten geschieht.

dem Märgel sende ich hier 6 verschiedene Arten. Eine Sorte ist Thonmärgel, welche gar leicht aufgelöset wird, die andre Sorte aber ist ein blaulichter, auch grauer Steinmärgel, der nach Beschaffenheit seiner Bestandtheile erst in verschiedenen Jahren aufgelöset wird, wie man von beyden Sorten mit Nutzen Proben allhier gemacht hat. Alle diese 6 Sorten halten, nach des Herrn Apothecker Andreä in Hannover chemischen Auflösungen, respective 2/3tel und 5/6tel Kalk, wenigen Thon, Sand, und überall keine Spur von Eisen. Mit dem Gyps, gebrannt und gemahlen, haben Ihro Excellenz in diesem Herbste ebenfalls sogleich die Proben auf Ackerlande, auch auf Wiesen machen lassen, und Sie zweifflen nicht an dem guten Nutzen dieser Düngung. Als Ihro Excellenz wegen Anlegung der Gypsmühle an verschiedene Orte hiesiger Gegend kunstverständige Leute verschickt hatten, um deren Beschaffenheit zu erforschen: so haben selbige mitreferiret, daß der Gyps bisher nur gebrannt und zum Uebergiessen debitiret worden, außer auf einer Mühle im Amte Gandersheim, an der Hildesheimischen Gränze zu Kreinsen, woselbst ein Bauer aus dem Hildesheimischen schon vor verschiedenen Jahren

etliche

etliche Himten Gyps geholet und dem Müller auf sein Befragen, wozu er den Gyps gebrauchen wolle? geantwortet hat: er wolle damit eine Probe machen, und wenn diese einschlüge, so könnte er ihn zum reichen Manne machen. Dieser Mann hat auch in der Folge einen ganzen Ofen mit Gyps bestellet und abgeholet, und in dieser Gegend ist auch unter den Landleuten diese Art des Düngers mit Gyps seit 12 Jahren nützlich bekannt, und auch in den Aemtern Gandersheim, Stauffenberg, Greena und Uslar mit besondern guten Nutzen, aber auf dem Eichsfelde beym Esparsette *) und überhaupt auf Wiesen und Feldern gebraucht worden. Zu bewundern ist es, daß es bishero noch nicht allgemein geworden, und die Güte dieser bequemen Düngung bis so lang in so engen Gegenden eingeschlossen geblieben. Bey dem Gypse,

davon

*) Nach mehrmahls angestellten Untersuchungen besitzen 2 Pfund dergleichen grünen Klees, oder 20 Loth Kleeheu, zwar sehr viel vitriolichte Salze, aber nur 4 Gran Gyps; ein Gewicht, welches dem im Luzerner Klee nicht gleich kommt. Man muß daher bey der Anwendung desselben sehr vorsichtig zu Werke geben; denn der mindeste Ueberfluß erzielet bey diesem Gewächse Schaden.

davon, en miniature verschiedene chemische Proben angestellet worden, muß ich Ew. ꝛc. hiervon zu dero Beurtheilung einige Eröfnung geben, und mir darüber Dero Meynung gehorsamst erbitten. Der zur Probe von den fremden Gypsmühlen anhero in ganzen Stücken zurückgebrachte Gyps ist ungleich und durchaus weisser als der hiesige, doch könnte der hiesige, wann er erst durch kunsterfahrne Leute gebrannt wird — denn bis itzo ist dieses nicht im Ofen, sondern nur in freyer Luft geschehen — vielleicht beym Brennen durchaus weiß werden. Der von fremden Orten gelieferte Gyps hat so wenig in Stücken als klein gemacht, und angefeuchtet, einigen andern Geruch als nach Kalk. Der hiesige Gyps ist, roh und ungebrannt klein gemahlen, alsdenn mit Wasser angefeuchtet, von sehr starkem Schwefelgeruche, aber gebrannt und etwas klein gemacht und mit Wasser, besonders aber mit Eßig befeuchtet, giebt er keinen andern Geruch als gelöschter Kalk von sich: wobey auch noch dieses sonderbar ist, daß, wenn dieser rohe Gyps in einem Mörser auch ganz klein gerieben wird, derselbe diesen Geruch eben nicht stark hat, hingegen derjenige, so auf einer Mahlmühle klein gemahlen wird, ungemein

stark riechet, besonders wann er angefeuchtet wird. Woran liegt die Ursache des stärkern und weniger starken Geruchs des hiesigen gebrannten und rohen Gypses? liegt er etwa an der Art des Kleinmachens *)? Ertheilen Sie mir doch hievon Dero gütige Meynung. In dem hiesigen Gypsbruche findet sich noch eine Art Gyps, dieser ist dem Ansehen nach sehr erdhaftig, mit Marienglasadern vermischt, von sehr dunkler Farbe gegen den andern Gipsstein, und sehr mürbe, daß er gar leicht mit blossen Fingern gerieben werden kann. Wenn dieser Stein aus dem Bruche kommt, giebt er sehr viele Feuchtigkeit von sich,

*) Der Farbe, so wie der angeführten Eigenschaft nach, besitzet der erwähnte Gyps viel Brennbares, und dieses wird aus solchem, im rohen Zustande, durch Stampfen und Reiben, welches ihn erhitzet, flüchtig gemacht. Je weniger also diese Reibung und Erhitzung geschiehet, desto geringer ist die Ausscheidung, also auch der Geruch desselbigen; bey dem gebrannten Gyps wird dieses Brennbare durch die Hitze des Feuers weggetrieben, und die in demselben befindliche noch ungesättigte Kalkerde, von welcher mehrere Gypsarten frey sind, zu lebendigem Kalke gebrannt; der Schwefelgeruch fällt also weg, und es zeiget sich dagegen der Geruch des lebendigen Kalks.

sich, wenn er aber in der Luft oder auf dem Ofen getrocknet wird, wird er härter, doch bey weitem nicht so feste und hart als der andre Gypsstein, jedoch kann dieser Stein alsdann auch noch sehr leicht entzwey gemacht werden. Diese Art Gyps gebrannt, klein gemacht, mit Wasser oder Eßig angenetzet, riecht wie der vorhin gedachte roh gemahlene Gyps, roh hingegen gar nicht. Man hat diesen Gypsgries hiesiger Gegend zwischen den Gypssteinen schon vorhin ausgegraben, durchgesiebet und auf die Wiesen und Hülsenfrüchte gestreuet, und Dux genannt, und davon eben den Nutzen gehabt in Ansehung des Klees auf trocknen Wiesen, welchen Ew. ꝛc. von dem Gyps bekannt gemacht. Von diesem Dux kömmt hiebey eine kleine Probe. Ich bin kein Physicus und verstehe mich nicht aufs laboriren; doch ist dieser Stein auch mit an den Herrn Apothecker Andreä nach Hannover gesandt worden, von dem man eine Antwort hierüber erwartet, und von Ew. ꝛc. wünschte ich auch gar sehr Dero Meynung zu bekommen. Jetztgedachter Herr Andreä ist ein Mitglied der Zellischen ökonomischen Gesellschaft, und hat auf Befehl der königlichen Kammer zu Hannover von den Erdarten geschrieben,

der

der Tractat wird Ew. ꝛc. vermuthlich bekannt seyn, sonsten ich damit dienen werde. Seiner Meynung von dem Märgel contradiciret eine gemachte Observation, auf einer hieher zehndpflichtigen Feldmark, deren Kolonisten der Märgel aus meines Herrn Principals Excellenz Märgelgruben verabfolget worden, und diese Observation widerspricht auch der Meynung anderer Oekonomen von der Märgeldüngung; denn nach dem angenommenen Principio von dem Märgel muß dem lande an ordinairem Dünger nichts entzogen werden, hier aber haben diese Zehndpflichtige vor Gericht an Eydesstatt ausgesagt, daß sie auf einigen lande in 20 Jahren keinen ordinairen Dünger gebracht und doch darauf immer besser Korn geerndet hätten. Auf andern Feldern, darauf sie vorhin 10 Fuder Mist auf einen Morgen zu 120 □ Ruthen Kalenbergischen Maaßes gefahren, hätten sie nur 6 Fuder Mist und 25 Fuder Märgel gefahren. Daß diese Leute immer bessere Erndten gethan, ergeben die hiesigen Zehndtregister, nach welchen seit der Zeit, als die Leute ihr Land gemärgelt haben, die Erndte zunehmend besser ausfällt, da sie doch vor der Märgelung den Acker wegen seines schlechten Ertrags zu bauen nicht sonderlich

ge-

geflissen gewesen sind. Jener Acker liegt an Bergen, ist leimartig, mit wenig oder gar keinem Sande vermischt *). Woher kommt es, daß das allgemein angenommene Principium von der Märgelung durch diese Observation für nicht richtig zu halten ist? daß aber das angenommene Principium richtig zu seyn scheinet, beweisen ein und andere Feldmarken, auf welchen die Kolonisten ohne Hinzuführung des Düngers gesäet haben, nunmehro aber sich ihr Land in solchem Stande befindet, daß es sehr schlecht wird, und man hier behaupten möchte, daß sie ihr Land, wie man sagt, ausgemärgelt hätten **). Eine fleißige Nachforschung und Unter-

*) Da jene Aecker nach dieser Beschreibung Mangel an Kalk und Bittererde hatten, welche die mehresten Getreidearten bedürfen: so erkläret es sich von selbst, wie sehr der Märgel ihre Fruchtbarkeit befördert haben möge? das, was ihnen fehlte und sie durch Mist nur sparsam erhielten, bekamen sie durch ihn in hinreichender Menge.

**) Diese Erfahrung lehret: daß nicht Luft und Wasser allein, sondern auch die Erde, und zwar letztere materialiter die Pflanzen nähre. Die erwähnten bemärgelten Felder verlohren nehmlich

von

tersuchung möchte die Ursache des angenommenen Satzes mit der gemachten Exception konciliiren können. Was meinen Sie davon? Ew. ꝛc. empfehle mich zu fernerer geneigten Freundschaft, und beharre mit aller Hochachtung,

Ew. ꝛc.

H. . . den 4. Dec. 1769.

Antwortschreiben.

P. P.

Ihr Gyps, der Dux, dem Sie durch seinen Titel einen so großen Vorrang einzuräumen scheinen, hatte Ihr mir so werthes Schreiben gänz-

von Jahr zu Jahr durch die von ihnen erzogene und ernährte Früchte, den größten Theil ihrer Kalk, und Bittererde, welche ihre Fruchtbarkeit ausmachte; sie mußten daher, da ihnen solche nicht wieder ersetzet wurde, aufhören, wenigstens für diese Arten Gewächse fruchtbar zu seyn. Ich habe Felder, die vor 30. 36 Jahren mit Kalkmärgel überfahren wurden und nun anfiengen, sich unfruchtbar zu zeigen, untersucht, und habe stets gefunden, daß sie höchstens 3. 4 Procent Kalkerde annoch enthielten.

gänzlich durchlöchert, mit Mühe habe ich es endlich gelesen, und den Inhalt Ihrer Fragen und Nachrichten errathen. Ich will Ihnen nun darüber so viel sagen, als ich vermag. Sie kommen vom Gyps auf den Märgel. Der Märgel ist den Farben nach allerdings verschieden; allein man kann nicht sagen, daß die Farben die Grade seiner Güte bestimmen: Märgel von einer und eben der Farbe ist gut und auch schlecht. Es kommt, meines Ermessens, hiebey darauf an, ob er sich ganz oder nicht ganz auflöset; ob er mit zurückgelassenen unauflösbaren Steinchen das Erdreich beschweret, oder sich zum Vortheil des Erdgrundes gänzlich in Erde verkehret. Ich ehre die Versuche, welche der um den Feldbau so verdiente Herr Apotheker Andreä zu Hannover durch die Chemie mit dem Märgel gemacht und dabey entdeckt hat, daß er respective 2/3 und 5/6 Kalk, etwas Thon, Sand, Eisen aber gar nicht enthalte *); allein zu sagen, was ich denke! Die Chymie ist

*) Da Herr Andreä viele Arten Märgels angiebt; so ist diese Bestimmung nur von einigen Gattungen zu verstehen. Eisenfrey habe ich übrigens aber noch keinen Märgel gefunden.

ist mir allzuverdächtig; ihre gewaltsame Operationen scheinen mir zu Entdeckungen in Dingen von der Art nicht zulänglich zu seyn; die Theile, die wir gerne entdeckten, verfliegen durchs Feuer, bleiben unsichtbar *), und die Cruditäten, die zurück bleiben, lassen uns im Finstern nur ungewiß muthmaßen. Ich bleibe dabey, daß das Auslaugen bessere Dienste zu leisten im Stande sey; jedoch aber die chemischen Versuche ganz zu verwerfen, bin ich nicht Sinnes; vielleicht bin ich nur eifersüchtig, weil ich schon vielmahls gewünscht habe, selbst ein Chymist zu seyn, aber von dieser Kunst gar wenig oder gar nichts verstehe. Ich tröste mich damit, daß ich sie bey meinem Plane wenig oder gar nicht bedarf. Die Gründe meines Plans sind kurz diese: Es giebt zweyerley Erdarten, die zu schwere, und die zu leichte; aus

*) Hier irrt der Hr. V. sehr: nicht nur die sichtbaren, flüchtigen, sondern auch die unsichtbaren Theile werden aufgefangen, entdeckt, geprüft und erkannt. Wer sich je in den neuern Schriften der Chymisten umgesehen hat, wird an dem, was ich hier sage, nicht nur nicht zweifeln, sondern er wird in Wahrheit auch eine Bestätigung für ganz überflüßig halten.

beider Mischung entstehet die dritte, oder die fruchtbare, welche wir suchen. Nicht die Erde, sondern die Oehle, die Salze, das Wasser und die feinste Erde, diese vier Stücke zusammen gemischt, sind die Nahrung aller Geschöpfe. Ich frage nicht, was diese und jene Erde enthalte, aber ich frage, ob sie schwer, leicht oder vom rechten Gewicht sey, ob sie die Nahrungen der Gewächse anzuziehen, zu behalten, und wieder mitzutheilen vermöge; wie sie zuzubereiten und in eine ebene Schwere versetzt zu werden ein Geschick habe. Ich bereite die Erde so, wie sie mir recht zu seyn deucht, und dann mache ich mit ihr Versuche, gerade so, wie Se. Hochgräfl. Excellenz, Ihr gnädigster Graf und Herr, befehlen, den vergangenen Herbst noch mit dem Gyps zu verfahren und Proben zu machen. Man macht die Versuche im Kleinen, gerathen sie nicht, so schaden sie nichts; nutzen sie aber, so ist der Gewinn im Großen alsdenn mit Gewißheit in der Folge zu hoffen ꝛc. Der Bauer, der schon, wie Sie sagen, 12 Jahre her seine Güter mit Gyps gedüngt, und unsre Gegend hieraussen liefern den Beweis für die thätige Vorsorge Gottes. Zwölf Jahre schon düngte

dieser

dieſer Bauer mit dem Gyps? Das iſt ſchon lange, doch nicht ſo lange, als die Alten die Felder damit zum Fruchtbau gedüngt haben: ubi agros ſtercorarent candida foſſilia creta. Dieſes ſind die Worte des Varro, welchen er dieſe unmittelbar vorſetzt: In Gallia transalpina intus ad Rhenum, cum exercitum ducerem, aliquot regiones acceſſi, ubi nec vitis, nec olea naſcerentur. Irre ich nicht, ſo ſind da unſere alten Deutſchen als Erfinder dieſes herrlichen Dungmittels geprieſen; denn mich deucht, daß candida foſſilia creta nichts anders ſey, da ja bekannt iſt, daß der reinſte weiße Gyps wie Kreide gebraucht, und aus einem nicht ſo feinen die wirkliche Kreide gebrannt wird *). Sie ſagen erſtlich: der Gyps, den Sie ſelbſt hätten, wäre nicht ſo weiß, wie der, den man in andern Orten um Ihnen herum ausgrabe: auch durch das Brennen werde er ſo weiß nicht als der fremde es roh ſey. Was wollen Sie damit? Iſt ihnen etwa wohl bange, daß der

*) Dieſer ganz weiſſe Gyps iſt bekanntlich ſehr porös und leicht, und dünget ſo gut als der ſchwerſte: wie erklärt man nun ſeine Wirkung nach der Theorie, welche auf die Attraktion gegründet iſt?

schwärzere nicht eben so dünge als der weiße? Was sorgen Sie um daß Brennen? weder das eine noch das andre werden Sie, wenn Sie den Gyps zur Düngung verbrauchen, bedürfen. Der Gyps, der fahle und der weiße, wie er denn so verschieden auch bey uns ist, ist zur Düngung gleich gut und vortreflich. Was ist es nöthig ihn zu brennen, wenn er roh eben so gut als gebrannt düngt, und roh allem Ansehen nach besser anschlägt als gebrannt? Der Gestank, der von ihm weggehet wenn er gebrannt wird, verräth ein weggehendes Oehl, Oehl aber ist ohnstreitig die Nahrung der Pflanzen, und wird nützlicher mit dem rohen Gyps auf die Felder gebracht als durch den Brand desselben in die Lüfte verjagt. Allein gebrannt ist er leichter zu zermalmen! das leugne ich nicht; aber wer wird das leugnen, daß ihn das Brennen vertheuert? Ich will aber einen Dung haben der wohlfeil und gut ist; es kommt bey jedem auf seinen Entzweck allerdings an, wünscht jemand leichtere Arbeit und theueren Dung, so bin ich es eben auch zufrieden. Geduld! die Stampfmühle zum Gyps wird schlechten Unterschied machen ob sie rohen oder gebrannten zerpuffet.

Die

Die Gypse aus verschiedenen Orten und die aus einer und eben der Grube haben, bey verschiedener Behandlung, einen verschiedenen Geruch; der von fremden Orten hat einen Kalk, der von Ihrer Grube hat einen starken Schwefelgeruch, wenn er ungebrannt mit Wasser angefeuchtet wird. Daß der Gyps gebrannt im Mörser zerrieben den Grad des Kalkgeruchs nicht hat, wie der so auf der Mühle gemahlen worden, ist eine Naturerscheinung, welche ihren Grund in der weniger oder mehrern Auflösung des Gypses, durch den Mörser oder die Mühle, wohl haben wird, und die eigentlich zu der Sache nichts beyträgt. So viel ist richtig, daß der Gyps, der gemeine und Alabastergyps besonders, sehr viele Salze besitzet *), und noth-

 wendig

*) Der Gyps, als eine bereits mit Säure gesättigte Erde betrachtet, führet, etwas flüchtiges Laugensalz ausgenommen, kein Salz; er wird daher niemahls, wie weiter gemeldet wird, ein fixes Laugensalz durch das Auslaugen und Einkochen zurücklassen; dasjenige Salz, oder wie ich glaube kalkartige Wesen, welches mit einigen Salztheilen vermischt seyn konnte, war nicht im Gyps sondern in dem angewendeten Wasser enthalten, denn auch das reinste Quellwasser läßt eingekocht dergleichen Substanzen zurück.

wendig muß er sie aus der Luft nach und nach anziehen; man zerstoße ihn roh, schütte Wasser über denselben und lasse beydes etliche Tage, dabey einigemahl umgerührt, stehen, man gieße das Wasser ab, nachdem es filtrirt ist, und siede es auf Kohlen ganz langsam nach und nach ein, das, was zurückbleibt, hat nicht nur den feinsten Salzgeschmack auf der Zunge, sondern äußert sich auch als alcalisch dadurch, wenn man ihm einen sauren Geist zugießet, da es heftig und sehr anhaltend aufbrauset. Der Dux an dem Ew. ꝛc. gleiche Erscheinungen und Wirkungen wahrnehmen, ist wirklich nichts anders als unzeitiger Gyps. Er ist noch im Werden, jetzt ist er mehr Erde als Schiefer, denn wird er mehr Schiefer als Stein seyn und endlich sich in einen festen Stein umwandeln *). Seine Auflösung wird es erweisen, denn da wo einerley Erscheinung, einerley Wirkung hervorkommt, da muß wohl einerley wirkende Ursache und Grundwesen vorhanden und da seyn. Wir haben überall, da wo der Gyps

liegt,

*) Der Dux ist eine mit Vitriolsäure nicht ganz gesättigte Kalkerde, also ein unvollkommener Gyps.

liegt, dergleichen unzeitige Materie, und es sey der Prüfung überlassen, ob nicht da unterhalb und tiefer, wo oberhalb diese Gypserde liegt, der Gyps selbst in Schiefern und Steinen sich vorfindet. Ich zweifle nicht, daß Herr Apothecker Andräe im Stande sey das Rätzel aufzulösen. Sein Buch besitze ich zwar nicht, aber weil Ew. ꝛc. sagen, daß er seines rühmlichen Eifers willen, den er in chemischen Arbeiten beweiset, die Ehre habe ein Mitglied der berühmten Gesellschaft in Zelle zu seyn: so macht mich dieses freylich lüstern dasselbe zu haben und zu lesen. Ich vermuthe von Rechtswegen was ausnehmend Schönes; zumahlen da ich ersehe, daß derselbe auch seine Meinung vom Märgel mit Grunde, worinnen ich ihm allerdings beypflichte, gesagt hat: denn nimmermehr werde ich glauben, daß der Märgel selbst materialiter zur Nahrung der Pflanzen etwas beytrage. Ich behaupte mit ihm, daß sein Ganzes, was er auf den Feldern nutzet, nur instrumentaliter geschehe. Ich glaube nicht, daß eine Gegend in Teutschland, davon so wie die unsrige, durch 60 und 70 Jahre Beweise aufzuzeigen im Stande seyn wird. D. Büsching in seiner Erd-

beschreibung, in dem Articul von Hohenlohe, sey hier mein Gewährsmann, wo er Kupferzell nennet. Wir haben von Natur das schlechteste ganz weiße und magerste Erdreich; aber, Gott lob! durch den Gebrauch des Märgels, unter göttlichen Segen, die fetteste und tragbarste Ebene. Ich muß gleich Anfangs gestehen, daß ich die Art der Ackermärglung bey Ihnen noch nicht recht einsehe, und zweifle ob sie mit der unsrigen übereinkomme. Da Sie sagen, daß Ihre Bauern auf einen Morgen von 120 Quadratruthen, 25 Fuhren Märgel und 6 Wagen voll Mist führten, so scheint es mir als wenn sie alle 3 Jahre beydes zugleich thäten, welches aber bey unserer Art die Aecker zu märgeln, ganz anders geschiehet. Wir märgeln einen Morgen zu 156 Quatratruthen mit 100 Wagen Märgel, solchen von 4 Ochsen gezogen, einmahl; und dieses geschiehet auf 12. bis 30 Jahre hin nicht mehr. Daß Ihre Ackersleute endlich behaupten, ihr Feld in 20 Jahren, nachdem sie es gemärgelt hätten, nicht gedüngt und doch gute Erndten gehabt zu haben, ist eine seltsame Erscheinung, und ich begreife ihren Grund eben so wenig als Sie.

Der

Der Acker liegt an einem Berge, er ist, glaube ich, sehr mahlicht, mürbe, locker und von den Sonnenstrahlen sehr zu Staub gebrannt *). Ist dieses, so ist wohl die Auflösung des Knoten geschehen. Ihre Bauern führen den Märgel allen, den ein solcher Acker bedarf, nicht zu einemmahle auf, oder sie führen ihn allen zugleich auf; in beyden Fällen ist die Wirkung auf mehrere Jahre wohl möglich; führen sie ihn nach und nach auf, so wird die Zunahme einer guten Erndte nach und nach und so lange hin anwachsen, bis der Acker des Märgels wird genug haben; so bald dieses geschehen ist, und sie probiren ihre Auffuhren weiter, so wird er versagen. Führen sie den nöthigen Märgel auf einmahl alle zugleich auf, so ist der Erfolg wieder nicht unmöglich. Der gewisse Erfolg ist aber allemahl dieser: daß ein Acker versaget, welcher nicht neben dem Märgel auch seine Dün-

*) Da das Erdreich, des erstern Briefes zufolge, als leimicht und frey von Sande beschrieben wird, ist hieraus zu schließen, daß es eher feste als locker und mahlicht gewesen sey.

Düngung erhält *), weil es nicht möglich ist, wenn er alle Jahre oder nur 2 Jahre aneinander gebauet wird, und nur allemahl im zten Jahr ruhen soll, daß er die nöthigen Nahrungstheile alle aus der Luft anziehe, daher ist das Phänomen bey den gemärgelten und nicht etwas gedüngten Aeckern künftig ohnfehlbar zu sehen, welches andere Bauern schon empfunden, die das nemliche gethan und versucht haben. Ohne Hinzuthuung des Dungs ist der Märgel nichts, und ohne einen leichten Acker gemärgelt zu haben, ist auch der Dung nichts; beyde aber verbunden thun allerdings Wunder. Ein gemärgelter Acker aber braucht nur die Hälfte des Dungs, den er ohne vielen Erfolg vorher erhielt.

*) Bemärgelte ebenliegende Aecker, bey welchen kein Wegflößen statt finden kann, versagen aber dennoch, wie dieses die Kupferzeller Felder bestätigen, nach 20. 30 Jahren, werden sie auch alle Jahre reichlich gedünget eben so, obwohl einige Jahre später, wie diejenigen so nicht gedünget worden sind, da sie doch durch den Bau immer verbessert dadurch mehrere Berührungspunkte erhalten, von Jahr zu Jahre fruchtbarer, nicht aber wie dieses stets der Fall ist, unfruchtbarer werden sollen.

hielt. Unsere gemärgelte großen Morgen bedürfen 7 Wagen voll Dungs, und wir schneiden (wir mähen alles ab, und das thun wir mit ungemein weniger Mühe und Kosten, und also mit sehr großen Vortheil,) 50. 60. auch mehr Neunling Roggen und Dinkel, nehmlich 500 — 600 Garben mitlerer Größe darauf. Wie ist Ihren guten Bauern aber zu rathen, die den Verderb ihrer Aecker erkennen, und ihre Aecker also ausgemärgelt beklagen? Glauben Sie es ja nicht, daß der Märgel an dem Verderb des Ackers selbst Schuld sey, oder besser und bestimmter gesagt, das Acker- oder Pflanzenfett aus dem Acker ausgesogen habe. Ein Acker, der kein Pflanzenfett hat, kann keines verliehren; ein leichter Acker, der nichts taugt, und keine Frucht trägt, der weiße, der Leimen- der Sandacker, hat kein Ackerfett, sonst würde er Früchte zeigen: also kann ihn auch das Märgeln nicht aussaugen oder ausmärgeln. Hier haben Sie den Beweis in einem Syllogismus und den sogar in der besten Figur! Wenn ein solches Verderben des Ackers auf die Märgelung erfolgt, so wissen unsre Bauern recht vollkommen zu rathen. Ich wollte Ihnen ihre untrügliche

Maxime überschreiben; allein da sie mein Buch schon in zwey Abhandlungen enthält, so will ich sie hier nicht zum drittenmahl hersetzen. Belieben Sie solche zu durchlesen, so werden Sie die Stellen, die die Hülfe entdecken, bald antreffen. Rathen Sie diese Weise keck an, damit wird diesen Bedrängten gewißlich geholfen, dafür stehe ich Bürge. Eben, da ich denn Schluß war, habe ich die Ehre, Ew. Hochedelgebohrn Werthestes unterm 13. Febr. zu entsiegeln; ich beantworte solches also hier nach meinen schwachen Kräften und geringen Einsichten.

Auf das Nro. 1. Daß ein Fuder Märgel zu graben und zu führen auf 1 Rthlr. bey Ihnen zu stehen komme, muß ich meine Verwunderung bezeugen; weil ich den Grund der Kosten fast nicht begreife. Bey uns kommt eine Fuhr von 4 Ochsen gezogen, eine Viertelstund weit geführt, etwa auf 15 kr. und ein solcher Wagen, dem zween Menschen zum Auf- und Abladen überhaupt zugegeben sind, ist im Stande, des Tags 12mahl zu fahren. Dadurch ergiebt es sich von selbst, daß ein Morgen mit 30 fl. 26 kr. oder in 8 1/3tels Tag gemärgelt werden kann. Will man diese 30 fl. 26 kr. auf 25 Jahre ver-

vertheilen, da der Trieb des Märgels auch über 30 Jahre in vielen Feldern, als in den ebenliegenden anhält, so würde auf jedes Jahr nicht 1 fl. 15 kr. vertheilt werden müssen, die Kosten sind folglich sehr geringe, und ein einziges Jahr wird sie auf einmahl alle bezahlen. Ein Morgen ungemärgelt giebt bey uns kaum 20 Neunling, nehmlich kaum 200 Garben, da der gemärgelte 500 gewiß abwirft. Ew. Hochedelgebohrn glauben mir dießmahl auf mein Wort: der Märgel ist auf Feldern von leichten Feldgründen allenthalben zu finden. Unsre Bauern entdecken ihn fast überall mitten auf allen ihren Aeckern, und führen ihn deßwegen niemahls weit her. Wäre das bey Ihnen nicht auch so, so müßte es Ihren Landsleuten wohl auch so ergehen, wie den Bewohnern der Churpfalz, welche bis hieher vom Märgel viel hörten, aber ihn nicht eher kannten, als bis erst vor etlichen Tagen der um die Churpfalz so verdiente Herr Regierungsrath und Landschreiber des Oberamts Heidelberg, Herr Weden, deshalben drei verständige und sehr einsichtsvolle Männer von Oberamtswegen an mich abschickte, welchen ich unsern Reichthum an Märgel von allen Sorten allenthalben aufwies, um ihn ihnen kenntbar

zu machen. Seitdem wissen sie, daß sie in der Churpfalz eine Menge dieser Erde, dieses Schiefers und dieser Steine zum wichtigsten Vortheil des Ackerbaues besitzen. Irre ich, so wird es doch nichts schaden, wenn ich Ihnen von allen Gattungen unsers Märgels hier beylege, und das noch hinzufüge, daß aller Thon und Letten nicht in so großer Menge als Märgel, etwa 30 Wagen voll weniger, auf leichtes Feld aufgeführt, die nehmlichen Wirkungen äußert, als der Märgel selbst *). Wallerius l. c.

l. IX.

*) Die Anwendung des Thons oder Lettens statt Märgels ist gefährlich, und erheischet gründliche Kenntnisse seines Erdreichs, welche wohl sehr wenige Landleute besitzen werden. Nur auf Feldern, welche über 40 Procent in Scheidewasser, und unter 15 Procent in Vitriolsäure auflösbarer Erdarten führen, kann man ihn mit Nutzen verwenden, auf den übrigen aber muß er zur Vermeidung übler Folgen gänzlich gemisset, und dagegen Märgel, der sich ohnehin leichter mit dem Erdreich vermischet, und den man überall finden wird, erwählet werden Auf den Kupferzeller Feldern würde Thon und Letten den größten Nachtheil zuwege bringen, wenn man sie statt Märgels ganz damit überfahren wollte.

C. IX. Ist dieser nicht überall zu erhalten, so wird doch jener keinem Felde so weit abgelegen seyn können.

Auf das 2te 3te und 4te. Es ist wahr im ersten Jahre ist, wenn Roggen eingesäet wird, aus Mangel nöthiger Mischung die Wirkung des Märgels nicht so sichtbar, aber schon im zweyten Jahr, wenn der Acker mit Hafer besäet wird, zeichnet sich derselbe auf die sich beregte Weise, bey einer Handbreit wo er gefallen ist, aus; so dauert die Fruchtbarkeit bis auf 12. 18. 30. auch noch mehrere Jahre fort, bis sie endlich freylich nun nach und nach wieder abnimmt und verkommet. Von dem 5ten bis in das 30te Jahr auf ebenen Feldern dauert die Kraft der Bemärgelung an. Von der zweyten Märgelung habe ich im ersten Theil mehr gesagt, und das beruhet, wie ich hier auf Treu und Ehre versichere, auf einer allgemeinen Erfahrung bey uns. Se. Hochgräfliche Excellenz halten aus sehr wichtigen Gründen dafür, daß es recht gut seyn sollte, wenn man den Märgel in geringerem Maaße nach und nach von 3 Jahr zu 3 Jahren, zu Staub gestoßen, oben auf

den Saamen aufstreute, und ihm mit etwas Dung zu Hülfe kommen würde, dadurch würde man die großen Kosten verringern, die Arbeit nach und nach bequemer thun können, es würde einerley Wirkung erfolgen, und die Wirkung würde immerzu anhalten, da durch das beständige Aufstreuen die würkende Ursache sich niemahls verlöhre, solches, glauben Höchstdieselbe, würde näher und noch gewisser erhalten, wenn man den Märgel mit dem Gyps zu versetzen beliebte *). Befehlen nun Se. Hochgräfliche Excellenz, Ihnen auf Höchst Dero einsichtsvollen Vorschlag meine Gedanken zu sagen: so muß ich vor allem bekennen, daß mir der Vorschlag ganz neu ist, und ich zweifle, ob jemahls ein Landwirth ihn gedacht oder probirt hat. Wenn ich die Sache sorgfältig über-

*) Dieser Vorschlag ist bey Feldern, die nicht über 30 Procent auflösbare Theile besitzen, sehr zweckmäsig und gut; denn Gyps sowohl als Kalk- und Bittererde bedürfen die mehresten Gewächse des Ackerbaues. Ich dünge auf diese Weise schon 3 Jahre lang meine zwar wenigen Grundstücke mit allergrößten Vortheil, und sehe Gerste, Dinkel und Roggen, (Spelz und Korn,) Kartoffeln ꝛc. alljährlich im schönsten fettesten Wuchse da stehen.

überlege, so können ihm gute ja die besten Erfolge nicht fehlen. Ich will die Gründe meines gänzlichen Beyfalls von dieser Seite hier anfügen. Es ist ohnstreitig, daß die instrumentale Fruchtbarkeit der Aecker von der regelmäsigen Schwere allerdings abhängt. Zu leichtes und zu schweres Feld ist allemahl unnütze *). Wer also einem zu leichten Felde seine gehörige Schwere verschaft, macht es instrumentaliter fruchtbar, so geschiehet es durch die im rechten Maaße geschehene Aufführung des Märgels. Von dem Gyps ist das, was Se.

*) Nur für einen Theil der Gewächse, vorzüglich für Gemüß- und Getreidearten ist zu leichtes und zu schweres Feld unfruchtbar, hingegen für den andern, der nicht minder stark an Menge und Verschiedenheit, ist es fruchtbar. Einige Pflanzen verlangen nehmlich, wie ich schon öfters bemerkte, schweres, wieder andre leichtes Feld; man kann also nicht im allgemeinen vermischtes Feld, (von bekannter Eigenschaft) gut preisen und fruchtbar nennen, und leichtes oder schweres Feld als unfruchtbares erklären; denn der Beweiß, daß im leichten so wie auch im schwerem Felde mehrere Arten von Pflanzen vorzüglich gut, ja besser als im gemischten gerathen, liegt ohnstreitig erwiesen am Tage.

Hochgräfl. Excellenz vom Märgel vorschlagen und behaupten, schon erprobet; der obrigkeitliche Beweiß soll nachfolgen, und er wird von großer Etendue seyn. Die reichsten Erndten werden auf dem nehmlichen Wege des Aufstreuens des Gypses erhalten, die leichtesten Felder werden nach und nach schwerer, verändern ihre Natur, und da sie vorhero weißlich gewesen waren und so aussahen, so schwärzen sie sich allmählig und taugen zur Aussaat des Dinkels oder der Spelzen und des Weizens, da sie vorhero nur mit Roggen konnten besäet werden. Wird aber der Märgel dieß auch thun *)? Es kommt alles auf die Schwere des Körpers an, den wir mit dem leichten Erdgrunde verbinden und auf denselben obenhin aufstreuen **). Ich habe den gemeis-

*) Da wo Gyps Fruchtbarkeit schaffet, da dienet auch Kalkmärgel, überhaupt jeder kalkartige Stein, nur im minderem Grade.

**) Ob dieser Satz, den der Mathematicker als Grundsatz erkennt, auch beym Feldbau statt finden werde, bezweifle ich, denn die Erfahrung lehret gerade das Gegentheil. Leichtere Körper nehmlich, z. B. Kalkerde, haben mehrere Attraction, mehrere Neigung Feuchtigkeit und Luft an sich zuziehen als schwerere z. B. Sand, zerstoßene Kie-

gemeinen Gyps und den festen Märgelstein zerstoßen; ich habe beyder Staub am Ofen vollkommen getrocknet; ich habe befunden, daß der Märgel nicht nur den Gyps gleichwog, sondern ihn auch an Gewicht noch bey weitem übertraf *). Aus diesem Versuche verspreche ich mit gutem Grunde gleiche, oder noch größere und die sicherste Wirkung. Ich bin also nicht von der Hoheit Sr. Hochgräflichen Excellenz geblendet, wenn ich Höchst Ihnen da beyfalle, mein Beyfall ist durch Gründe befestigt und aus Gründen erwachsen. So weit aus Begriffen gedacht und geschloßen, werden wir dennoch die Regel der vortreflichen ökonomischen Gesellschaft in Zelle hier benutzen, und durch sie zu der Gewißheit hinaufsteigen, die sehr nöthig und gut ist:

„man

sel, Feldspath, Quarzschiefer, Hornschiefer ꝛc. Und gesetzt sie hätten auch solche in einem größeren Grade, welchen Vortheil würden wohl die Gewächse, auf schwerem Felde wachsend, dadurch erlangen?

*) Das specifische Gewicht des Kalkmärgels, so aus 75 Procent Luftvoller Kalkerde und 15 Procent Thon bestund, ist 2, 800 und das des Kupferzeller Gypses, der keine Spur freyer Kalkerde besitzet, 2, 20.

„Man muß alles vorhero versuchen und prüfen,
„im kleinen probiren und aus den Erfolgen die
„Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Vorschlags
„bestimmen.“ Unser Wißen bleibt Stückwerk,
die Erfahrung allein stehet Bürge für unsre
Begriffe.

N. S.

So oft habe ich schon über die Hartnäckigkeit der Landleute, bey dem Alten und Gewohnten zu beharren, und alles Neue, auch das Vortheilhafteste, Gegründetste und augenscheinlich Nutzbarste abzuweisen, geklaget; ich habe selbst auch ihre ausgelaßene Widersetzlichkeit gegen die Gypsung auf Aeckern und Wiesen, die vor ihren Augen so ganz vortrefliche Wirkungen äußerte, beklaget; jedoch dieses machte mich nicht müde, immerhin mehrere Proben zu machen, und sie durch solche Männer, die ich dazu vermochte, vormachen und ihnen aufstellen zu lassen, bis ich endlich ihr Vorurtheil überwand und heuer diesen Frühling die Freude empfinde, daß sie alle in die Gypsbrüche einfallen, Wagen an Wagen gehen, und jeder Wagenvoll willigst für 30. und 40 Kr. bezahlt, und in einigen benach-

nachbarten Brüchen unter 2 Fl. nicht mehr erlaßen wird, deren viele hundert, jetzt schon da ich das schreibe, (den 31 Merz) abgeführet sind; die ohnfehlbaren besten Erfolge werden die Leute künftighin klug machen und über ihre Vortheile, zum größten Nutzen aller Landschaften, siegen; für die schnelle und weite Ausbreitung dieses herrlichen Dungmittels ist mir nicht bange, da bereits viele Wagenvoll 10. bis 12 Stunden weit abgeholet und verführt werden *)

Seine Düngkraft dauert auf den Wiesen 2. 3. Jahre sichtbar an, ohne daß man die Aufstreuung wiederholt. Das Ackerfeld wird von Jahr zu Jahr, wie man den Gyps aufstreuet, schwerer und besser **).

§ 4 Aus-

*) Noch bis heute dauert dieser Verschluß des Gypses in gleicher Stärke fort. Ein Beweis, wie mich dünket, von der Vortreflichkeit desselben.

**) So lange noch Gyps vorhanden ist, kann und wird das Feld beßer seyn als zuvor, im verneinenden Falle aber wohl nicht.

Auszüge aus Briefen.

Stadt Oldendorf,
den 2. Februar 1771.

„Eine Viertelstunde vor hiesiger Stadt wird eine Düngerde, seit undenklichen Zeiten zwischen den Steinen, mit der Hacke gerodet, welche so fein als geklopfter Gyps ist. Diese Düngerde nennen die hiesigen Einwohner Dux, welches ein altes plattdeutsches Wort ist, und dieser Erde vermuthlich darum beygeleget worden, weil dadurch denen Früchten eine mehrere Vollkommenheit verschaffet wird. Es ist dieser Dux ein schnell wirkender Dünger, der auf bestelltes und besaamtes Land nur alsdenn gestreuet werden muß, wenn ein Regen selbigen bald an die Wurzeln der Saat anspielen kann. Wird nun der Dux zu rechter Zeit gestreuet, so thut solcher sehr guten Effekt, die Früchte werden länger in Ansehung des Strohes, und vollständiger an Korn, mit einer nicht geringen Vermehrung. Besonders ist dieses an Hülsenfrüchten wahrzunehmen, die ungemein lang werden und stark ansetzen. Auch auf Wiesen, die trocken liegen und nicht gewäßert werden können,

können, bringt solcher ungemeinen Vortheil *). Eine gar nützliche Entdeckung hat man im verwichenen Herbste davon gemacht, da die Schnecken den Roggen ganz bedeckt hatten. Der Roggen, der mit Dux überstreuet worden, ist von dem Schneckenfraß frey geblieben, und der worauf die Schnecken schon geschadet, ist durch selbigen gleich davon befreyet worden. (Anmerkung: Eben diese Erfahrung, vorzüglich aber von gebrannten Gyps, noch besser Kalk, bestätiget unser Hr. Autor in mehreren Blättern, er bemerket dabey hauptsächlich, daß er wider die Erdflöhe und Regenwürmer ein vortreffliches Mittel sey.) Dieses ist es was mir von dem Duxe bekannt ist, und welches ich auf Sr. Hochwohlgeb. Gnaden Befehl Denenselben ohnverhalten sollen."

Aus der Churpfalz.

„Euer Hochehrwürden gebühret die Ehre und das Lob, daß Dieselben durch Mittheilung Ihrer Abhandlung vom Gyps, dem gemeinen

*) Der Dux ist, weil er den Gewächsen auch außer dem Gyps, Kalkerde, also zwey wesendliche Bestandtheile, zuführet, dem Gyps vorzuziehen.

Wesen großen Nutzen und Vortheil damit verschaft haben. Denn nur von dem Nutzen desselben auf den Feldern, in hiesiger Gegend, nehmlich in dem Churpfälzischen Oberamt Bretten, mit wenigen zu gedenken: so schlug solcher auf dem Ackerfelde dahier, nehmlich der Stadt Eppingen, so meistentheils aus gelben Leimen, weißen Thon oder Letten *), braunen und rothen Kies bestehet, so ausnehmend an, da in dem jetzigen Sommer nach empfangenen häufigen Regen und überflüßigen Anfeuchtungen, der Klee welcher frühzeitig in den Hafer gesäet, und nach Verfluß einiger Wochen darauf, als die Hafersaat aufgegangen und Fingerlang war, mit rohen Gyps überstreuet worden, den Hafer gänzlich überwachsen und die Eigenthümer genöthiget denselben mit dem Klee zusammen abzumähen, auf dem Acker abtrocknen, und wie es zum Aufbehalten dürre genug gewesen, endlich heimführen zu laßen, welches ein unvergleichlich kostbares Futter für das Rindvieh im Winter, und in solcher Quantität gegeben, daß

es

*) Auf Feldern dieser Art, die Mangel an Kalkerde haben, wird der Gyps jederzeit vortreflich wirken.

es das Futter von 1 Morgen der besten Wiesen weit über die Hälfte übertroffen hat. Die Einwohner daselbst haben auch ihre Rübensaat, so wie das weibliche Geschlecht ihre Kraut oder Kappespflanzen, mit dem rohen und ungebrannten Gyps zu überstreuen angefangen, und die solche Proben gemacht, haben den Nutzen augenscheinlich davon gespüret, indem die Rüben und Krautpflanzen, die auf gedachte Art mit Gyps überstreut gewesen, von den Erdflöhen gänzlich verschont geblieben, und insonderheit die Rübensaat an Kräutig und Rüben reichlich gerathen und gut gelohnet haben, da hingegen diejenigen, die solche Ueberstreuung mit Gyps unterlassen, ihre Rübsaat vergebens gethan haben, weil die schädlichen Erdflöhe dieselben gänzlich abgefreßen und so saubere Arbeit gemacht haben, daß auf manchem Acker kaum die Spuren von einer Rübe mehr anzutreffen und zu sehen gewesen. Der Ruf von der Nuzbarkeit des Gypses ist nun schon so weit erweitert, daß er bis auf Straßburg hinauf, über den Rhein, und in die Bergstraße hinunter, 15. bis 20 Stund weit abgeholt, und mit großen Kosten verführet wird."

Aus Bern und Braunschweig:

Der von Euer ꝛc. so landesnützliche, veredelte und zu einem kostbaren Düngunsmittel erhobene Gyps, thut auch in unsern Gegenden, sonderlich auf trockenen Grund Wunder, da er

nach der Anweisung gebraucht wird. Verschiedene meiner Freunde, eben wie ich, haben davon ganz erstaunliche, nun seit zwey Jahren im Großen gemachte, Proben. Unter vielen andern will ich Ihnen, mein Herr! nur diese melden. Ich hatte, im Jahr 1769, einen Acker mit Sommerweizen besäet, und Holländischen Klee darein gesprengt, zu Ende des May ward meine Weizensaat unter eins so gelb und kränklich, daß ich solche verlohren schätzte; allein beym ersten trüben Tage, der mir baldigen Riegen versprach, war ich mit dem Gypsmehl darüber her, 8 Tage hernach war mein Acker wieder mit dem allerlebhaftesten Grün bedeckt; die Erndte war vortreflich, und der darein gesprengte Klee bis zu den Aehren des Weizen aufgewachsen, da hingegen der Klee in dem daran stoßenden, zu gleicher Zeit besäeten Acker, bey der Erndte kümmerlich 6 Zoll hoch gewachsen war. Der zu Forst, eine Stunde von Holzminden wohnende Beamte, versichert mich, daß, da er sonst seine Grasgärten mit dem besten kurzen Miste hätte düngen laßen, er wenig Effekt davon verspüret, seit 3 Jahren aber habe er solche duren laßen, wovon das Gras halb Mannshoch gewachsen, und er solches jährlich drey- bis viermahl habe abmähen laßen. Braunschweig, den 26. Febr. 1771.

VII.

VII.

Gedanken

bey dem

Getreidemangel in Deutschland

von 1770 bis 1771

über

dessen Quellen und den Mitteln wider denselben auf künftige Zeiten.

VII.

Was wundern wir uns über die Theurung? Warum heißen wir hier Gott in seinen Wegen, in denen er uns den Segen auf unsern Feldern entzog, verborgen? Der Reiche bis auf den Bettler, der Freye bis auf den Knecht, diese alle, wie wenig achteten sie vormahls das Brod? Jetzt ist diese Speise entzogen, wir hungern! Die Sprache des Fürsten, des Edlen, der Unterthanen, des Knechts: woher nehmen wir Brod? Wir sehen nun die Wahrheit: Gott ists allein, der das Gedeihen giebt, unser Pflanzen und Begießen ist nichts. Wir hören die Regel der Klugheit: Sammelt die übrigen Brocken! Arbeit und Gebet, sind diese die Hand, durch welche wir den göttlichen Segen empfangen, so sey es, daß der Faullenzer darbe. Aber sind wir denn alle, die jetzt darben, Faullenzer und Gottlose? Darben nicht Gottlose und Fromme zugleich? Sind nicht die Witterungen in Deutschland schon etliche Jahre her sich gleich? Es ist wahr, der Regen traf vielleicht das ganze Deutschland überall; aber nicht in ganz Deutschland ist Mangel, der Mangel ist

nur

nur in einigen Ländern, und hier nur in dieser und jener Gegend. Der Mangel wird nur dadurch gemein, daß dieß mangelnde Land dem, das Ueberfluß hat, den Vorrath entnimmt. Ich sagte nicht zu viel, wenn ich sagte, daß die Noth in Deutschland für sich durchaus nicht gemein sey; das Amt Kupferzell hatte zu Ende des Februars 1771, da man auf herrschaftlichen Befehl alles Getreide aufnahm, noch über 2000 Malter Ueberschuß im Rest. Die Reichsstadt Rotenburg hatte Getreide in übermäßiger Menge, und so noch sehr viele kleinere Herrschaften und adeliche Häuser mehr. Wenn der Regen die Noth allein hätte verursachet, so müßten auch diese Länder mit andern gleiche Noth fühlen. Thue ich unrecht, wenn ich andere Ursachen aufsuche? Ich denke, Nein. Man kann zum Grunde einer gesegneten Erndte ein Land von vorzüglicher Güte von Natur, welche der widrigen Witterung widerstund, auswählen, und man irret nicht ganz; allein, wenn ein gutes Land den Grund einer gesegneten Erndte allein enthielt, so müßten alle Gegenden dieser Art gleichen Vorrath an Getreide besitzen; und im umgewandten Falle, die

von schlechten Erdgründen gänzlich versagt haben: so finde ich es aber nicht. Es ist kein Erdgrund von Natur so schlecht, leicht und arm, als der im ganzen Amte Kupferzell, und die Reichsstadt Rotenburg hat viele Gegenden, wo der Feldboden für sich eben so kraftlos von Natur da liegt, gleichwohl war ihre Erndte, gegen die der fruchtbarsten Gegenden gerechnet, vortreflich. In dem Amte Kupferzell hat es in den letzten drey Jahren, wie es die Zehendregister erweisen, an Dinkel gar nichts, an Roggen aber höchstens 1/4 gegen die andern Jahre gerechnet, gefehlet *). Ich gehe nun auf

*) Die in der Kupferzeller Ebene umherliegende Feldungen sind größtentheils arm an Thon (Binderde) und bestehen, wie ich dieses bereits angezeigt habe, hauptsächlich aus Kieselerde. Da sie nun diesem zufolge weder die Eigenschaft, das Wasser lange bey sich zu behalten, oder aber in Menge einzusaugen, besitzen, das Gegentheil also von stark thonichtem Erdreich sind; so scheint es mir, daß man die Ursache hierinnen zu suchen allerdings das Recht habe. Allzugroße Zäh- und Lockerheit (denn auch diese schadet bey anhaltenden Regen) muß also bey den Feldern für allem

auf das, was ich sagte, wieder zurück. Arbeit und Gebet ist der Grund aller Wohlfeilheit, und jener Vernachläßigung die Quelle alles Mangels. Ich verstehe aber nur solche Arbeiten auf den Feldern, die mit Ueberlegung geschehen, die mit dem Nöthigen unterstützt werden, die keine Hindernisse zurückhalten, deren Früchte nicht zurückgetrieben, noch zertreten, sondern auf den Nothfall aufbehalten werden. Ich will das, was ich sagte, erläutern. Ein Land, so von Natur schlecht ist, bedarf zwar mehrere Arbeit, als das, so von Natur gut ist. Doch wird auch dieses vernachläßiget, so wird es weniger abwerfen, als jenes, wenn die Einsicht mit dem Fleiß arbeitet. Das ist eine der Ursachen, daß die Felder im abgewichenen Jahre eine bessere Erndte versagten, weil der Feldbo-den nicht hinlänglich gebauet, nicht zur Aussaat und zur Erhaltung des Saamens gegen die widrige Witterung geschickt gemacht wurde. Er hatte nicht seine rechte Schwere oder die

Leich-

andern gehoben und eine mittelmäßige Schwere und Lockerheit, welche Kalk- und thonichte Körper bewirken, dem Erdreich gegeben werden.

leichtigkeit, die er bedurfte; daher kam es, daß Gegenden von zu schweren und zu leichtem Feldboden, eine wie die andere, versagten. In ersterem hält sich, wo der Regen zu viel sind, das Wasser zu lange, der Saame modert und verfault; in letzterem aber spühlt sich die Erde von den Wurzeln ab, sie liegen blos, sterben ab, und der Saame verkommt. Schnee und Frost, Aufthauung und lang anhaltende Kälte der Nächte bey warmen Tagen, und abwechselnder Näsſe durch Regen und Schnee sind solchen Feldern wieder gefährlich; der Frost frieret leicht auf, die Wurzel wird loß, die Erde wird Staub, der Wind bläset diesen, der Regen wischt jene hinweg, der Saame entgeht. Diese alle Jahre gewöhnliche Erscheinungen waren niemahls so helle als in den letztabgewichenen Jahren. Nichts hat also die Länder, deren Felder entweder von Natur schon eine rechte Schwere hatten, oder die durch Kunst ihr richtiges Maas der Schwere erhalten hatten, mit einer bessern Erndte beglücket, als die Arbeit, die die Natur oder Kunst an ihnen gethan hatte. Der Mangel also des Geschäfts der Erdmischungen ist Quelle des Mangels am

Getreide. Es ist nun Zeit, daß ich wider die Hindernisse eines gesegneten Feldbaues meine Vorschläge beysetze. Es ist I. ohne Zweifel, daß die Witterung über den Ausschlag des Feldbaues sehr vieles vermöge, und eben daher ist es unstreitig, daß Mangel und Ueberfluß an Brod von Gott und seiner Bestimmung allerdings abhänget. Auf nichts sollte man also mehr sinnen und arbeiten, als daß Gottesfurcht, Tugend, Hoffnung und Liebe sich unter die Bewohner der Länder vertheilte. Das II. Mittel, sich des Mangels zu erwehren und Reichthümer vom Feldbau zu sammeln, ist nichts anders, als eine nach der Vorschrift der Vernunft auf den Feldern verrichtete Arbeit. III. Der Muth, den Feldbau zu verbessern, ist eine Grundlage von der Ergiebigkeit der Felder; auch dieser Muth wird dem Landmann dadurch verliehen, daß man ihn mehr ehret, ihn seiner Knechtschaft entbindet, und ihm sein Eigenthum giebt. IV. Man muß ihn von den Frohndiensten jeder Art, gegen gewisse mäßige Abgaben, gänzlich entbinden. Dieß können die Herrschaften ohne ihren Schaden, ja zum offenbarsten Vortheil für sich selbsten. V. Die Jagden und die Wälder müssen, wenn dem Feldbau soll aufgehol-

geholfen werden, wo nicht vertilgt, doch unumgänglich nothwendig verringert werden. Man kann die jährliche Nothdurft eines Landes an Holzungen sehr leicht berechnen, diese auf die Waldungen auftragen, und die Morgen, die ein Land bedarf, bestimmen, was nützt hier der Unrath der Wälder? VI. Es müssen die grossen Bauerhöfe verringert werden, und die neuen Ansitzer müssen einzelne Höfe und Weiler, fern von den großen Dörfern, erbauen und anpflanzen; denn es ist ein ungemeiner Vortheil für den Bauern, seine Güter nahe und nicht ferne zu haben. Man glaubt in manchen Ländern, der Fürst sey nicht groß, der nicht halb allmächtige Bauern beherrsche; man glaubt, daß ein Land dadurch besser bestehe und weit reicher sey, als das, welches kleinere Höfe und mehrere Unterthanen fasse. Verzehren denn, sagt man, mehrere nicht mehr, als wenigere? — Der Einwurf ist aber so seicht, daß, ihn zu widerlegen, ich nur eine einzige Frage werde aufwerfen: Werden denn mehrere nicht mehr Land und mit größerer Genauigkeit bearbeiten, als wenigere? Und wird denn im ersten Falle das Feld nicht mehr abwerfen, als im zweyten? VII. Man muß die öden Plätze, die Huthungen und Gemein-

heiten und die alten oder neuen Einwohner vertheilen. Wie viele der schönsten und größesten Strecken Feldes finden sich nicht in den Gemeinheiten und Huthweiden allenthalben leer, die nicht den 5oten Theil des Nutzens, den man erwarten könnte, gewähren? In manchen Ländern erweckt er Schauer und entsetzen! VII. Das Land muß vorzüglich mit Getreide angebauet werden, und alles übrige, bis man jenes genug hat, zurückbleiben. Der Krapp, Toback, Wein und Holzbau, der Wiesen und Grasbau, sind alle wohl gut, allein schädlich wo sie den nöthigern Kornbau zurückhalten oder vertilgen. IX. Die Schäfereyen müssen zum Schaden des Fruchtbaues nicht gehalten werden, da der Vortheil aus ihnen, dem aus den Fruchtbau, weit nachstehet. Um der Schäfereyen willen muß man also keine Brache, keine öde Plätze begünstigen, und nur bergichte Gegenden oder unbewohnte Länder müssen ihnen überlassen werden. Die Natur selbst lehrt uns so denken. X. Man muß die Zahl der Pferde einschrenken, den Hund abschaffen, und ihn nur dem zu halten erlauben, der ihn bedarf. Der Engländer berechnet den Kornmangel aus der Menge

der Pferde, und der Franzos den seinen aus der Menge der Hunde. XI. Das Land muß von Bettlern auf den Strassen, an den Zäunen, gereiniget werden. Der Bettler ist ein Verlust und Schaden dem Landmann und dem ganzen Staate; er verzehret nur, und ist das was die Raubbiene den andern Bienen immerhin seyn kann. Unter hundert Bettlern ist kaum einer Allmosen werth, durch Faulheit, liederliches Durchbringen ꝛc. in jüngern Jahren sind sie im Alter Bettler, kuplen sich zusammen, mehren sich und verzehren des Landmanns Schweis in Wollust. Ich will wenig sagen: 4 Laib Brod, jeden zu 11 Pfund, kosten den Bauern jetzt alle Wochen die Bettler; dieß macht des Jahrs 208 Laibe, oder 15 Malter Roggen, das Malter nur zu 15 Fl. gerechnet ist 195 Fl. und in andern Jahren, in denen der Mangel nicht so groß ist, ohne allen Streit 50 Fl. Arbeitshäuser, Zuchthäuser sind zur Befreyung von dieser umherschleichenden Pest die Gottgefälligsten Mittel. XII. Es müssen die Branntweinbrennereyen, die das Getreide zu diesem schädlichen Getränke verderben, gänzlich eingehen und abgeschaft werden. Wie

viel der Branntwein der Bevölkerung schade, davon ist England Zeuge. Ohne Branntwein kann jedermann leben, und das Vieh wird wohlfeiler mit andern Sorten gemästet. Und gesetzt auch, die Gewohnheit wäre gar nicht zu vertilgen, was folgt? Wir haben andere Materien die zu Branntwein zureichen, die theils unnütze umkommen, theils ohnschadhaft für andere Gewächse, in unzählbarer Menge, sehr leicht können erzogen und gebauet werden. Diese Materien sind: Treber, Weinhäfen, Obst, Vogelkirschen, Wachholderbeeren, Waldkirschen und Zwetschen *). Kann ein Baum leichter erzogen werden als der Zwetschen- und Kirschbaum? und ist eine Frucht, die mehr und lieblichern Branntwein giebt als diese? In dem Montfortischen werden alle Jahre für viele tausend Gulden Kirschwaßer und Branntwein verkauft. Könnte man nicht allenthalben in Deutschland diesen Gewinn machen und das Getreide erspahren? XIII. Der Miß-

*) Ich füge hinzu: Hagenbutten (Fructus rosae canin. L.), Schlehen (Prunus spinosa L.), Kartoffeln. Aus diesen Gewächsen werden in hiesiger Gegend alljährlich mehrere Hundert Maaße des lieblichsten Branntweins verfertiget.

Mißbrauch und die fast ganz undenkbare Verwendung des besten Getreides zur Stärke und zum Haarpuder verdienen, wo nicht ihre ganze Aufhebung, doch die allerstärkste Verminderung. Die Stärke, hat sie mehrere und etwa noch beßere Endzwecke, so sind sie doch beyde für den entbehrlichen Luxus. Ein Surrogatum dafür sind die Kartoffeln, oder die Erdbirn, man macht davon die feinste Stärke, den besten Puder. Vielleicht beyde nicht so gut, aber werden sie denn dadurch sich nicht mehr, als der Haarpuder und die Stärke aus dem Getreide, empfehlen, wenn wir durch sie viele tausend Malter Getreide erspahren, und dadurch jeder sein Brodt hat? So wie ich die Hemmung des Laufs des Blutes, durch Bande in einem Theile dem ganzen Körper als schädlich erkenne: so unnatürlich und schädlich ist auch dem ganzen Staate die Fruchtsperre. Es folgt daher also: XIV. Die Fruchtsperre der Glieder des Deutschen Reichs unter sich ist verwerflich, aber die Fruchtsperre, bey einem nur anscheinenden Mangel, gegen alle andre Staaten, ist Pflicht eines Reichs. Der schwäbische Kreis erkannte diese Wahrheiten, aber nur da erst, als alle Glieder den durchgehenden Mangel em-

pfanden, und sie die erstaunende Ausfuhr der Schweizer, ihres eigenen vermeinten Gewinstes wegen, zu lange begünstiget hatten, nun machte man die Thüre zu, aber damit die, gegen das noch etwas gefüllte Franken nicht auf! die nöthige Aufsicht fehlte. Sehr gut ist es also, daß XV. ein Collegium von redlichen und einsichtsvollen Männern angestellt werde, welches die Möglichkeit der Ausfuhr, oder die Nothwendigkeit der Sperre, alle Jahre berechne. XVI. Man muß künftig in dem heil. röm. Reich einen Vorrath an Getreide nach und nach aufschütten, durch welchen wenigstens alle Einwohner, wenn auch ein oder zwey Jahre gänzlich versagen, Kriege entstehen, Wetterschläge alles verderben ꝛc. vollkommen Brodt haben. Ein gemeinschaftlicher Abschluß auf dem Reichstage, allgemeine Kornmagazine für und in Deutschland zu errichten, wäre der weiseste Schluß unter vielen, und seine Ausführung wäre nicht nur möglich sondern auch leicht. Ich habe diese Schrift nicht in der stolzen Absicht, damit etwas ganz Vollkommenes zu sagen, entworfen, mein Wunsch war allein nur dieser: meine Gedanken zu sagen, um andere zu erwecken, mit mehrerer Einsicht und Nachdruck das zu lehren, was das Publikum angehet, und es auf künftige Zeiten für Mangel, Theurung und Hungersnoth zu sichern. Heil sey dem Patrioten, der darauf denket, und seine Gedanken zum Besten seiner Mitmenschen ausführet!

VIII.

VIII.

Ist es vortheilhafter, das Hornvieh im Stalle zu füttern oder weiden zu lassen, sowohl in Absicht auf die Vieh-nutzung, als auf den Dung?

Eine Preisfrage der K. K. Gesellschaft des Acker-baues in Kärnthen auf das Jahr 1768.

Te quoque magna Pales, et te memorande canemus
Pastor ab Amphryso — — — —

VIRG. GEORG. L. III.

Will man die Ordnung beobachten, und den vortreflichen Einsichten einer erleuchteten Gesellschaft Genüge thun, so hat man vier Dinge: die Viehnutzung, den Dung, die Weide und die Fütterung im Stalle, zu erwägen, von ihnen richtige Begriffe zu geben, und endlich zu erweisen, daß sich entweder die Weide oder die Stallfütterung, in Absicht auf die Viehnützung und den Dung, für das Hornvieh schicke, und sich diese oder jene mit diesen Absichten vorzüglich nützlich verbinden lasse. Die Viehnützung ist nichts anders, als der Vortheil, den man von dem Vieh zu erwarten im Stande ist. Diese Vortheile aber sind von verschiedenen Arten, so wie das Hornvieh selbsten verschieden ist; von dem Ochsen fordern wir die Arbeit auf den Feldern und die benöthigten Fuhren; von der Kuh die Fortpflanzung ihres Geschlechts, die Milch ꝛc.; von dem jungen Vieh einen guten Wuchs und von allen eine proportionirte Fettigkeit zu ihrer benöthigten Stärke zur Arbeit, Zeugung, Wachsthum und zum Verkauf;

kauf; welches man aber, ohne ihre Gesundheit, niemahlen erhalten wird. Den Dung, als die Seele des Feldbaues, in allen ihren Theilen, sehen wir an, als einen Vortheil, der alle andre übertrift, weil von ihnen beynahe alles abhängt. Der Dung ist zwar bey der ganzen Zerstörung des Körpers zu erwarten, jedoch versteht man gewöhnlicher Weise unter dem Viehdung nichts anders, als den Auswurf des natürlichen Abgangs, den Harn und den Koth. Man muß, ehe man sichs begreiflich machen kann, wie Harn und Koth von dem Menschen düngen, wissen, was überhaupt düngen heißt. Düngen heißt nichts mehr, als den Pflanzen die Theile zuführen, die sie zu ihrem Wachsthum bedürfen. Der Gehalt des Dungs muß also der seyn, welcher der Gehalt der Pflanzen selbst ist; um dieß zu erforschen, darf man nur ausmachen, aus welchen Theilen alle Pflanzen bestehen. Eine jede Pflanze wird in der Vermoderung Erde, jede verbrannt, ausgelaugt und eingesotten, ein scharfes Salz; alle Saamenkörner geben ein Oehl, und jedes Blatt und jeder Stengel einen wässerichten Saft. Sollte man anstehen zu behaupten, daß alle Gewächse in dem Pflanzenreich, wie überhaupt

alle

alle andere Körper, aus Wasser, Salz, Erde und Oehl bestehen? Der Gehalt aller Pflanzen sind diese vier Stücke *); und diese vier Stücke sind auch die Theile des Dungs. Man macht mir die Einwendung, daß kein Oehl und kein Salz dünge. Wohl! die Probe davon machte ich selbsten: Ein Oehl, es sey von welcher Pflanze es wolle, Salz aus den Kothen, an die Pflanzen gelegt, verderbet jedes Gewächs, ätzet die Haarröhrchen auf, und alles verkommt. Man muß sich also belehren, daß wir zweyerley Salze, das saure und das alkalische haben, worauf in der Gährung, Moderung oder Auflösung jedes Körpers, das Mittelsalz als das dritte, so eine Zusammensetzung beyder erstern Körper des Oehls, des Salzes, des Wassers und der feinen Erde ist, entstehet, welche Komposition eigentlich die Nahrung oder den Dung der

*) Wie verschieden die salzichten, die erdichten und die öhlichten Theile der Gewächse sind, habe ich in der Abhandlung über den Gyps angezeigt. Das Wissen allein: Oehl, Salz, Erde und Wasser sind die Bestandtheile aller Gewächse, hilft uns nichts, wenn wir diese Theile nicht genauer kennen, und nicht wissen, welch' und wie vielerley sie sind?

der Pflanzen ausmacht *). Es kann also keine Nahrung für die Pflanzen anders als durch die Gährung, Auflösung oder Vermoderung derselben entstehen oder gedacht werden. Diese Gährung aber ist nichts anders als dieß, wenn Säure und alkalische Salze sich mischen. Man nehme Scheidewaßer, als einen sauren Geist, und gieße es in oleum tartari, so wird eine solche Gährung augenblicklich entstehen **). Man

*) Man muß, um in keinen Irrthum zu verfallen, diese Erklärung also verstehen: die Säure verbindet sich während der sauren Gährung mit der feinen Erde und etwas öhlichten Theilen, und macht damit ein erdichtes Mittelsalz; oder aber mit einem alkalischen Salze, und macht damit ein gewöhnliches Mittelsalz. In beeden Fällen wird die Säure abgestumpft und für die Fasern der Gewächse unschädlich gemacht.

**) Wenn Säuren und Laugensalze, worunter ich auch das Oleum Tartari (Weinsteinöhl), als ein von der Feuchtigkeit der Luft aufgelößtes vegetabilisches Laugensalz verstehe, oder aber alkalische Erdarten zusammenkommen, so entstehet, sind sie anders nicht luftleer gemacht, ein Aufbrausen. Die in den alkalischen Salzen oder Erdarten befindliche Luft nämlich wird durch den Beytritt der Säure

Man wird sich's leicht einbilden, da die Speisen und das Getränke aus Salz, Oehl, Erde und Waßer bestehen, daß auch ihre Excremente dergleichen enthalten *). Allein da ich erwiesen habe,

Säure ausgetrieben, und, da dieser mit einer Heftigkeit geschiehet, so entsteht ein Brausen, welches insgemein mit der Gährung verwechselt, von derselben aber unendlich verschieden ist; denn unter dieser verstehet man eine jede von selbst erfolgende Auflösung und Zerlegung der Körper in ihren nahen und entfernten Bestandtheilen, unter jener aber eine Verbindung derselben.

*) Dieser Schluß scheinet mir eines Theils richtig andern Theils aber auch unrichtig zu seyn. Richtig, wenn wir keinen Unterschied unter den Erdarten machen wollen, und alle für eine ansehen; unrichtig aber, wenn wir solche chymisch betrachten, sie also unterscheiden. Es können nämlich, da es bekannt ist, daß von unsern Nahrungsmitteln nur dasjenige, was nicht zur Formirung des Bluts, der Galle, des Fleisches, des Fettes, der Gebeine ꝛc., tauglich ist, als Urin oder Excremente ausgeschieden werden, die genossenen Speisen, (was die erdichten Theile anbetrift) aus 3/4 Kalkerde und 1/4 Theilen Alaun-Kiesel-Bittererde ꝛc. zusammengesetzt gewesen seyn, und den-

habe, daß kein Körper den andern, und das Oehl und Salz in denselben, nicht dünge, bis vorher die Gährung geschehen: so ist auch sehr leicht zu begreiffen, daß die Excremente eher keine Dungkraft besitzen, bis vorher das Mittelsalz in und aus ihnen gezeuget worden ist. Dieser Dung hat aber in der Güte seine Grade, denn es läßt sich gar leicht begreifen, daß das fette Vieh, so mehr öhlichte und salzichte Theile in sich verwahret, auch mehr und bessere Excremente als mageres Vieh, gebe. So wie das Mittelsalz in den Excrementen nach den Graden kann zunehmen, so kann es auch in den Graden seiner Güte und Vielheit wieder abnehmen; das Mittelsalz ist durch seine Gährung aufgelößt und sehr flüchtig, geschiehet es, daß mehreres erwärmet wird, so geht es nach

und

noch die davon ausgeschiedenen Excremente, aus 3/4 Theilen Thon- Kiesel- Bittererde ꝛc. und 1/4 Kalkerde bestehen. Denn da, wie ich in der ersten Abhandlung gezeiget habe, der größte Theil, der in den thierischen Substanzen befindlichen Erde, Kalkerde ist; so müssen allerdings bey gehöriger Verdauung der Excremente, die Bestandtheile anderer Art seyn, als die der Nahrungsmittel.

und nach in die kältern Körper oder in die Luft über. Setzt also den Fall, daß die Excremente nicht gähren ehe sie verkommen; daß sie der Regen aus und wegwäscht, oder daß sie die Sonne, nach erhaltener Gährung, anhaltend bescheinet, und es erfolgt die Kälte der Nacht, so steigen die Salze sammt den öhlichten Theilchen, in Nebel und Thau, unsichtbar auf, entfliehen, und die Excremente bleiben mit ihren dunglosen Crudidäten allein zurück. Die Weide ist diejenige Strecke Feldes, auf welcher das Vieh selbst graset und weidet. Entweder wird das Vieh nur den Sommer hindurch oder Sommers und Winters Tag und Nacht, oder aber nur den Tag hindurch, dahin getrieben, und des Nachts zu Hause gefüttert. Es mag nun die Weide auf Ebenen, an Bergen, in sumpfichten Thälern von der einen oder der andern Art seyn, so ist doch das Vieh der verschiedenen Witterung allezeit ausgesetzt. Eine Viehweide, sie mag liegen wie sie immer will, ist in dem Futter niemahlen so ergiebig, wie eine gehegte Wiese. Die Natur hat jedes Gras mit seinem Saamen versehen, wodurch es sich fortpflanzet, wie kann das geschehen, wo der Saame niemahlen reift, ausfällt und sich ver-

säet? Eine Ursache, warum alle Weiden mit den schlechtesten Grassorten sehr dünne bewachsen sind. Sollte alles Gras auch gut und hoch seyn, so wird es mehr vertreten, als gefressen; die überall auffallende Excremente machen dem Vieh das Gras eckelhaft, und durch das stete Hin- und Herlaufen wird der Boden fest. Der Dung, welcher darauf von dem Vieh verschleppt wird, schlägt zur Besserung nicht nur nicht an, sondern er brennt und frißt vielmehr das Gras samt den Wurzeln gar weg. Der Autor des kurzen Unterrichts des gesammten Feldbaues rechnet aus der Erfahrung, daß eine Wiese viermahl mehr, als eine Huthweide, ein Kleeacker aber sechsmahl mehr als eine Wiese abwerfe. Ein Kleefeld wirft folglich 24mahl mehr ab, als eine Huthweide. Wollte man die Koppelweiden erwählen, so daß man nehmlich eine Weide in etliche Stücke absonderte, heute Nro. 1. morgen Nro. 2. und so weiter betriebe, so würde man dadurch freylich vielem Schaden entgehen, jedoch wären dadurch nicht die so mannichfaltigen Fehler der Weiden gehoben; man würde nur, wo es viel wäre, die Grade der Schädlichkeit verringern. Die Stallfütterung ist diejenige, welche im Stalle

geschieht, und zwar so, daß das Vieh Jahr aus und ein mit dem Futter, so man von dem Felde heimbringt, versorgt wird. Hier bleibt das Vieh in Ruhe, erhält gute und gesunde Grassorten zur Speise; wird unter dem Striegel und der Bürste gehalten; ist für den heißen Strahlen der Sonne, für Frost, Regen, Nebel, für ungesunden Dünsten, Sümpfen und Wasser geschützt und verwahrt. Bey der Stallfütterung wird durchaus nicht so viele Feldung erfordert, dem Vieh die Nahrung zu verschaffen, und man kann also von eben dem Felde mehr Vieh, als vormahls durch das Weiden versorgen. Bey der Stallfütterung kann von dem Dunge gar nichts entgehen; alle Excremente werden gesammelt, und da sie mit Einstreuungen gemischt auf Haufen geworfen werden, so kommt es zur Gährung und Moderung; das Mittelsalz wächst *), und mit ihm Hoff-

*) Durch Fäulniß werden die vegetabilischen Mittelsalze zerlegt, keineswegs erzeugt. Sie sind, der Erfahrung zufolge, so wie die öhlichten Theile aus Brennbarem, Feuermaterie und Wasser zusammengesetzt, und in diese werden sie durch die Fäul-

nung und Aussicht zu einer reichlichern Erndte. Wollte man die neue Art einer landwirthschaftlichen Sparsamkeit nachahmen, so würde von allem Dünger bey der Stallfütterung gar nichts verkommen. Man errichtet seine Miststätten gegen Norden, damit das Dungsalz weniger evaporiret, dahin wird die gesammelte Mistung auf Haufen geworfen. Jeder Stall hat einen Auslauf, durch welchen der Harn des Viehes auf die Mistung geführt wird. Weil aber dennoch solcher nach und nach verfließt, so haben Einige angefangen, gleich bey dem Auslauf zur Sammlung des Harns eine Kufe einzugraben. Ist nun die Kufe vom Harn gefüllt, so fassen sie ein Faß, das auf einem Karren steht damit voll und führen es auf die Aecker oder Wiesen, bringen einen Seiher an, öffnen dasselbe und fahren so auf und ab, bis das Faß ausgeleert ist. Solches aber thun sie nur auf Wiesen, wenn Regenwetter vorhanden ist; auf Aecker aber zu jeder Zeit, im Sommer und Winter, mit dem besten Erfolg.

Nun-

Fäulniß auch wieder zerlegt. Die faule Gährung begünstiget also die Theorie der Oekonomen keineswegs, sondern widerspricht ihr gänzlich.

Nunmehr bin ich endlich da, wo ich im Stande bin, den Ausspruch zu thun, und gegründet zu sagen: Es ist weit vortheilhafter, das Hornvieh in dem Stalle zu füttern, als es weiden zu lassen, sowohl in Absicht auf die Viehnutzung, als auf den Dung. Da es mir nun sehr leicht ist, meine Bejahungs- und Verneinungsgründe zu geben, so will ich, damit sie heller in das Auge fallen, dieselbe bey einem jeden besondern Stück der Preisfrage untereinander hinsetzen. Ich will am ersten von den Vortheilen der Viehnutzung überhaupt, die man von aller und jeder Gattung Hornviehes durch die Stallfütterung vor dem Weidgange erhält, schreiben, alsdenn die Vortheile von jeder Gattung insbesondere benennen, und endlich das sagen, was man in Ansehung des Dungs zu erwarten haben mag. Bey der Viehzucht und deren Nutzung hat man vor allen Dingen dahin zu sehen, daß das Vieh gesund erhalten, und vor Krankheiten und Seuchen bewahret werde; denn hievon hängt aller Gewinn ab. Man mag hier die Stallfütterung mit der Weide in Absicht auf die Beschaffenheit des Körpers jedes

Viehes vergleichen, wie man will, so spricht alles und jedes für die Stallfütterung, und gegen die Weide; die Weide mag seyn, von welcher Art sie will. Wind, Frost, Nebel, Hitze, Mangel an gutem Wasser, ungesundes Gras, eckelhafte mit Koth und Harn verschleppte Plätze, sind lauter solche Dinge, welche der Gesundheit des Viehs nachtheilig und schädlich seyn müssen. Bey der Stallfütterung fallen aber alle diese Gefahren ganz weg. Was ich da behaupte, das hat die Erfahrung von jeher bewiesen. In unsern Gegenden, wo die Weiden seit 60. 70 Jahren ganz eingegangen sind, hat man nicht mehr als einmahl in wenigen Orten eine Seuche gehabt, nehmlich in dem Anfang der 40ger Jahren; und auch diese wäre gewiß nicht gewesen, wenn nicht das Ungarische Vieh das unsrige angesteckt hätte. Dagegen übersehe man die Länder, wo die Weiden annoch beliebt werden; in allen diesen findet man innerliche und äußerliche Mängel für beständig. Ist man von dem Unterschied der Erfolge im Stande, andere Ursachen zu zeigen, als die, welche man aus dem Unterschied der Beobachtung der Fütterung nimmt und angiebt? Die

Fettigkeit, aus welcher die Stärke zur Arbeit, die Zeugung und deren vollkommene Vollendung erfolgt, ist allerdings nur die Frucht der Stallfütterung, keineswegs aber des Weidegangs. Wenn man die Stallfütterung nach allen ihren Umständen erweget, so siehet man sogleich, daß die Fettigkeit des Viehes daher natürlich und ohnfehlbar eher, als von der Weide, entspringe. Bey der Stallfütterung hat das Vieh seine Nahrung ohne Ermüdung, und verdauet sie in Ruhe, man giebt ihnen schmackhafte, gute, fette Kräuter, es erhält seine tägliche Reinigung, ist gedeckt vor der Sonne, dem Regen, der Kälte; die Tränke wird gewählt, es läuft nicht weit nach derselben, und säuft nichts ungesundes ein; die ganze Constitution eines Körpers, der ausdünsten, nicht zu wenig und nicht zu viel ausdünsten soll, empfiehlt diese Pflege, und ohne sie ist gar keine Fettigkeit zu denken. Die Weide ist das, auf dem man durchaus das Gegentheil antrift. Wenn ich sage, daß alle unsere Ochsen, die unter dem Joche gehen, an den Metzger gemeiniglich verkauft werden, daß unser junges Vieh den besten Wuchs hat und

stets, ohne Körner zu genießen, fett ist, daß ein paar Ochsen zu 2, 300 und mehr Gulden, ein Rind von 2 Jahren zu 40 bis 60 fl., ein Kalb von 4 bis 6 Wochen zu 8 bis 12 fl. verkauft werde: so sage ich bey keinem zu viel. Die Vermehrung des Viehstandes ist allerdings zu der Viehnutzung zu rechnen. Wenn wir die Stallfütterung bey uns wollten wieder abschaffen und den Weidgang, im Gegentheil, einführen: so bin ich gewiß, daß wir vieles Vieh müßten abschaffen; der Ueberfluß an Getreide, den wir jetzt haben, würde verschwinden. Es ist leicht zu erweisen, daß ein Land, wenn es seine Huthweiden in Aecker, Wiesen und Kleefelder verwandelt, noch etlichemahl mehr Vieh zu halten im Stande ist, als es jetzt auf denselben zu ernähren nicht vermag. Ich will den Beweis von dem Orte entlehnen, worinnen ich wohne. Es werden hier, ohne alle Weide, 251 Stücke an Pferden, Ochsen, Kühen, Rindern und Kälbern, gehalten; darzu haben wir in der ganzen Markung 402 3/4tel Morgen Acker, 171 3/4tel Morgen Wiesen, 24 1/4tel Morgen Gärten; keine Waldung und keiner Handbreit Huthweide oder ungebauter Gegend. Wenn wir unser Rindvieh wollten weiden, so, daß es im Stalle nichts sollte bekommen, so bedürften wir zu jedem Stück 1 Morgen, folglich hätten wir noch in allen, für Vieh und Menschen 345 Morgen im Rest, wie wollten nun die Einwohner, deren 561 Seelen sind, Brodt,

und

und Winterfütterung für das Vieh, 251 Stück, genug haben? Jetzt werden kaum 30 Morgen zu Gras im Stall, des Sommers verbraucht, und mehr Korn wird auser Landes verführet als wir jährlich verzehren, und kein Bauer ist, der nicht 2 bis 3 mahl Fett an den Fleischhauer verkaufet, und noch 2. 3. 4 Rinder mästet. Die Schaafe, deren wir 600. ernähren, kommen nicht in Anschlag, welche doch auch im Winter, und mehrere Wochen im Sommer, zu Hauße gefüttert werden. Die besondern Vortheile, die man von dem Hornvieh, durch die Stallfütterung, zu erwarten, und von dem Weidgang keinesweges zu erhalten hat, sind die: Ein Ochse, welcher den Sommer oder Winter auf den Weiden herumläuft, verwildert; solte er von der Weide zur Arbeit genommen, und nicht zu Hause besonders gefüttert werden, so würde er bald mager seyn, und da ihm die Kräfte versagen, zur Arbeit ganz ungeschickt werden; ein Ochse aber im Stall gehalten, ist allezeit bey voraus, und nicht vorausgesehener Arbeit bey der Hand, und seine Kräfte machen ihn tüchtig sie munter zu verrichten. Die Kuh, welche zur Zucht und Milch ausersehen ist, erwartet ihre Fettigkeit nicht von der Weide sondern im Stalle. Die schlechten Grasarten auf der Weide, Kälte, Hitze, das stete Herumlaufen ꝛc. sind die Dinge gewiß nicht, die Fettigkeit geben; eine Kuh im Stall gefüttert giebt 2/3tel

Milch mehr als die auf der Weide. Man darf nur auf das junge Vieh, im Stalle sowohl als auf der Weide, Achtung geben, so sieht man deutlich, welcher Unterschied im Wuchse eines von dem andern unterscheidet und auszeichnet. Uber alle diese Vortheile ist zu erheben: Der Dung, dieser ist und bleibt die Seele des gesammten Feldbaues, ohne ihn vergehet die Viehzucht und alle Gewerbe. Das Vieh auf der Weide verschlept den Dung ganz unnütz und schädlich, da wo er auffält, wenn er auch nachgesammelt würde, so würde er dennoch ganz schlecht, von einen dürrem Vieh, abfallen. Dadurch ist also die Stallfütterung sehr hoch über den Weidgang erhoben, und in allen Ländern nutzbarer als dieser. Woher nehmen wir aber alle die Knechte und Mägde, die das Vieh im Stalle besorgen? In einem Lande, wo man Mangel an Menschen hat, sieht es immer noch nicht gut aus, ein Regent aber, der wie ein Selbstregent denket und bemerket, hat eine weite Aussicht auf wahre, künftige Freuden, nichts wird eher erhalten als die Bevölkerung der Staaten. Damit hat sich, der K. K. Verehrungswürdigsten Gesellschaft, unterthänigst und gehorsamst zu empfehlen die Ehre

der Verfasser.

IX.

IX.

Beantwortung der Fragen über die Abstellung der Huthweiden in Steuermark:

1) Welches ist das richtige Verhältniß zwischen Aeckern und Wiesen?

2) Welches ist die Art, wodurch man nicht nur das Winter-, sondern auch das Sommerfutter in mehrerem Maase und gedeihlicheren Gattungen erzeugen kann?

3) Welches ist die nöthige Arbeit auf einem Acker, nach seiner Lage und innerlichen Güte betrachtet, wenn er mager ist, Sand oder leichten Grund hat?

IX.

Welches ist das richtige, das ächte und wahre Verhältniß, zwischen Aeckern und Wiesen?

Die Bevölkerung eines Landes bleibt und ist für beständig die weiseste Absicht eines klugen Regenten. Wie sollte die Obrigkeit diesen Zweck unter andern Absichten erniedigen, und den allerersten Befehl Gottes: Seyd fruchtbar, mehret euch und füllet die Erde, zurücksetzen? Unter denen Vorzügen eines gesegneten Staats, verstehe ich Leute, die alle ihre Kräfte zur Glückseligkeit der menschlichen Gesellschaft verwenden. Es muß also auf Raum gedacht werden, wo diese nützliche Glieder sich ansetzen können; doch so, daß keines des Landes zu viel noch zu wenig besitze. Die erste und natürlichste Frage ist: Wie viel Morgen Land braucht ein Mensch zu seinem Unterhalt? Wenn ein Mensch 3 Morgen Feldes, von 256 Ruthen, gehörig und richtig bearbeitet, so wird er auf demselben sein Brodt, und

alles

alles was 1 Jahr hindurch zu seinem Lebensunterhalt nöthig ist, erbauen können. Ich meyne es so, daß er 3 Morgen Acker besitze, 1 Morgen mit Winterfrüchten, 1. mit allerhand Sommerfrüchten, und 1. in der Brache. Ein Morgen mit Roggen und Spelzen kann ihm abwerfen 30 Neunling, oder 10 Malter Früchte. Hiervon bedarf er 1 Malter und 3 Simri zu jährlicher Aussaat, und behält also 8 Malter 6 Simri im Rest, davon soll er bedürfen 6 Malter zu Brodt, und 2 Malter 6 Simri mag er zu Einkaufung anderer nöthigen Dinge verwenden. Der Morgen aber welcher mit Hafer, Gerste, Erbsen, Linsen, Kartoffeln, Bohnen ꝛc. angebauet ist, wird seine Küche hinlänglich versorgen. Er düngt von diesen 3 Morgen alle Jahr einen, hierzu bedarf er, nach dem Durchschnitt zu rechnen, 7 Wagen voll. Ich rechne den Wagen voll zu 15 Centner, so bedarf er 105 Centner Mist. Ich nehme an, daß ein Stück Rindvieh alle Tage 20 Pfund, jährlich also 73 Centner frißt, und da solches alle 2 Tage 10 Pfund Stroh zum Unterstreuen bedarf, so wird es, weil es beynahe wieder so viel durch die Excremente abgiebt, als es frißt, 90 Centner Mist machen. Weil nun aber noch hie

und

und da Schaaf-, Hüner-, und Schweindung, Schlamm oder Gassenerde hinzukommt, so wird ein Stück Vieh einen Morgen zu düngen im Stande seyn. Er bedarf also zu drey Morgen Aecker, davon er alle Jahr einen dünget, ein Stück Rindvieh. Durch dieses nöthige Vieh werden auch die nöthigen Wiesen bestimmt. Ich will sagen, daß der Morgen einer etwas schlechten Wiese Heu und Grummet 30, die beste aber 50, die mittlere an Güte aber 40 Centner abgiebt. Diese 40 Centner frißt das Stück Rindvieh; und dann bleiben von 30 Neunling, die Garbe zu 10 Pfund gerechnet, noch 12 Centner Winterfrucht im Rest; das Stroh von Sommerfrüchten mag 20 Centner wiegen, dieses verzehrt das Vieh geschnitten gleichfalls, so hat es 72 Centner, und kommt noch hie und da vom Abkraut, Aefterig vom Getreide ꝛc. hinzu, so erhält es seine 73 Centner vollkommen. Folglich ist daher ersichtlich, daß man zu 3 Morgen Aecker 1 Morgen Wiesen bedarf. Nun aber entsteht die Frage: wie viel bedarf ein Bauer, der die Erde bevölkern soll, an Morgen zu einem Hofe? Und diese: Wie viel Menschen bedarf ein Bauer, der zur Bevölkerung da ist?

Ein Mann und Weib sind zur Bevölkerung bestimmt; hier aus dieser ehelichen Verbindung kommt eine junge Welt in ihren Kindern hervor. Sich also, sein Weib und 4 Kinder, die ich im Durchschnitt rechne, zu ernähren, bedarf er mehr Feld zu bearbeiten: für sich 3 Morgen, für sein Weib 3, für 4 Kinder 6, welches zusammen 12 Morgen Aecker und 4 Morgen Wiesen betrüge. So viele Güter zu bearbeiten sind für einen Mann allerdings zu viel; er bedarf noch zwey Menschen, einen Knecht und eine Magd, und zu dieser Nahrung von neuem 6 Morgen Aecker und 2 Morgen Wiesen; in allem also 18 Morgen Aecker, 6 Morgen Wiesen. Weil nun aber der Bauer die Nahrung nicht allein bedarf; so wird es wohl nicht zu viel seyn, wenn wir noch 3 Morgen Aecker und 1 Morgen Wiesen hinzuthun, und weil es uns schon oben an der Fütterung und dem Dunge fehlen zu wollen schien, wir auch Obst- und Gemüsgärten bedürfen; so schlagen wir ihm deshalb noch 2 Morgen Feldimgen bey. Ein Bauernhof also muß bestehen aus 21 Morgen Aecker und 9 Morgen Wiesen. Auf diesem Hofe hält man 3 oder 4 Ochsen, 2 oder 3 Kühe

und

und eben so viel Rinder; ich werde aber nachher zeigen, daß man nach seinem Belieben noch einmahl so viel Vieh zu erhalten im Stande ist. Alles nun gegen einander gehalten und berechnet, erfordern 7 Morgen Aecker alle Jahre 735 Centner Dung. Neun Stück Vieh geben jährlich 810 Centner Mist. Neun Stück Vieh bedürfen an Futter 657 Centner, und an Einstreuung 162 Centner Stroh, oder andere Hülfsmittel. Neun Morgen Wiesen werfen jährlich ab 360 Centner, diese und noch 210 Centner Stroh vom Sommer- und 210 Centner vom Winterfeld, betragen 780 Centner. Kommt nun das in Betracht, daß die Fütterung ungetrocknet, nehmlich das Kraut, Rüben ꝛc. weit schwerer sind, daß das kleine Vieh des Tages keine 20 Pfund bedarf, und daß man auf verbesserten Wiesen gerne 50 Centner Heu und Grummet gewinnet: so würde Fütterung überflüßig genug seyn. Sieben Morgen Acker Winterfluhr geben 210 Neunling, oder 70 Malter Früchte, da ich aber zu den 8 Menschen 48 Malter benöthiget bin, der Bauer zur Aussaat 9 Malter 3 Simri bedarf, so bleiben ihm noch 12 Malter 6 Simri an Rest; die Sommerfrüchte von 7 Morgen, und

den jährlichen Gewinn von jedem Stück Vieh 10 fl. dazu geschlagen, so hat er in allem sein nöthiges Auskommen. Das wahre und richtige Verhältniß der Aecker und Wiesen gegen einander ist also wie 3. zu 1. und der Aecker und Wiesen gegen die Personen eines Hofes, wie respektive 21. und 9. zu 8., das Verhältniß des Viehes zu den Feldmorgen des Hofs, wie 9. zu 21. und 9. Ich wollte niemahlen rathen, daß man den Landleuten mehr an Morgen Feld zuließe, wollte man aber höher hinaufsteigen, so nehme man ja nicht über 27 Morgen Aecker, und 12 Morgen Wiesen, denn schon bey dieser Anzahl leidet des Bauern Nachsicht auf seinem Hofe. Ehe also die Huthweiden vertheilet werden, muß alles dieses bedacht werden. Alles was man mir gegen dieses aufgesuchte Verhältniß, der Aecker und Wiesen, einwenden wird, ist dieses: diese Höfe sind zu klein, der Wiesen sind zu wenig, die Fütterung nicht hinlänglich, und des Dunges nicht genug. Diese Höfe sind zu klein! ein Hof der seinen Mann wohl nähret, ist allemahl gut gemeßen, und so ist der meinige. Der Wiesen sind zu wenig! eine Wiese die gepflegt wird, kann allezeit 50 Centner Heu und

Grum-

Grummet abwerfen, und der Fütterung, wie des Dunges ist genug. Hieraus erwächst nun die natürlich schöne Frage von selbsten:

Welches ist die Art wodurch man nicht nur das Winter- sondern auch das Sommerfutter in mehrerem Maase, und gedeilicherer Gattung, erzeugen kann?

Ich könnte hier aus einer andaurenden Erfahrung unter uns behaupten, daß das Futter von 9 Morgen Wiesen, zu Erhaltung 9 Stück Vieh, Sommer und Winter, hinlänglich genug sey, wenn man den Wiesen von etlichen Jahren zu etlichen Jahren, in einem Frühling einmahl Dung zuführen, sie von allem Schädlichen wohl reinigen, und die das Wasser abführende Gräben wohl anlegen und unterhalten würde. Allein um nicht bey demjenigen stehen zu bleiben, was schon bekannt ist, will ich meinen landwirthschaftlichen Geist, über die eigentliche Urquelle des Nutzbaren weiter ausbreiten. Eine Wiese soll gesundes, fettes, hohes, dichtes Futter abwerfen, dieses ist die Anforderung an sie. Ehe ich meinen Vorschlag dieß-

falls ertheile, will ich die Gegenden, die von ihnen zu Aeckern und Wiesen sollen verwandelt werden, auszeichnen. Aecker die aus der Huthweide herausfallen sollen, müssen eben und hoch liegen, die Wiesen aber können im Thal und an den Seiten der Anhöhen und Berge ihre Stelle einnehmen, weil sie von den Ueberschwemmungen am wenigsten leiden. Ist diese Auswahl geschehen, so versteht es sich, daß solche Gegenden recht eben und platt gemacht werden müssen, denn dieses erfordert das Wachsthum des Grases und der Sense. So weit nun gekommen, muß I. der Boden mit guten Grassorten versehen, und II. ihm die Grasbestandtheile übergeben werden. Von und über den ersten zu schreiben wäre hier zu weitläuftig, also nur das nöthigste. Die mehresten Huthweiden haben gar keine gute Grassorten auf sich; jedoch giebt es auch einige, wo der Klee dichte, aber ganz klein, da stehet; ist das letztere, so bedarf man keine Mühe gute Grassorten dahin zu schaffen, sie sind in dem Klee bereits da, und fordern nichts als Speise und Fettigkeit. Ist aber das erstere, so ist nöthig, Saamen dahin zu bringen. Dazu hat man

zwey Wege: 1) daß man auf diese Strecken Heu- oder Grasblumen, oder den Luzerner, oder den dreyblättrigten Kleesaamen aufstreuet. 2) Die Strecken mit dem Pfluge herumbricht, sie das erste Jahr mit Hafer, das andere mit Kartoffeln, und denn im dritten Jahr mit Esparsette, Luzernerklee ꝛc. besäet. Wenn alles dieses geschehen, so wäre nun nichts mehr übrig als: III. Der Strecke die nöthige Fettigkeit zu geben. Wir haben keinen Mist, weil wir bishero kein Gras, kein Heu und keinen Mist hatten. Man bedarf ihn aber auch nicht, man nehme 1) Asche vom Ofen, vom Ziegler, von der Wäscherin, von Salpeter- und Seifensieder und besäe damit ganz dünne diese Wiese *). 2) Man nehme 1 Theil Salz, 6 Theil Asche, 6—8 Theil Erde, mische es an einem bedeckten Ort zusammen, und bestreue damit die Wiesen. 3) Hat man aber dieß nicht, so bediene man sich aller roher oder gebrannter Steine, sonderlich des Gypses, diese laße man zerstoßen, und streue den Staub mäßig im Februar oder Anfangs März

*) Und alle diese Asche, besitzet sie irgend eine Fettigkeit?

daselbst aus. Wiesen, so behandelt, können ohnmöglich versagen. Die dritte Frage zu beantworten:

Welches ist die nöthige Arbeit auf einem Acker, nach seiner Lage und innerlichen Güte betrachtet, wenn er mager ist, Sand oder leichten Grund hat?

Folgendes bleibt beym Feldbau allemahl unläugbar: entweder ist der Erdgrund zu leichte oder zu schwer, oder von nöthigem Gewichte. Der letztere bedarf keiner Verbeßerung, zu dem leichten Felde aber muß, ein drittel Märgel oder Thon, und zu dem schweren Felde zwey drittel leichte Erde, oder etwas weniger Sand, genommen werden *). Mir ist nichts weiter übrig, als daß ich die Arbeit, auf den anzulegenden Aeckern, bestimme und festsetze. Wenn die Plätze zu den Aeckern ausgesehen sind, so

*) Leichtes Feld, wenn es dem in der Kupferzeller Ebene ähnlich ist, muß mit 2/3 Märgel und 1/3 Kalkmärgel, und schweres Feld mit kalkartigen Steinen und Abgängen, oder mit Kalkmärgel, nicht aber mit Thon und Sand, denn diese erzielen mehr Schaden als Nutzen, versetzet werden.

so fängt man an, sie von allen Gebüschen und großen Steinen zu reinigen. Ist dieses geschehen, so untersucht man den Boden, und fängt an die schweren Stellen mit leichten, die leichten aber mit schwerem Erdreich zu überführen *); diese Ueberführungen geschehen nach

*) Die einfachste und sicherste Art dergleichen Plätze zu prüfen und zu verbeßern ist die, wenn man 1) die Erde so tief, als die Wurzeln derjenigen Gewächse, welche man zu erbauen gedenket, zu gehen pflegen, herausgraben läßt, diese wohl mischet und nach der im ersten und zweyten Theil angezeigten Art, mit Scheidewasser und Vitriolsäure prüfet, und denn 2) dem Erdreich, falls das in der Tiefe liegende nicht der zu Tage Förderung würdig seyn sollte, durch Bauschutt, Kalk, Seifensiederasche, Märgel ꝛc. das fehlende ersetzen läßt. War das Land mit Steinen und Gesträuchen versehen, so können ihm diese Theile ohne sonderliche Kosten übergeben werden, wenn man von den gesammleten Steinen, im Früh- oder Spätjahr, eine gewisse Parthie, mit dem umherwachsenden Gesträuche und Abfallholz röstet, in diesem Zustande einige Zeit liegen läßt, und dann die zerfallene Steine auf den Saamen

und nach; unterdessen reißet man die Aecker im Herbste herum, und läßt sie den Winter hindurch also liegen; im Frühling säet man, so wie sie jetzt da liegen, den Hafer auf sie. Ist er abgeschnitten, so werden sie queer geackert, im Frühling dieses wiederholt und denn sämmtlich mit Kartoffeln besteckt. *) Sobald die Kartoffeln heraus sind, theilet man seine 21 Morgen in drey gleiche Theile und besäet im

oder auf die Felder streuet. Auf diese Weise dünge ich bereits mehrere Jahre ohne Dung, ein bis auf 3 Procent auflösbarer Erdarten arm gewordenes Feld, und meine Früchte stehen, wie ich dieses mit Augenzeugen bestättigen kann, so schön als die auf den bestgedüngten Feldern.

*) Da nicht in jeder Oekonomie Kartoffeln in dergleichen Menge mit Nutzen unterzubringen sind; so können zur Abwechselung auf dergleichen Feldungen, wenn solche zum Kartoffelbau geschickt sind, also nicht unter 10 Procent auflösbare Theile führen, mit Nutzen und ohne Dung angebauet werden: Turnips, Mais, (türkisches Korn,) Kraut, Kollraben, Blumenkohl, Möhren, Blaukohl, Spinat, (Spinacia Oleracea,) Rüben, Taback ꝛc.

im Herbste das eine drittel mit Wintergetrei-
de, im Frühling ein drittel mit Sommerfrüch-
ten, und das letzte drittel wird im Bau er-
halten, um auf dem Herbst besäet werden zu
können. Aber woher werden wir nun den
Dung zu diesen Feldern erhalten? Ich ant-
worte: 1) da kann ein großer Fürst, der Reu-
ter Regimenter hat, alles am besten einrichten,
und in kurzer Zeit das untragbarste Feld in
das fruchtbarste umkehren, wenn er diese Regi-
menter auf solchen Plätzen campiren läßt. 2)
Ist aber dieß nicht, so bediene man sich auch
da des Dunges, dessen ich bey Anlegung der
Wiesen gedacht habe. Nachdem nun das Feld
gebauet da lieget, so giebt es mir Gelegenheit
den Besitzern ein für allemahl zu sagen und zu
rathen, in ihre Winterfluhr, oben auf den
Saamen den dreyblättrichen Klee einzustreuen.
Wollten sie dagegen sagen: sie verlöhren da-
durch ihre Sommerfrüchte, wohl! sie sollen
auch diese nicht verliehren! sie sollen, bey Säe-
ung ihrer Sommerfrüchte, diesen Klee oben
drauf einsäen, so bleibt ihnen alles. Wo Schaa-
fe geweidet werden, da müßen diese Kleefelder
alle Herbst mit etwas Mist gedeckt, und im

Febru-

Februar mit Gyps, oder andern Steinstaub, besäet werden, so geben sie Fütterung ohne gleichen. Nichts schadet dem Klee als anhaltende Näße und Sumpf, welche sie sämmtlich verabscheuen, und auf diesen ohnfehlbar schnell umkommen. Dieß ist alles was ich über die Huthweiden sagen zu müßen nöthig fand.

X.

Maximen

aus dem

Lebenslaufe eines Bauern,

welcher

durch dieselben vermittelst eines geringen Vermögens ein reicher Mann geworden ist.

Ich Stephan Müller diente als Knecht bey dem Bruder meines Vaters, seine Haushaltung wurde sehr verschieden von der unsrigen geführt; der Güter waren viele, man hatte weit mehrere Aecker, aber diese wurden weder gehörig gebauet, noch mit nöthigen Dunge versehen. Man hatte viele Arbeiten, und sehr schlechte Erndten, und weil das Vieh bey schweren Arbeiten mehr Stroh, als Heu und Klee, fraß: so war es mager, und konnte niemahls mit Vortheil und Gewinn verkauft werden; der Bauer selbst überließ seinem vielen Gesinde die Arbeit. Jetzt hatte er etwas zu handeln und saß in dem Wirthshause, dann hatte er in der Schmiede, beym Wagner oder beym Seiler etwas zu flicken, und stand Stundenlang bey ihnen; die Hälfte des Tages war so vergangen und die andere mußte er in die Stadt, um dieß und jenes zu kaufen. Wir hatten kaum acht Tage einen und eben den Ochsen, heute den, morgen wieder einen andern Acker. Mein Vater, der uns nach Verlauf eines Vierteljahres

res besuchte, sich hin und her umsahe, und nichts fand so ihm gefiel, setzte seinen Bruder hierüber zur Rede; was waren seine Antworten? Klagen über die Lage seines Wohnortes, über den Beamten, über den unergiebigen Feldbau, über seine feindseligen Nachbarn. Mein Vater gieng Abends wieder zurück und nahm mich eine kurze Streke Weges mit sich, er forschte mich aus, und weil ich von ihm zur Aufrichtigkeit jederzeit ermahnet ward, so sagte ich ihm seines Bruders übles Betragen ohne allen Rückhalt; er entließ mich, kehrte aber in den ersten vier Wochen, sich stellend als käme er dießmahl nicht unmittelbar von Hause, zu uns zurück. Er nahm seinen Bruder besonders mit sich aufs Feld, er besah seine Aecker und Wiesen, hielt sich so zwey Tage bey ihm auf, gab ihm die brüderlichsten Lehren und Ermahnungen, und kehrte sodann wieder nach Hause. Kaum war er zurück, so schien mein Herr seine Haushaltung zu verändern; gleich in den ersten Tagen kam er zu mir aufs Feld und unterredete sich mit mir alleine. Heuer noch wollte er Aecker zu Wiesen in schneller Eil ansäen, und weil es auch noch nicht zu spät war, so schaffte

er

er verschiedenen Grassaamen herbey, ich säete denselben in drey Morgen Gerstenfeld ein. Er befahl, daß dieß Jahr noch zwey Morgen Acker mit dem Rasen, einer unten an einem Acker liegenden und anstoßenden erhöheten Wiese, beführt werden sollten, diese Arbeit griff er sehr hitzig an, früh und spät waren wir mit allen seinen Dienstbothen und Zugvieh auf dem Felde, in weniger als vier Wochen wurde, bey günstiger Witterung, die Arbeit vollendet. In den Ställen hielt er Musterung; er schafte das leichte untaugliche Vieh ab; seine Kinder wurden fleißiger, und da ihm eine Magd ausgetreten war, so trat die älteste Tochter in ihren Dienst ein. Es hatte durchaus im Hauße den Anschein einer glücklichen Abänderung in allem. Ich mußte mich wundern, wenn ich bey jedweder Erndte, diejenige meines Vaters und meines Vetters, mit einander verglich. Ersterer hatte kaum zwey Drittel so viel Aecker als dieser, ein paar Morgen Wiesen aber mehr, doch erndtete er um zwey Drittel mehr Getreide als dieser; die Helfte des Werths des Getreides trugen die vielen Schnitter für Erndtelohn beynah hinweg. Mein Vater hatte ihm daher

das Einerndten mit der Sichel wiederrathen und vielmehr das Mähen mit dem Haferrechen empfohlen. Allein, da ich anfangen wollte zu mähen, so kam ich mit dieser neuen Art der Arbeit nicht fort, eine in sich verworrene Menge Gras, mit Vogelwicken durchwachsen, und dazu die Früchte sehr dünne, die auf jeden Hieb in sich hinein fielen, hinderten mich. Ich konnte also nicht mähen, wir sammleten wenig, es war auf den nächsten Winter eine sehr schlechte Aussicht in allem, auf dem Fruchtboden, in der Scheuer, im Stalle; unterdeßen war doch alles im Werden, er selbst, mein Vetter, blieb zu Hause und arbeitete überall mit voran. Wir hatten den Winter hindurch unsere Bauernwerkzeuge beynah alle selbst verfertiget; ich webte gegen den Frühling das Gespinste, der Knecht und mein Vetter besorgten den Stall, und so bald als nur das Wetter milde zu werden anfieng, befuhrten wir schon den Acker mit Kiese oder Märgel, die nöthige Gräben wurden in den Sumpfwiesen gestochen, und andere zur Bewäßerung gegraben. Mein Vetter hatte nahe am Dorfe einen Weyher, in welchen sich alle Wäßerung von jeher aus dem ganzen Dor-

fe

se von selbsten ergoß, diesen hatte ich schon im Herbste geöfnet, und den Winter hindurch hatten wir schon, wann wir nur etwas günstige Witterung erhielten, den Schlamm, der von undenklichen Jahren her sich da über Mannes-hoch gesammlet hatte, bis zur Hälfte herausgeschlagen, er frohr auch den Winter hindurch aus, damit befuhrten wir ganz dichte unsere neu angelegte, noch etliche Morgen starke natürliche Wiesen, und einen großen Acker zum Gersten und Hirsenbau *). Die Zeit der Saat

 rückte

*) Da der nahe bey Aeckern gesammlete Schlamm nicht allezeit zur Verbeßerung tauget, und sehr häufig schlechterer Art ist als die Erde der Felder selbst, so ist dem Landmann nachdrücklichst anzurathen, daß er nach der im ersten Theil pag. 257. angezeigten Art solchen zuvor prüfe und das erhaltene Procent mit dem des Erdreichs, aus welchem der Acker bestehet, vergleiche. Findet er ihn reichhaltiger als die Ackererde, so wird sein Gebrauch von Nutzen seyn, im ermangelnden Falle aber niemahlen. Sollte aber die Ackererde nach der Probe mit Scheidewasser über 40 Procent, nach der mit Vitriolöhl unter 12 Procent auflösbarer Theile besitzen, so ist der Schlamm, wenn er stark Thonartig ist, also wenig oder gar nicht

mit

rückte heran, wir säeten nach und nach ein, und weil mein Vater gerathen hatte, anstatt des unvortheilhaften Hafers, lauter Gersten und Wicken zu säen, so geschahe es auch auf den allermeisten Aeckern, und wir bestellten kaum zwey Morgen mit Hafer. Ich hatte indeßen Winters alle sich sammlende Mistlachenwaßer bey regnerischer Witterung auf die Getreidefelder geführet, und sie damit befeuchtet, die aufkeimende Wicken aber mit Haalbötzig bestreuet *). Als nun der Junius herbey kam, zeichneten sich alle unsere Aecker vor den übrigen des Dorfes durchgängig schön aus, wir hatten die beste Hofnung, auf Wiesen und Aeckern die reichsten Erndten zu sammlen; wie gehoft, so auch erhalten, und dieses veranlaßte nun auch die Vermehrung des Viehstandes. Wir hatten jetzt mehrern

mit Säuren aufbrauset und mit Vitriolsäure digerirt über 35 Procente am Gewicht verliehret, mit wirklichem Vortheil zu verwenden.

*) Auch für die Gerste würde das Haalbötzig, wenn man solches mit eben so viel Gyps vermischte, sehr nützlich seyn, denn beyde sind und führen Bestandtheile derselben.

mehrern Dung, und um diesen noch reichlicher zu haben, führten wir aus Haiden und Wäldern Rohr, Binsen, Laub, Tannenäste u. dgl. zusammen, wir sammelten mehr als funfzig Wagen voll unnütze Erde und magern Rasen in die Mistlache, wir düngten die Brache sehr reichlich und gebrauchten so alle Mittel zu einer künftighin noch ergiebigern Erndte *). Alles Getreide sahe ich gerne auf dem Felde, und dankte dafür Gott; nur der Hafer, der gar nicht einträgliche Hafer, war mir verhaßt, ich konnte deßen fortgesetzte Ansaat gar nicht verstehen, endlich aber klärte sich mir das Geheimniß nach und nach auf. Mein Vetter sprach nun wieder von einem gar zu schönen jungen Pferde, endlich von großen Gewinn, sol man damit zu machen im Stande wäre, von guten Ankauf; und bald darauf ritte er es zum Hofe herein. Gegen den Winter ritt er nun öfter in die Stadt, von einem

*) Statt 50 Wagen Erde und Rasens nehme man einige Wagen voll kalkartiger Körper. Zerfallenen Kalk, Kalkschutt, zerstoßenen Märgel, Seifen- oder Pottaschensieder Asche ꝛc., und die Wirkung wird nicht allein anhaltender, sondern auch auszeichnender seyn.

Markte zum andern, zu Zeiten wann wir Kieß führten, spannte er auch sein aufgefüttertes Pferd den Ochsen voran; einst wurde es scheu, schlug und tobte gewaltig, mein Vetter lief also gleich zu, es hatte sich in die Stränge verwiret, er machte es los, und der Dank für den Dienst war, daß es aus- und meinem Vetter den einen Arm zugleich mit entzwey schlug. Dieß Unglück hatte eine gefährliche langdauernde Krankheit seiner schwangern Frau, die ihr der Schrecken verursachte, zur Folge; die Magd, weil die Töchter bey ihres Vaters Verbindung einigemal ohnmächtig geworden, bediente also meinen Vetter, und blieb bey ihm meistens zu Hause, wenn die Kinder das Feldgeschäfte besorgten. Nach Verlauf eines viertel Jahrs eheligte ein Taglöhner die Magd ganz unvermuthet; mein Vetter verkaufte um die nehmliche Zeit ein ansehnliches nöthighabendes Stück Holz von drey Morgen; die junge Frau kam gar bald in den Ruf, daß sie schon vor der Ehe schwanger gewesen, und der Taglöhner vom Kinde der Vater nicht seyn könne; sie wurde auch wirklich um ein paar Monathe zu früh entbunden, doch niemand fochte sie deswegen

an,

an, das Gerücht legte sich nach und nach wieder, und die Sache wurde vergeßen. Mein Vetter, der zu arbeiten außer Stand war, gieng nun wieder öfters ins Bierhauß, rauchte Toback, spielte, trank und kam gemeiniglich etwas betrunken nach Hause. Ich besorgte meine Ställe, und von da aus beobachtete ich etwas, dem ich anfangs ganz gleichgültig zusahe. Unsre vorige Magd, die Taglöhnerin, kam nun zu ihm, mit dem Kinde auf dem Arm in die Scheune, die Frau weinte und er drückte ihr etwas in die Hand, so schlich sie wiederum weg; nach etlichen Tagen sah ich sie wieder und hörte die Worte: mein Mann jagt mich gewiß mit dem Kinde fort, wenn ihr mir nicht heute noch funfzig Gulden bezahlet — Er zahlte. Dieß gieng noch etlichemahl in einigen Wochen so. Als mein Vater alle diese Vorgänge erfuhr, kam er selbst zu meinem Vetter, um ihm seine letzten Gedanken zu sagen, mich aber auch zugleich (mein Jahrdienst war eben jetzt aus) von seinem Hause weg, und wieder zu sich zu nehmen. Hierüber war aber mein Vetter nicht wenig betroffen und erklärte, daß er Willens sey, mir alle seine Güther abzutre-

ten, wenn ich seine älteste oder nachälteste Tochter zu heyrathen gedächte. Mein Vater überließ die Sache meiner Ueberlegung, ohne mich aber hierüber lange zu besinnen, so erklärte ich ihm, daß ich mich zu einer Heyrath mit einer dieser Töchter unmöglich verstehen könnte; meine Ursache sey keine andere als die Sorge, daß das böse Exempel eines Vaters auf seine Kinder leicht wirke, und auch künftig noch zu wirken vermöge. Wir giengen also zusammen hinweg. Ich war kaum vier Wochen zu Hause, so brachte mich mein Vater wieder in einen Dienst. Ehe er mich von sich entließ, so sagte er mir neben andern guten Ermahnungen auch diese: du mußt nicht glauben, daß ich dich dießmahl so weit von mir ohne Ursache hinwegschicke, die Art, unsere Güther zu bearbeiten, ist bey weiten noch nicht die beste. Ich war ohnlängst bey meinem alten Bekannten, bey dem du nunmehr in Dienst kommest, da fand ich sie beßer; meine Absicht mit dir ist also nun diese, daß du zwey, drey Jahre in seinem Dienste verharrest, und in solcher Zeit die Bauart, die Viehzucht, die Haushaltung, nach seinem Fürgang, erlernest, und mir solche, als einen wichtigen Schatz, nach-

her mit zurück bringest. So gieng ich, und fand das, was mir mein Vater gesagt hatte, ganz wahr; wir hatten schwer Feld, hier fand ich leichtes, mehrentheils Sand; wir hatten leichtes Vieh, hier war alles Vieh sehr groß und schwer; wir baueten immer einerley Früchte, Roggen, Spelzen, Gersten, Wicken, hier bauete man nicht nur dieses alles sondern auch Hirse, Weizen, Bohnen, Burgunderrüben, Kartoffeln, Klee von allerley Arten; wir brauchten Viehdung und Schlammerde, hier dungte man mit gebrannten Laimen, mit Kalk, mit Haalbötzig und Dornschlag, mit der Mistlache, nicht wie wir sondern nach der Schweitzer Manier, die man mit dem Namen Gülle benannt hatte. Kurz! meine bisher erlernte Haushaltung war in ihren Regeln zu einfach, hier aber war alles auf jedes gerichtet und durchaus erweitert; ich fand da eine Schule, wo ich ganz unten meinen Platz einnahm, mein Bauer war bey allen Arbeiten mit und voran. Das ganze Guth bestund in drey und sechzig Morgen Acker, in vier und zwanzig Morgen Wiesen, in funfzig Morgen Holz, den Morgen zu hundert und achtzig Ruthen; auf diesem Guthe standen acht Fuhrochsen, sechs Kühe,

sechs dreyjährige, sechs zweyjährige, sechs einjährige Rinder, und noch sechs frisch angebundene Kälber; die sechs dreyjährigen Rinder standen in der Mastung, das übrige Vieh war alles wohl bey Leibe, gut gewachsen, schwer und groß, doch alles ländliches Vieh. Alle Jahre mästete man die ältesten vier Ochsen, von sechs bis sieben Jahren, und verkaufte sie mit den sechs Mastrindern. Wie nun diese durch die Kälber alle Jahre ersetzt wurden, so wurden die vier Ochsen von außen zu vier und fünf Jahren alt wieder erkauft. Der Viehstand wurde also niemahl verringert, doch lies man ihn auch niemahlen zu groß werden, denn mein Bauer wolte für solches Fütterung genug haben. Er zahlte der Herrschaft von allen seinen Güthern des Jahrs beinahe hundert Gulden, diese und der Knechte und Mägde Lohn, nebst andern beständigen Ausgaben, lößete er sicher aus seinen sechs Rindern; der Gewinn aus den Ochsen und dem Getreide fiel ihm als Zulage zu seinem baaren Vermögen, von Jahr zu Jahr, in den Beutel. Mein Bauer, weil er bey allen seinen Vorgesetzten in gutem Credit war, stund auch bey allen seinen Mitbürgern in Achtung und Ansehen; ein Beweiß hievon kann folgende Er-

eigniß seyn. In den ersten Tagen des July verdarb ein hartes Gewitter, mit Schloßen, unsere Winterfluhr gänzlich, das Getreide, der Roggen und der Spelzen oder Dinkel, von welchen der erstere etwas, der letztere noch gar nicht gezeitiget, meist grün war, lag gänzlich darnieder; er hieb nach dreyen Tagen seine Erndte hinweg, und da er des aus- und abgeschlagenen Getreides eine Menge auf dem Boden erblickte, so brachte er es bey der ganzen Gemeinde dahin, daß kein Hirte in die Feldungen eintrieb, bis alles abgeerndtet, und das abgeschlagene Getreide etwas gedörret war; dann nahm er, und jeder der Gemeinde, seinen Pflug und ackerten daßelbe, doch nicht gar zu tief, unter; der Saame gieng frech auf, die Trockenheit die einfiel, hielt ihn im Wachsthum etwas zurück, im Herbst wuchs er nun fort, und im folgenden, dem letzten Jahre meines Dienstes, stand hier das Getreide noch besser und schöner, als auf dem Felde, welches der Ordnung nach gebauet und gedunget worden, so, daß also die Einwohner ihren Schaden wieder gänzlich ersetzt hatten. So war er, bey allen seinen Vorgängen, eine Lehre, die jeder seiner Mitbürger willigst annahm und befolgte.

So

So viel er auch Heu hatte, um den Winter hindurch sein Vieh davon im Vollauf zu erhalten, so war es ihm doch noch nicht genug, denn sobald der Kleebau bekannt wurde, so war er der erste im Dorfe, welcher ihn einführte. Ferner ersparte er damit die ihm allezeit verhaßte Brache, er war gewiß, durch die umgebrochene Kleewurzeln sein Feld zu verbeßern, und verbeßerte es auch nach und nach wirklich aufs geschwindeste und beste *). Auf diese Art sparte er eben-

*) Daß die Kleewurzeln das Feld einigermaßen zu verbeßern im Stande sind, davon habe ich mich durch die Untersuchung derselben überzeugt. Es bestehen solche nehmlich aus Kalk-, Alaun-, Bitter- und Kieselerde, aus festem und flüchtigem Laugensalz, vitriolisirten Weinstein, Koch- und Digestivsalz; aus Körpern also, welche 1) die Nahrung der mehrsten und vorzüglichsten Gewächse des Ackerbaues ausmachen, und woran 2) der größte Theil der Felder Mangel leidet. Da nun diese Erdarten durch die Wurzeln aus der Tiefe größtentheils herbey gebracht sind, der Oberfläche des Feldes also nicht zugehören, so darf man den Klee als ein wirkliches Dungmittel ansehen. 2 Pfund grüner Wurzeln bestehen ohngefehr aus 1 Loth obiger Erdarten, wovon die des

ebenfalls alles Gras seiner Wiesen auf den Winter, und hatte Sommerfütterung genug. Alle Jahre mußten 10 Morgen mit dreyblätterichten Klee besäet werden; die übrigen Morgen seiner Brachflur wurden ordentlich den Sommer über gebauet. Jene Morgen, auf denen er Rehwasen, oder Spitzgras, welches auch in Apothecken genutzt wird, Hufflatig und dergleichen schädliche Kräuter wahrnahm, wurden gebauet, öfters gepflügt, geegt, fleisig gehackt und die Wurzeln ausgelesen; den Hufflattig ließ er des Sommers durch öfters mit dem Mist, lachenwasser in den heisesten Sommertägen begiessen, so rottete er dieses Unkraut nach und nach aus; der Klee wurde nicht in die Winter-, sondern in die Sommerfrüchte: Erbsen und Gersten, denn Hafer bauete er keinen, gesäet; dieser wurde im Winter mit Mist überführt und bedeckt, dann das folgende Jahr dreymahl abgemäht und der Acker wieder in der Saatzeit herumgebrochen und also gleich, das schwere Feld mit Weizen oder Spelzen, das Sandfeld aber

Esparsetts die besten sind, und 2. bis 2 1/2 Quint dergleichen crystallisirter feuerfesten Salze enthalten.

aber mit Spelzen und Roggen, beſäet und eingeerndtet. Etwas beſonders fand ich auf dem Guthe meines Bauers auch hierinnen, daß beynahe alle ſeine Aecker auf den drey Fluren an einander lagen, und er ſeine drey und ſechzig Morgen ſo vertheilt hatte, daß ich auf den drey Stellen ſeine ein und zwanzig Morgen faſt alle beyſammen erblickte, ich war begierig die Urſachen und Abſichten dabey von meinem Bauer ſelbſt zu erfahren. Ich gewinne, ſagte er mir, nur durch die weggepflügte Unterraine auf meinem jetzt aneinander hangenden Ackerfeld mehr als einen Morgen, den ich alle Jahre zweymahl, auch durch den Klee dreymahl benutze; ich und die meinen, ſind wir einmahl auf unſerm Acker, arbeiten auf die Art in einem Zuge hin, ſo arbeite ich auf meinen Feldern, ohne daß mich andere hindern, oder ich durch meine Arbeiten andere aufhalte, und ich kann allezeit thun was ich will. Seine Wieſen waren zwar nicht ſo zuſammen verkettet, doch enthielten ſie alle große Maaße, und alle waren ſehr gut im Stande; nirgendswo war Sumpf, nirgendswo unkräftiges Gras, auf ſie verwendete er allen Fleiß, Arbeit und Dung, oder wenigſtens Salzbötzig

alle

alle Jahre. Er erhandelte zu Anfange meines letzten Dienstjahres eine große gegen drey kleine Wiesen, ich wunderte mich darüber und es schien mir tadelhaft, denn die drey kleinen Wiesen hatten vortreffliches gutes und sehr vieles Gras, jene große aber war beynahe durchaus elender Sumpf, dies fochte ihn aber nicht an. Als der Frühling heran kam, grub er rund um die Anhöhe derselben, einen Mannshoch tiefen, breiten Graben, und diesen füllten wir mit, in Sumpf und Waßer unverfaulbarem, Erlenholz, das wir, so viel möglich war, hohl über einander hinlegten, die Helfte hoch aus, dann deckten wir denselben mit der ausgegrabenen Erde wieder zu *). Kaum war das gethan, so spannten wir drey Wagen zum Kieß- oder Märgelführen an, und überführten die Wiese mit Kieße oder Märgel, dieser wurde gleich darüberhin verbreitet, und da er halb Spannenhoch auflag, so wurde der Fleck, mit in der Scheune zusammen gebrachten Heublumen oder Heustaub, darunter

*) Wo Mangel an Holz ist, da wird es rathsamer seyn den Graben unbedeckt zu laßen, und ihn blos mit einer Zugbrücke zu versehen.

runter der Saame von allerhand Grasarten war, mit dreyblätterichten Kleesaamen untermischt, auf die Wiese dichte gestreuet *). Es schien mir ein Wunder, wie schnell sich der Sumpf setzte, der Saame grünete, und eine reiche Erndte erhielten wir schon im ersten Sommer darauf; der Ertrag erhöhete den Preis des Guths auf einmahl außerordentlich. Diese schöne Arbeit aber war nun leider auch die letzte Arbeit dieses würdigen Mannes! die Arbeit in der Frühlingsfeuchtigkeit war allerdings für die Gesundheit

*) Wie ein Stück Landes, das einer halben Spanne hoch mit Steinen bedeckt ist, besaamet werden konnte, ist schwer zu begreifen. Die eigentliche Meynung des Herrn Autors war diese: Man pflügte den Grasboden um, so gut als es geschehen konnte, ließ den daraufgeführten Märgel verwittern, und nachdem er mit ersterem, durch abermahliges Pflügen, verbunden worden war, mit Gras und Kleesaamen besäen. Da wo Märgel fehlet, der wenigstens 30 Procent in Scheidewaßer auflösbarer Theile besitzet, da kann auch Bauschutt, Tungsteinschutt, Seiffensiederasche, wann diese Körper mit 1/4 Lehmen, oder der Hälfte gemeiner Erde verbunden werden, mit gleichen Nutzen verwendet werden.

sundheit gefährlich, er arbeitete gerne von allen Oberkleidern entblößt, und zog sich dadurch eine unheilbare Krankheit zu. Ich war in meinem vier und zwanzigsten Jahre, und mein Vater wünschte nun meine Versorgung. Zween Umstände, die sich auf einander anboten, schienen mir vortreflich und annehmlich, meinem Vater aber durchaus nicht. Die Tochter, die ich heyrathen sollte, gefiehl mir, der Güter waren genug, das läugnete er nicht, allein es waren mächtige Frohndienste darauf, die ihm den ganzen Anschlag vereitelten. Ein Guth haben, das mit so viel Frohnen beschweret ist, heißt so viel, als gar keines haben. Diese Vorstellung schien mir zu wichtig, als das ich sie sollte so schlechthin verwerfen, ich folgte, und aus dieser Heyrath wurde nichts. Endlich aber wurde ein Hof von dreyhundert Morgen, Rheinisches Maaßes, nur eine Stunde von uns ab, feil; der Besitzer trug ihn meinem Vater unvermuthet an, dieser aber hielt ihn nicht einmahl des Besehens werth; er war der vierte Theil eines Herrschaftlichen Hofes, sechshundert Morgen gab die Herrschaft an zween Unterthanen ab, die andere Hälfte behielt sie für sich; das

ganze Feld war durchaus nur Sand, man hatte dabey nicht einer Handbreit Wiesen, alles war Acker, doch waren auch die Abgaben geringe, man zahlte jährlich nicht mehr als vierzig Gulden, und gab von allem den Zehenden, für jedes Sterb- und Kaufhandlohn waren hundert Gulden stipulirt. Das wichtigste dabey war nun wohl die Befreyung von allen und jeden Frohnen, und dem Uebertrieb der Schäfereyen, die Güther lagen alle um ein wohl gebautes Hauß und Scheune her, es war ebenes Feld, dem ohngeachtet waren schon drey Besitzer unmittelbar auf einander darauf verdorben; doch dreyhundert Morgen für fünf und zwanzighundert Gulden geboten, war auch nicht zu verachten. Meinem Vater grauete für dem Sande, er war des Sandfeldes nicht gewohnt und glaubte, daß es weder nutzbar noch tragbar gemacht zu werden Fähigkeiten habe; so dachte ich aber, durch meinen dreyjährigen Dienst in einem sandigten Lande vom Gegentheil überzeugt, nun nicht; ich bat also meinen Vater mit mir das Guth zu besichtigen, er willigte ein, und wir giengen dahin. Das Guth war so, wie ich so eben schon gesagt habe, ich bemerkte aber

auf der Stelle noch mehreres, so mich reitzte, es zu kaufen. Es standen auf dem Guthe hin und her die schönsten fettesten Birnbäume in Menge, wohl nicht überall, doch da und dort auf Haufen beysammen; ich schloß schon aus diesem, daß dieß Sandfeld in seinem Grunde gute, fette, schwere Erde besitze, weil kein Baum auf einem todten Sande so erwächset; wir gruben hie und dort nach und fanden auch da, wo die Bäume nicht standen, einen oder anderthalb Schuhe tief den vortreflichsten gelben Kieß oder Märgel in Menge, in der Ferne sahen wir etliche Morgen mit ganz weißem Sande bedeckt, und darauf sehr kurzes, dürres, mageres Getreide. Auf andern Aeckern dieser Herrschaft sahen wir auf eben solchem Sandfelde, den sehr schön aufgrünenden und schon Schuhohen aufgewachsenen Klee von allen drey Arten, einen so schön als den andern; an der Seite war ein Wald, ein Theil des Holzes war Föhren, ein Anzeigen eines unergiebigen, sandigten Feldes, das übrige war Laubwald, ein Erweiß eines ganz guten Grundes. Als wir zum Stall kamen, so sahen wir zwey paar dürre Ochsen, eine Kuh, ein Kalb, sonst nichts; der Bauer hatte niemahlen

mehr, denn es mangelte das Gras. Von Kieß und Erdeführen wußte der Bauer gar nichts, Kleebau war ihm zu beschwerlich, was neues und verworfenes. Stroh streute er unter, und Stroh fütterte er beständig, von einer anderer beßern Streu war ihm gar nichts bekannt. Die Mistwässerung verlief auf die vorbeygehende Straße, man achtete sie für nichts. Da ich nun dieß überdachte, so fühlte ich in mir viel Reiz, dieß Guth zu erkaufen und auf solchem meinen erlernten Ackerbau zu probiren, ich dachte, es kann dir nicht fehlen. Mein Vater merkte den Anschlag, er widersprach mir wohl noch, doch handelte er mit dem Besitzer, dieser fiel von dem angesagten Preiße auf einmahl auf zwey und Zwanzig hundert Gulden herab, mein Vater both, und blieb bey zwey tausend Gulden stehen, endlich faßte er alles und jedes, Schiff und Geschirr, Geströh, Fütterung, Mist und Vieh zusammen, und both ein und zwanzig hundert Gulden. Er nahm mich auf die Seite und sagte mir: jetzo besinne dich, ich gebe dir tausend Gulden Heyrathsgut, ein paar Ochsen, eine Kuh, ein Rind von zwey Jahren, glaubst du so heyrathen zu können, daß du be-

stehen kannst und weißt, daß deine künftige Arbeiten nicht vergeblich seyn werden, so will ich es erkaufen. Ich besann mich nicht lange, ich bat meinen Vater, den Hof auf die Art für mich zu kaufen; wir kamen zu dem Verkäufer zurück und in weniger als zwey Stunden Zeit, war der Kauf schon geschloßen, selbigen Tags noch war er vor Amt schon protocollirt und genehmigt. Die Erndte war vor der Thüre, in vierzehn Tagen zog der Verkäufer schon ab, mir wurden funfzehen hundert Gulden seiner Schulden übertragen, und das übrige des Kaufschillings nebst dem Handlohn zahlte mein Vater baar aus. Ich war auf eine gute Heurath nunmehro vor allem bedacht. Ich entdeckte meinem Vater meine Absicht, und da ich die zweyte Tochter, der oben erwehnten Wittwe, zu meiner künftigen Ehegattin gewählet hatte, so billigte er mein Vorhaben gar gerne; die Mutter versprach mir acht hundert Gulden Heyrathsguth, weibliche Aussteuer, eine Kuh und ihr Kalb; ich bezog also meinen Hof so eben vor der Erndte. Unter vielen väterlichen Lehren, bey meinem Abzuge, war auch noch diese: „Früh auf und spat nieder, bringt verlohrne

Güter wieder.“ Sie blieb mir fest in Gedanken, sie weckte mich früh auf, und ließ mich nie früh zu Bette. Meine erste Sorge war um mein Vieh; dieß den Winter durch von meinem Geströh zu erhalten, war nun nicht möglich, Heu hatte ich ohnehin nicht eine Handvoll in der Scheune, was war nun also zu thun? ich richtete meine Sorge auf den bevorstehenden Winter und auf den künftigen Sommer zugleich. Ich erkaufte mir drey Malter Wicken, zwey Malter Erbsen, sechs Malter Hafer und noch drey Centner dreyblätterichten Kleesaamen, ich nahm so vieles Feld von dem Brachfelde, als ich hierzu bedurfte, und säete dieß alles noch vor der Getreide Erndte unter einander ein. Ein Regen, der gleich ein paar Tage darauf folgte, brachte alles ins Keimen und die folgende, sehr gute Witterung, alles zum gewünschtesten Wachsthum. Ich hatte also Hoffnung, für heuer gedörrtes Gemäsche und künftigen Sommer noch Kleefutter zu erhalten, und diese Hoffnung erreichte ich ohne viele Arbeit. Nun gieng es an die Erndte des Getreides, dieses stand sehr elend, ich und mein Knecht mäheten beynahe hundert Morgen gewirrt in einander, und so

auch gebunden, in wenig Tagen nieder, und so, wie wir es heim brachten, brachen wir bey funfzig Morgen wieder herum und besäeten sie mit Rüben, die übrigen Morgen aber, die wir auch umbrachen, besäeten wir mit Gemäsche von Hafer, Wicken und Erbsen, zum Abgrasen auf den Herbst. Woher aber indeßen bis dorthin die Fütterung für mein Vieh? woher zu allem das Geld? Achzehn hundert Gulden war mein Vermögen, sieben hundert Gulden zahlte ich dem vorigen Besitzer, funfzehn hundert blieben auf dem Hofe haften, die Schuldner waren froh, ihre Kapitalien in sichern Händen zu sehen, und ließen sie auf dem Gute gerne stehen; mir blieben also eilf hundert Gulden in der Hand, mit diesen wurden die Ausgaben bestritten, und jetzt vor allem einige Wägen voll Heu in der Nähe für mein Vieh gekauft. Die Hafererndte kam nun heran, ich und mein Knecht mäheten in wenig Tagen bey siebenzig Morgen, und auf diesen Morgen mehr Gras als Hafer. Von diesem Flur lagen bey dreysig Morgen gar öde und wüste, und weil wir kein Band hatten, so luden wir es ohngebunden auf

und brachten es heim *). Ich bestellte drey Dreſcher, die die Saamenfrucht ausdroſchen; über die Hälfte der Kornerndte gienge hier auf, um fünf und siebenzig Morgen mit Roggen zu beſäen, die übrigen Morgen hatten, wie gesagt, Gemäſche und Klee, diese fünf und siebenzig Morgen sollten wir mit dem Miſte, der da lag, überdüngen, allein ich sahe gar bald die Unmöglichkeit ein, ich dungte nur dreyſig, diese aber so gut als ich konnte, und beſäete auch nur dreyſig. Was helfen mir fünf und siebenzig Morgen ungedüngt, die doch nicht so viel tragen können als dreyſig wohlgedüngte, dort iſt beynah zweymahl mehr Arbeit, als da; hier aber mehr und ſicherer Gewinn, als dorten! Den folgenden Frühling beſteckte ich die übrigen Morgen, zu denen ich indeßen den nöthigen Dung sammlete, mit Kartoffeln und Turnips, ſo daß also die Winterflur das folgende Jahr fünf und zwanzig Morgen Klee, fünf und vierzig Morgen Kartoffeln und Turnips, und dreyſig Morgen mit Getreide hatte. Als nun mein Roggen

*) Und warum verwendete man den Hafer nicht, da er grünte, zum Futter des Viehes?

Roggen gesäet war, so kam das Gemäsch auf dem Kleefeld zur Einerndtung an die Reihe, wir dörrten und sammleten davon eine ziemliche Menge, der Klee stand dichte und gut, doch aber war er sehr schmachtend. Mein Vieh wurde von nun an von dem Kraut der Rüben und mit dem Gemäsche auf dem Getreidefeld bis über Simonis und Judä hinaus sehr wohl gefüttert. Nun richtete ich meine Absicht auf das Kleefeld, machte einen Anschlag, welcher gelang und der auch meinem Vater gefiel. Er schickte mir dazu, wie die meiste Arbeit vorbey war, einen Knecht mit einem Wagen, ich nahm die meinen dazu, und durch Beyhülfe zweyer Taglöhner ließ ich meinen Haushof zwischen dem Hauße und der Scheune, der durchaus zu hoch war, alsogleich abheben und den Platz, wo der Mist bisher gelegen hatte, ausgraben; diese fette und gute Erde aber auf meinen schmachtenden Klee aufführen und ausbreiten, wodurch dieser noch im Herbste in ein paar Wochen ein ganz anderes Ansehen gewann, und im folgenden Frühling wuchs er auch außerordentlich

lich frech auf *). An meiner Miſtſtätte ließ ich ein großes tiefes Loch ausſtechen, darein die aus der Miſtſtätte überlaufende Miſtwäßerung nach und nach einſank, und ſo wie jenes davon voll wurde, ließ ich es ausſchöpfen und in einem Faße, Winters hindurch, auf mein abgeerndtetes Wintergetreidefeld aufgießen. Nach Vollendung der ganzen Erndte ſahe ich mich bereits ſchon im Stande, die Anzahl meines Viehes zu vermehren, und zum Vortheil meiner vielen Aecker dadurch mehr Miſt zu gewinnen. Ich beſchloß alſo die Erweiterung meines Viehſtandes ſchon dieſen Winter, und erkaufte ein paar fünfjährige Zugochſen, einen jährigen Farren und drey einjährige Kälber. Den Winter hindurch wurde das Eingeerndtete ausgetroſchen, und

*) Wenn dergleichen Erde wenigſtens 10 Procent in Scheidewaſſer, und eben ſo viel in Vitriolſäure auflösbarer Theile beſitzet, ſo wird ſie im erſtern Fall mit Nutzen auf thonicht und im letzterem auf ſandicht und kalkartichte Felder zu gebrauchen ſeyn; iſt ſie aber minder gut, ſo belohnet der Ertrag die Arbeit nie, und man bedienet ſich dafür der im erſten Theil pag. 192. beſchriebenen Dungungsart mit dem herrlichſten Nutzen, und ohne ſonderlichen Aufwand.

und so viel Getreide erhalten, daß wir bis zu der Erndte hin Brodt hatten, auch Stroh war so viel in Vorrath, daß ich mit solchem, nebst dem gedörrten Gemäsche, den Rüben und dem erkauften Heu mein Vieh zu erhalten im Stande war, nur mangelte mir genugsames Streustroh, aber der Fohren- und der Laubwald, die an meine Felder auf der einen Seite anstießen, gaben mir auch hier gute Auskunft. Mein Vater sagte oft: "Holz macht Aecker stolz!" Dieses Sprichwort fiel mir auf einmahl in die Gedanken, ich erkaufte mir bey dem Jäger kein anderes Holz als Fichten, Tannen und Föhren, diese bekam ich ganz wohlfeil. Ich hauete alle Aeste, daumens dick, halb- auch viertel Ellen lang, klein zusammen, die alten abgefallenen Nadeln, die Saamenzapfen und die Blätter erhandelte ich gleichfalls, und ließ meine noch nicht gefüllte Scheune damit vollführen. Ueber diesen Einfall lachte jedermann, und es vergiengen wohl zwölf Jahre, bis meine angränzende Mitbauern nach und nach klug wurden, und mir in den Kauf einfielen. Mein geschäftiges Weib und ihr kleines Dienstmädchen hatten, so viel möglich, von etwas erkauften Flachse und Werke gesponnen, dazu erkaufte ich einen

Web-

Webstuhl, und setzte meinen Buben hinter denselben und lehrte ihn weben, oder webte mit meinem Knechte selbsten. Meine Bauerwerkzeuge waren schlecht, deßwegen verfertigte ich solche mit meinen Leuten aufs neue, gewöhnlich ein Geschäft im Winter des Nachts nach dem Eßen. Die Zeit kam heran, da der Schnee nach und nach abgieng; ich hatte längst schon eine Klinge, die das ablaufende Waßer tief ausfraß, auf meinen Güthern, ganz nahe an meiner vorjährigen abgeerndteten Haferflur, bemerket, daselbst fand ich auch eine große Menge Kieß. Wir nahmen zwey Wagen, jeden mit ein paar Ochsen bespannt, und fiengen an, auf dieser Flur, Beet für Beet den Kieß zu verführen; in weniger Zeit, ohngefähr in vier Wochen, hatten wir schon etliche Morgen überführet. Nun aber war es Zeit, mein abgeerndtetes Wintergetreide-Feld mit Mist zu der mir vorgenommenen Gerstensaat, wozu ich für dießmahl den Saamen erkaufte, mit Dung zu überführen, einiges davon hatte ich mit dem Mistlachenwaßer Winters hindurch schon versehen, und ich erachtete es dadurch hinlänglich Kraftvoll zu seyn, das übrige versahe ich also mit Mist, und weil ich sahe, daß ich deßelben

hiezu

hiezu nicht genug hatte, so hielte ich damit sparsamer Haus, und gab jedem Beete etwas *). So bald der Mist da lag, so bald fiengen wir auch an mit drey Pflügen zu ackern, und den Mist unter die Erde zu bringen, so wie wir pflügten, so breitete der Junge und die Magd den Mist vor uns aus. Nach dem Einpflügen des Mistes wagte ich, in der Mitte Aprils Gerste zu säen, und Klee oben drauf, den ich im Herbst noch zu nutzen wünschte. Ein Sandfeld ist aus zwo Ursachen verachtet, erstlich weil auf ihm die Feuchtigkeiten, die der Saame zum Keimen und Wuchse bedarf, gar früh verfliegen, und dann, wann es einmal dürre geworden, der Wind den Sand von den Wurzeln des Getreides leicht wegbläßt, daßelbe also auch gar leicht verdorret. Diesen zweyen mächtigen

*) Wo es an Mist fehlt, da wird man weise handeln, im Winter durch die Knechte entweder Märgel nur ungebrennt im Wergeltrog zermalmen zu lassen, und mit dem Miste zu vermischen, oder aber, welches leichter geschieht, fehlt es nicht an Holz, solches in aufgesetzten Meilern oder im Backofen etwas zu brennen, und sogleich auf die beschneyten Felder zu fahren.

tigen Fehlern zu begegnen, hatte ich mir den Winter hindurch aus einem schweren Blocke eines alten Birnbaums eine Walze verfertiget, mit dieser walzte ich durch Hülfe zweyer Ochsen das geegte ganze Feld feste. Fünf und siebenzig Morgen stunden nun mit Gersten, und die übrigen fünf und zwanzig besäete ich mit Wicken, Hirsen, Erbsen und Linsen, ich säete auch da meinen Klee ein, und behandelte diese wie jene. Nun war noch eines, auf welches ich schon vorhin gedacht hatte, übrig: ich traute meinem Miste nicht, er war meistentheils Holz, ich konnte mich also nicht überreden, daß er so geschwinde zu faulen vermöchte, mir schien es also unmöglich, daß er seine Dungkraft so bald zu äußern im Stande sey, deßwegen kaufte ich aus einer nahen Ziegelscheune funfzehn Säcke voll zerfallenen, zum verarbeiten unnützen, Kalk, vier Säcke voll Aschen, und aus der Stadt wohl fünf und zwanzig Säcke voll Hüner und Taubenmist zusammen, diesen Koth schüttete ich den Winter hindurch auf meinen obern Hausboden, wo es ohnehin noch von Getreide ganz leer war, er dorrte dadurch; jetzt ließ ich ihn dreschen, unter den Kalk und die

Asche

Asche mischen, und dann damit meine ganze Sommerflur überstreuen. Wir hatten indeßen bis zu Anfang des Maies wieder etliche Wagen voll Dunges gesammlet, diese führten wir auf die fünf und vierzig Morgen, und zwar vorzüglich auf die bereits geackerte dreyßig Morgen, welche mit Kartoffeln besteckt werden sollten *). Bis man die Turnips zu setzen gewohnt war, hatten wir noch ein paar Wagen Dung gemacht, und weil wir damit, die funfzehn übrigen Morgen zu dungen, nicht zulangten, so übergoßen wir bis dorthin etliche Morgen mit Mistwasser, wir stürzten das ferntige Haferfeld, so wie wir es nach und nach den Sommer hin mit Erde und Kieße beführt hatten, mit den fünf und zwanzig öde liegenden Morgen um, dabey war ich nunmehr um nichts so sehr bekümmert, als um den mir im Herbste in der Saat allerdings abgehenden Dung; ich hatte

*) Auch hier würde der Kalk mehr als Mist geleistet haben. Nichts übertrift bey diesem Gewächse die Wirkung des Kalks, vorzüglich die der Seifensiederasche, oder wie ich bereits erwähnte, statt deren eine Vermischung aus Märgel und Kalk.

hatte mich deßelben nun gänzlich beraubt; doch, da ich auf mein Erden- und Kießführen sahe, und schon gegen Jakobi hin bis fünf und zwanzig Morgen so obenhin überführt, auch schon mehrere Morgen mit dem Mistwaßer bespritzt, und bereits schon wieder Asche, Kalk, Tauben- und Hünerkoth zu erhalten Gelegenheit gehabt hatte, so erkaufte ich, als ich den vortreflichen Wuchs meiner Fluren übersah, auf gut Glück, noch ein paar tüchtige Ochsen, und so viele Rinder, daß die Zahl von zwanzig Stücken, meine drey angestellte Kälber nicht gerechnet, eben und voll wurde. Die gewöhnlichen Arbeiten wurden an den Kartoffeln und Turnips, wie an dem gesetzten Kohl gethan, und da wir nun Blätter und Klee genug hatten, so war meinen Mägden die Arbeit im Hauße erleichtert; wir Mannspersonen versahen indeßen alles, was auf dem Felde Bearbeitung erforderte, alleine. Ein Jahr meines Hierseyns gieng nun herum, und der Zins von meinen funfzehn hundert Gulden Schulden mußte bezahlt werden; ich zahlte sie aus meinem baaren Vermögen in der Hoffnung sie, so das erste und letztemal, zu bezahlen. Wir sammelten hundert Scho-

ber des lauterſten Roggens von den dreyſig Morgen, und über hundert Schober von den fünf und ſiebenzig Morgen Gerſtenfeld ein; die Linſen überwuchs mein Klee, und dieſen Klee meine Wicken, dort verdarben die Linſen, hier beynahe der Klee, Linſen erhielten wir keine, aber Wicken und Hirſe ſehr viel, ſo wars auch mit den Turnips und Kartoffeln. Kleeheu ſammelten wir beynahe fünf und zwanzig groſſe Wagen voll, hiezu kaufte ich nochmals für hundert Gulden Heu, und vermehrte, da auch meine auf das geſtürzte Roggenfeld geſäete Rüben, die viel ſchöner und in weit größerer Menge als vorm Jahr aufwuchſen, auch meinen Viehſtand noch mit ein paar Ochſen und zwo Kühen. Wir hatten die Winterflur, hundert Morgen ſtark, wieder beſtellt, und machten uns jetzt abermals an die Beholzung und Herbeyführung einer ſehr groſſen Menge Sträuche von Tannen- und Föhrenäſten, Nadeln und Laub. Nach dieſem, ſo lange es nicht einſchneyete, führten wir Tag für Tag Erde und Kieß auf die abgeerndeten Winterflur auf. Hier will ichs nun kurz machen, auf die Art giengen ſo alle Jahre unſere Winter- Frühlings- und Sommerarbei-

ten fort, ich vermehrte meinen Viehstand schon im dritten Jahre auf funfzig Stücke groß und klein Vieh, und so glaubte ich mich nun gänzlich geborgen, denn mein Feld nahm so zu sagen an Güte von Tag zu Tag zu, und wie kann es denn dem Bauern je fehlen, wenn sein Feld, dem Erdreich nach, seine rechte Schwere erhält, wenn er genug Getreide, genug Vieh, genug Fütterung, keine Frohnen, fleisiges Gesinde, eine verständige Hausfrau hat, er selbst aber bey allen Geschäften dabey und immer voran ist? Im dritten Jahre meines Hierseyns sammelte ich schon zweyhundert und drey und dreyßig Schober Winter- und hundert und drey und dreyßig Schober Sommerfrüchte, allermeist Gersten, ziemlich viel Wicken, etwas Erbsen, Linsen, Flachs, nebst einer großen Menge Kartoffeln und Turnips; vielen Kopfkohl, und auf der gleich nach der Saat gestürzten Winterflur mehr als vierzig Wagen voll der allerschönsten Rüben. Je mehr ich Erde und Kieß führte, je mehr ich Vieh hielt, je eifriger ich war, meine Felder mit Mistwasser zu besprützen, je fleißiger mit Tannen- und Föhrenästen meine Miststätte zu besorgen, und also mit Holz zu düngen, je stolzer wurden meine Aecker, je größer meine Ernd-

ten;

ten; ich schnitt öfters über dreyhundert Schober Wintergetreide, den Schober zu 60 Garben gerechnet. Meine Felder zusammen waren in drey Fluren getheilet, auf den einen stund Winter, auf der zweyten Sommergetreide, auf der dritten Klee, welcher allezeit in die Gersten und übrige Sommerfrüchte, wo es schicklich war, eingesäet wurde; folglich hatte ich kein Brachfeld und Sommershin auch keinen Sommerbau zu besorgen. Mein Mist wurde allezeit gegen den Winter auf mein Kleefeld geführt und verbreitet; kam nun die Saatzeit im Herbst heran, so mähete ich den Klee ab und brachte ihn gedörrt heim; den Acker stürzte ich zur Saat; meine Turnipsblätter und das Kraut von den Kartoffeln waren von nun an die grüne Fütterung für das Vieh, dann gieng das auf der abgeerndteten Winterflur aufgesäete Gemische von Wicken, Hafer, Erbsen, nach diesem die Blätter von Rüben und Krautkohl an; dieses abgeerndtete Kleefeld wurde nun, so wie gesagt, so wie es war, gestürzt, ohne es weiter zu düngen säete, ich mein Getreide oben darauf ein, alles war locker, der Klee lag unten zu künftiger Düngung durch seine Fäulniß im Frühling, dann im kalten Winter fault kein Rasen, und

meine Walze drüber her befestigte alles wieder. Hierdurch kam mein ganzer Hof hauptsächlich in die so gute Beschaffenheit, und ich zu meinem Vermögen; denn bey so einer Einrichtung und Ersparung vieler Arbeiten, verwendete ich meine Bemühungen, die mir somit übrig waren, auf das Erden- und Kießführen; der Grund auf den ich alles übrige baute. Arbeit und Mist hilft da nichts wo nicht genug Grund, und dieser nicht gehörig gemischt ist; überall wo ich am nächsten an den Feldern Kieß fand, da grub ich auch ein und hatte so auf meinen Feldern hin und her mehrere Kießgruben. Aber was ersparte ich nicht auch an Knechten, Mägden und Taglöhnern? als mein Viehstand funfzig Stück enthielt, so hatte ich vier Knechte und drey Mägde, den ganzen Sommer und Winter hindurch, kaum vier Wochen zwey Taglöhner. Mein Getreideverkauf war also, sonderlich durch meinen Gerstenbau, allezeit ansehnlich; innerhalb sechs Jahren wurden auf die Art alle meine Schulden getilget, und ich hatte für mehr als funfzehn hundert Gulden Vieh nunmehr im Stalle. Dieß war nun also ganz gut, ich fand aber immer noch Verbeßerungen nöthig und möglich. Meine viele schöne Bäume,

mei-

meistentheils Birnbäume, zogen gleich beim Antritte meines Guths meine Aufmerksamkeit an. Die Obstsorten waren meistens zum Dörren, dazu mangelte mir aber Holz, dieses mußte ich kaufen, der einzige Fehler meines Guthes; ich entschloß mich also kurz, sie mit andern und nützlichern Obstsorten zu bezweigen, dieß Geschäfte hatte ich erlernt, ich lehrte es auch meine Knechte, und machte mich über meine Bäume nun nach und nach her. Ich lernte zwey vortrefliche Arten von Mostbirnen kennen, von denen der Most auch in den Weinländern das Fuder für dreysig, vierzig, funfzig auch sechzig Gulden öfters verkauft wurde, ein einziger Baum gab öfters ein Fuder, und diese Obstsorte versagte gar selten *). Als nun dieses im Verlauf etlicher Jahre geschehen, und ich auch unterdeßen mehrere Aepfel und Zwetschenbäume gesetzt hatte, so fuhr ich darinnen sonderlich in Pflanzung der letztern alle Jahre, wo ich nur Raum fand, fort, und wo diese Bäume unschädlich dem Getreidebau stehen konnten,

*) Diese Art Feldbirn ist in hiesiger Gegend zu Haus, und es stehen Pfropfreiser hievon Liebhabern zu Befehl.

da mußte einer stehen. So sahe es nun in den Lüften um meinen Bauernhof her, und so sollte es hersehen; denn ich denke, wenn ein Feld recht genutzt werden soll, so muß es in der Luft, auf der Oberfläche und unter dieser genutzt werden, Kieß, Wurzeln, Bäume, Getreide, alles war so meine Sache; doch noch nicht alles. Ich grub an sechs, nachher an zwölf Orten meiner Felder große weite Löcher, deren jedes fünf bis sechs Fuder Waßer zu halten im Stande war, diese ließ ich ringsum und auf dem Boden mit zähen Thon wohl feste schlagen und mit Steinen, die auch durch den Thon fest in einander verbunden wurden, ausmauern und belegen, sie wurden allemal eben da, wo ich sie bey regnerischen Wetter mit dem herlaufenden Regenwaßer zu füllen im Stande war, errichtet. Für solche erkaufte ich, wie ich schon von Anfang her gewohnt war, allen Tauben- Hüner- und Gänsemist, auch Asche und Kalk zusammen, meine im Hofe selbst gesammlete besonders dungende Abfälle brachte ich eben auch dahin, die Erde aus dem heimlichen Gemache ward auch dazu bestimmt, und weil ich diese letztere beynahe als das beste erkannte, und ich gewahr

wurde,

wurde, daß der Fallmeister in der Stadt, die nur eine halbe, oder drey viertelstunden ablag, die Sekrete reinigte und diesen an sich verächtlichen, aber sehr dungreichen Unflat in den Fluß ausschüttete, so bezahlte ich ihm das Fuhrlohn und ließ jenen des Jahres in meine Gruben einführen; durch lange Stangen wühlte ich öfters in diesen Gruben herum, und wenn ich nach Verlauf drey oder vier Wochen, sonderlich bey warmer Sommerwitterung hinlängliche Gährung vermuthete, so fuhren meine Knechte mit ihren Karren, die mit tüchtigen Fäßern belegt waren, herbey und führten diese Salbe auf die ihnen angewiesene Strecken hinweg. Meine Wintergetreideflur, nach der Aberndtung, noch ehe die Rüben gesäet wurden, bekam allezeit das ihre, und so auch jeder Fleck, wo ich es anzubringen in der oder jener Zeit etwa für gut fand. Nun kamen denn endlich auch mein Haus, die Scheune und die Ställe an die Reihe. Mehr auf die Güte meiner Ställe, als auf die Schönheit meiner Stube sehend, ließ ich diese vom Trog herab abhängend wohl pflastern, um dem Harn-Ablauf, und dem Vieh trockenes Lager zu geben; gleich hinter

dem Vieh ließ ich einen ebenen Gang mit Sandplatten hinlegen, und in die ersten Platten hinter dem Vieh einen offenen kleinen Kanal, acht Zoll breit und fünf Zoll tief, einhauen, durch diesen lief der Harn auf meine Miststätte stets aus. Bisher warf man die Fütterung hin in den Stall in einen Verschlag, und steckte, indem man solche im Arm trug, dieselbe dem Vieh in die hohen Rauffen; begierig nach dem Fressen, sahe es sich darnach um, riß da, dort weg, und streute es in die Streu, und oft geschah es dabey, daß es mit den Hörnern Knechte und Mägde sties und beschädigte; weg mit diesem wichtigen Fehler! Ich ließ also zwischen zwey Reyhen Vieh, welches gegen einander gestellt wurde, mitten durch dieselben einen geräumigen Gang machen, auf beyden Seiten stunden die Rauffen, und auf diese konnte nun die Fütterung von dem Gang aus, wo sie reinlich verwahret wurde, von jedem Kinde, ohne zu besorgendes Unglück oder Schaden nun aufgesteckt werden. Mein Stall erhielt, und zwar besonders der Ochsenstall, grosse Thüren, so, daß ein angejocht paar Ochsen bequem durchzugehen vermochte, denn meine

Ochsen sollten angejocht in und aus dem Stalle gehen. Geräumige Fenster, die auf und zugemacht werden konnten, ließ ich ebenfalls einsetzen, ein Vieh, so niemalen auf die Weide hinaus gehet, bedarf dieser Reinigung von der faulen Luft im Stalle zur Erhaltung seiner Gesundheit sehr nothwendig, eine durchstreichende Luft des Tages oder des Nachts ist Sommers und Winters sehr gut *). Aber die Miststätte lag an der Sonne, deren Stelle ich doch auf der Nordseite gerne gesehen hätte, eine Abänderung hierinnen war anders nicht möglich, als daß ich sie durch ein paar eingesetzte Linden- und Weidenbäume **) wider eine allzuheftige, zu viele

*) Die an vielen Orten, vorzüglich in hiesigen Bezirken gehenden Klagen: daß das Vieh verhext sey, rührt, so wie das öftere Verunglücken desselben, größtentheils, und ich glaube allezeit, denn weder dem Futter noch dem Wasser ist das mindeste beyzulegen, von dem Mangel an frischer reiner Luft her. Beynahe alle Ställe, die ich noch sah, sind so verdumpft, daß man vorzüglich zu früh bey dem Eröffnen derselbigen (eine Klage, die sehr viele Personen gegen mich äusserten) gleichsam betäubt wird.

**) Besser durch Pappelbäume.

Ausdünstungen verursachende Sommerhitze deckte. Meine Scheune hatte nun nicht mehr den Raum alle mein Getreide und alle meine Futterungen zu faßen, für die Wagen und Pflüge u. dgl. hatte ich keinen Schupf, sie stunden dem Sonnenschein, dem Regen, überhaupt der schädlichen Witterung ausgesetzt vielmal blos im Hofe, hier war nun nichts anders zu thun, als einen tüchtigen Anbau an die Scheune zu fügen, das that ich ohne Verweilen. Ich hatte vorlängst schon in meiner Scheune eine Schrotmühle, die ein Mann durchs Gehen auf einer runden Scheibe gar leichtlich in Bewegung setzen konnte, mit dieser Maschiene verband ich noch eine Gypsstampfe, einen Strohstuhl und dann auch zween Wörgeltröge zum Mosten der Birnen. Meine Gypsstampfe sties in vier und zwanzig Stunden sechzig Simri Gyps, mit meinem Strohstuhl schnitte man in einem Tage einen starken Wagen voll Heu und hundert Bundt Stroh, auf meinen zween Wörgeltrögen wurden in einem Tage zwey bis drey Fuder Most aus den Birnen gewörgelt; auf der Scheibe gieng nun ein Rind, und da ich deren viele hatte, so wechselte ich mit jedem nach einer jeden Stunde Arbeit allezeit ab. Bey den

Werken

Werkern selbst brauchte ich durchaus nur einen Mann, und wenn es viel war, bey den Börgeltrögen zwey, dann einen bey der Kelter, wo man die Birnen ausdrückte. Ich weiß nicht, ob ich irre wenn ich sage, daß auf jedwedem großen Hofe solche Werker sehr nützlich und nothwendig erbauet werden, ich denke es aber nicht, weitläuftige Oekonomien haben sie nöthig. So alles angeordnet, so gut als ich es wußte, schickte ich mich bey herannahendem Alter und den mannbaren Jahren meiner zu Bauern erzogenen zweyen Söhnen, denenselben meinen Hof zum Besitz zu übergeben. Drey Dinge hatte ich nun hierbey vor allem zu besorgen: 1) mein Hof mußte zu zwey gleichen Theilen unter sie vertheilt werden, 2) jeder mußte seine Felder alle an einanderliegend erhalten, 3) hatte ich, um zwey geräumige Wohnungen, für jedes Haushalten eine, zu haben, noch ein Haus und eine Scheune mit den benöthigten Ställen zu erbauen, ich theilte also mit meinen Söhnen das Feld ab, und noch unter meinem Besitze verwendete ich die Fluren in sechs besondere Abtheilungen, von welchen jeder Hof seine drey Theile erhielt. Das dritte zu heben war schwerer, unterdeßen da ich schon

viele Jahre an mein Bauwesen gedacht hatte und schon von fünf Jahren her Steine und Holz gekauft, gehauen, gegraben und herbey geführt hatte, so ward mir doch die Arbeit, meine Absicht in balden zu erreichen, gar sehr erleichtert. Meine Gebäude setzte ich mitten in die Güther des Hofes, etwas in die Anhöhe, um den Abfluß aus dem Hofe in einen daran angelegten Garten zu nutzen. Meine Söhne verlooseten ihre Häuser sammt den Güthern, heyratheten zwey Schwestern, Kinder frommer, stiller, fleißiger und sparsamer Eltern, und ich schlug ihnen ihre Höfe statt Heyrathsguth ohne einen Heller dafür zu begehren, frey und ohne Schulden als Eigenthum zu. Von allem und jedem hielte ich mir nun nichts aus als sieben oder acht Morgen Haide, die ich zum Hopfenbau von jeher bestimmt hatte; auf diese Einöde wollte ich zum besten meiner zween Söhne, denn jeder sollte nach meinem Tode die Helfte davon ohne Entgeld in Besitz nehmen, meine letzten Arbeiten verwenden. Meine Söhne verband ich, mir jährlich zwölf Malter Roggen, zwey Simri Erbsen, zwey Simri Hirsen, sechs Malter Hafer im Sacke, und dann Fütterung

und

und Streu zu vier Kühen zu geben. Ich zog, sobald meine Söhne verheyrathet waren, in meine in dem neuerbauten Hause errichtete geräumige einsame Wohnung. Mein Hopfenbau war nun das erste, für den hatte ich durch meine bedungene Haltung der vier Kühe gesorgt; ihr jährlicher Abfall war für ihn ganz alleine bestimmt, denn dieß Feld war auch mein Garten, folglich bedurfte ich sonst nirgends wohin einigen Dung. Ich dingte einen Knecht und eine Magd, der Knecht war allein auf meinen Hopfenbau bestimmt, und die Magd für das Haus und die Küche. Die acht Morgen Wüstenen mußten diesen Frühling noch besetzt, also bis dorthin Ellentief aufgegraben, von Buschwerk und allen Steinen wohl gereiniget werden, dazu brauchte ich sechzehn Taglöhner, mein Knecht war ihr Aufseher, doch wo es nur seyn konnte, war ich beständig dabey; vom Februar an bis in die Mitte des Aprils waren meine acht Morgen schon fertig, und nichts war noch übrig als sie nun zu besetzen. Ich will mich hierbey weiter nicht aufhalten; ich besetzte sie mit den allerbesten Sorten, und weitumher besetzte und besäete ich alles und jedes mit allerhand

Gemüse, welche da ausnehmend gut aufwuchsen. Dieser Hopfengarten war nun der Ort meiner täglichen Arbeit, meines Aufenthalts, mein Vergnügen und zuletzt mein sehr reicher Gewinn. Der Hopfen selbst geriethe da vortreflich; der Garten lag an einem Abhang frey vom Wasser, an der Sonne, nahe an der Stadt; ich hatte Gewinn von dem Hopfen, und tägliche Einnahme von Leuten aus der Stadt wegen dem Gemüse, welches ich in ungeheurer Menge unter allen Hopfenstöcken bauete. Ein Hopfengarten auf die Art einmal angelegt, bleibt bey guter Warte und Pflege funfzig Jahre im Stande, und kostet der Centner Hopfen heuer nur fünf Gulden, so kann er doch im künftigen Jahre schon wieder hundert Gulden gelten; keine Waare fällt und steigt im Preise so schnell, als der Hopfen; deswegen heißt er auch Hopfen, weil sein Preiß so geschwinde vorwärts wieder hopfet, als er rückwärts gefallen ist. Es ist also leicht möglich gute Preiße zu erwarten, dazu wird nichts weiter erfordert, als eine hinlängliche Anzahl Fässer oder Säcke, in welche er fest eingepreßt, und dann ein geräumiges Verdeck, wo er aufbewahret wird, wohlgepackt kann

er so zehn, zwanzig Jahre liegen. Noch eins! Ich hatte von jeher die Schaafe gehasset; ich weiß nicht, es war wohl nicht Naturfehler, es geschahe vielmehr durch eine stete Erinnerung verdrüßlicher Vorfälle, die aus den Schaafheerden erwuchsen. Mit einmal befragten mich meine Söhne, über die Haltung der Schaafe, unsre Weiber, sagten sie, hätten gar zu gerne Wolle, und eben deswegen gar zu gerne Schaafe; weil wir aber niemahlen einige gehalten haben, so denken wir immer, unser Vater möchte es aus guten Ursachen gethan haben; zu unserm Schaden Schaafe zu halten sind wir auch gar nicht entschlossen. Da wir eine etwas öde Strecke von fünf und zwanzig Morgen dicht an unsern Gütern, um ein sehr geringes Geld, für sechs hundert und fünf und zwanzig Gulden zu erkaufen, Gelegenheit haben, und unsere Weiber eine uns gut scheinende Art Schaafe, ohne Weide auf einem Kleefelde im Pferche zu halten und sie in Pferchen zu füttern, aus ihres seligen Vaters längst erprobten Fürgange vorgeschlagen, so wären wir doch, um den Hausfrieden zu erhalten, wenn uns der Vater seine Einwilligung nach seinen guten Einsichten ertheilte,

theilte, unsern Weibern zu willfahren gesonnen. Saget mir aber vorhero, antwortete ich, das ganze Verfahren ihres Vaters. Sie sagten, fuhren meine Söhne hier fort, ihr Vater habe auf zehn Morgen Kleefeld hundert Schaafe gehalten, diese zehn Morgen hat er zum drittel mit Luzerner Klee, und die übrigen zwey drittel mit dreyblätterichtem Klee besäet, öfters habe er lauter Klee von letzterer Sorte erzogen, gegen Ende des May habe er seinen Pferch, dessen Horden oben mit Raufen versehen gewesen, auf das Kleefeld gebracht, der Schaafknecht habe nun ein Stückchen Kleefeld, so groß als sein Pferch Raum bedürfe und eingenommen abgemähet, seinen Pferch da geschlagen, den Klee auf die Raufe gesteckt, und seine Schaafe in dem Pferche gehalten, in Zeit eines halben Tages habe er wieder ein solches Stückchen abgemähet, seinen Pferch wieder vorwärts dahin gerücket, den Klee aufgesteckt und die Schaafe wieder in dem Pferche verschloßen, so habe er es Abends spät in die Nacht und sehr früh wieder gethan, und so sey er alle Tage verfahren, damit sey der Klee über und über gedüngt geworden, und ehe noch die

zehen Morgen wären abgefüttert gewesen, sey der Klee schon wieder schöner als anfangs gewachsen. Die Schaafe habe man täglich zweymal zur Tränke getrieben, in den allerheißesten Mittagsstunden unter die Bäume in Schatten gebracht, Sommers hindurch, zwey auch drey hundert Schaafe nach und nach gemästet, seine Kleeäcker bestens gedungt, im Herbste besäet, und so gute Aecker, einen guten Erlöß aus den Schaafen und vortreffliches Getreide erhalten. Zu Zeiten habe er auch die Schaafe neben dem Kleefelde auf die Brachäcker gestellt und diese gepfercht. Söhne, sagte ich, ein Vorschlag wie dieser, von langer Erfahrung unterstützt, hat allen guten Schein. Ich rathe euch, kaufet die fünf und zwanzig Morgen Aecker, theilet sie in drey gleiche Theile, nachdem ihr ein drittel wohl gedungt habt, so besäet es jetzt im Frühling noch mit Gersten und Klee, die übrigen zwey drittel nutzet so gut ihr heuer könnt, künftigen Frühling besäet so den zweyten, und denn auf folgendes Jahr den dritten Theil mit Klee, reißt jedes Stück im Herbste zur Roggensaat um, kauft euch funfzig Schaafe, nicht mehr, denn allemal

muß man mit dem Kleinen anfangen und Versuche machen. Sie folgten meinem Vorschlag, und nun schon zehen Jahre sehe ich, daß die Schaafe gesund bleiben, frühe fett werden, daß der Acker fast überflüßig gedungt wird, und das fetteste Getreide in Menge erzeuget.

XI.

In welchen Fällen ist es nöthig, den Getreidebau und den Grasbau auf dem nehmlichen Strich Landes abzuwechseln, und wie muß dabey nach der Natur und Lage des Landes verfahren werden?

Die Fälle wo man eine Umschaffung der Aecker in Wiesen, und der Wiesen in Aecker vorzunehmen pflegt, sind folgende. 1) Wo es möglich ist die Wiesen in Aecker, und diese in Wiesen zu verwandeln. 2) wo diese Verwandlung der hohe Preis der einen oder der andern Fruchtsorte erfordert, 3) wo die eine oder die andere angebaute Sorte, auf eben dem Stücke nicht mehr recht fort will, und es 4) den Anschein gewinnt, daß bey der Umwechslung jede dieser Frucht- und Grassorten beßer gedeyhen werde. Das erstere betreffend: wo es für sich möglich ist die Umwechslung des Gras- oder Getreidebaues zu belieben, so kann es geschehen, wenn 1) die Strecken so liegen, daß der Pflug auf der Wiese gebraucht werden kann, 2) wenn die Wiese kein Sumpf, oder den Ueberschwemmungen nicht ausgesetzt ist. Ist die Wiese aber nur mit Steinen besteckt, so hindert dieses nicht, aus ihr den besten Acker, mit mäsigen Kosten umzuschaffen. In Rücksicht des zweyten Falles: Ist es nothwendig, die Verwandlung eines Feldstückes vorzunehmen, so ist es auch rathsam und nützlich,

denn es können Fälle eintreten, da wir mehr Wiesen, und Fälle da wir mehr Aecker bedürfen; die Gründe solcher Bestimmung sind diese: 1) wenn wir entweder nach den regelmäßigen Ausmeßungen der Verhältniße in der Landwirthschaft mehr Wiesen als Aecker, oder mehr Aecker als Wiesen haben; 2) wenn es der augenscheinliche Vortheil erfordert, alle Strecken, die zum Ackerbau geschickt sind, zum Getreidebau zu verwenden, und keinen Acker in Wiesenstücke zu verwandeln; auch wenn 3) ein Land, wie Holland oder Friesland, welches viel Sümpfe hat, nicht wohl zulaßen würde ein Sumpfland in einen Acker verwandel zu können. Bey dem dritten Fall muß man mit mir zwey Grundsätze annehmen, erstens: alle Geschöpfe bestehen aus Waßer, Erde, Salz und Oehl; zweytens: alle diese Geschöpfe haben ihre gewiße Maaße von diesem oder jenem, davon zeigt ihre verschiedene Gestalt und Farbe, ihr Geruch und Geschmack. Wenn nun ein Feldstück kein Wasser, Salz, keine Erde und Oehl hätte, so könnte auf demselben gar nichts mehr aufwachsen. Wenn es aber von einem Theil viel, von andern Theilen wenig besäße, so könnte wohl diese oder jene Fruchtsorte gedeyhen,

gedeyhen, eine andere aber würde darauf nicht fortkommen *). Würde man ein Land stets mit einerley Fruchtsorten besäen, so würden sie ihre specifique Bestandtheile zuerst wegnehmen, und endlich darauf gänzlich versagen, nach etlichen Jahren aber wieder aufgesäet, würden sie von neuen wieder fortschlagen, weil sich indeßen ihre Nahrungstheile wieder angesammlet hätten. Alles dieses folgt aus den zwey ersten Grundsätzen natürlich, und aus diesen will ich nun das dritte Hauptstück, so gut als möglich ist, beantworten. Die Abwechslung der Fruchtsorten ist also aus obigem eine unwidersprechliche Anforderung der ganzen Natur **)

*) Von allem diesen weiß der Chymicker und Mineralog, welche beyde doch das Erdreich schon so vielfältig zergliedert haben, nichts. Denn die öhlichten und salzichten Theile sind immerhin, findet man dergleichen auch in dem Erdreich — erstere eines und das nehmliche, und letztere nur sehr wenig von einander verschieden.

**) Wenn man die durch den Anbau verlohren gegangene Erdarten dem Felde wieder giebt, und Sorge trägt, das Unkraut zu vertilgen, so kann jedes Gewächs Jahrhunderte hindurch auf einem und dem nehmlichen Erdreich angebauet werden.

Ein Feld also, das die Bestandtheile dieser oder jener Pflanzen nicht mehr enthält, muß mit einer andern Fruchtsorte besäet werden. Woraus erkennet man nun diesen Zeitpunkt, wenn dieser Wechsel vorzunehmen seyn wird? er ist dieser: wenn sie nicht mehr gedeyhen. Es ist wahr, der Dung, die Luftsalze und Oehle ersetzen vieles wieder, doch gewiß nicht so vieles als zum guten Wachsthum der Pflanzensorten nöthig ist. Ich will dieses aus einem Gemüsegarten erweisen. Die Erfahrung zeiget wenn man viele Jahre aneinander Kohlraben und Wörsching auf einem Beete erbauet, daß diese Pflanzen nicht mehr gedeyhen, sondern absterben und faulen, man mag das Beet auch mit vielem und den besten Mist überdüngen *). Beyden zu rathen ist kein anderes Hülfsmittel übrig, als die Abwechslung auf

*) Man überführe aber ein dergleichen Erdreich mit kalkartigen Stoffen: mit Kalkmärgel, Märgel, Bauschutt, Gaßenerde ꝛc. mit Körpern also die weder Oehl noch Salze führen, so wird es seine vorigen Kräfte wieder erhalten.

auf Beeten. Diese Abwechslung mit allerley Früchten ist also eine ganz natürliche Pflicht aller derjenigen, die die Landwirthschaft mit Vortheil zu treiben gedenken. Sie soll ohne Unterlaß geschehen, und man soll nicht warten, bis die Abnahme des Wuchses sichtbar auffällt. Es sind wohl nicht alle Wiesen in Aecker, aber alle Aecker sind in Wiesen zu verwandeln geschickt. Eine Wiese welche sumpficht, oder der Ueberschwimmung ausgesetzt ist, nehme ich alleine aus, die übrigen alle müßten bald in Aecker, bald wieder in Wiesen verkehret werden. Der Vortheil hievon würde sehr groß seyn. Und wie gienge das an? Dieses Jahr würde ich gegen den Herbst mein ganzes Land, so zur Verwendung ein natürliches Geschick hätte, in 4 gleiche Theile abtheilen. In 1/4tel säete ich Korn, in 1/4tel Sommerfrüchte mit dreyblättrichten Klee besprengt, das dritte Viertel bekäme Kartoffeln, Turnips. Um Bartholomäi schnitte ich das Kraut zur Fütterung ab; nähme die Kartoffeln heraus, stürzte den Acker um, und säete mein Getreide. Kein Land muß an Getreide mehr abwerfen als ein Kartoffelland also genutzet, daß wenn man

in einem Jahr Erdbirnen und im künftigen Korn oder Gerste darauf bauet *). Unterdeßen nahet der Herbst heran, ich habe nun Klee auf 1/4tel meiner Felder, das Kartoffelland ist mit Getreide besäet, jetzt bemähe ich meine Wiesen schmal herum, und laße sie über Winter ruhen. Das 2te Jahr besäe ich das Brachfeld mit Hafer und Klee, die herumgeackerten Wiesen aber bestecke ich, nach geschehener Düngung, mit Kartoffeln. Das 3te Jahr wird das Kartoffelland Kornland, das Kleeland Kartoffelland, das Kornfeld Hafer- und Kleefeld, und das Haferland pures Kleeland **). Ich habe hieraus folgende

*) Die wilden Kartoffel, deren Anbau zwar hin und wieder von Obrigkeitswegen untersaget wird, überlassen schöneres Getreide als die guten, und das Stück Land, worinnen sie gestanden, zeichnet sich vor letzteren um ein ziemliches aus, da die guten, wie dieß der dritte Theil zeigen wird, mehr auflösbare Erdarten zu ihrer Nahrung bedürfen als die wilden, so ist diese Erfahrung leicht erklärbar.

**) Für diejenige Klaße von Oekonomen, welche nur so viele Feldgüter besitzen als zum Erbau ihres alljährlichen erforderlichen Getreides nöthig ist,

folgende Vortheile: 1) wechsle ich mit den Früchten fünfmal ab, 2) liegt mir nichts in der

ist, und denen also Klee, Hafer ꝛc. gleichgültiger ist als Getreide, will ich hier einen Vorschlag thun, für deßen guten Erfolg ich stehe. Gesetzt man hätte 4 Morgen Land, so besäe man im Spätjahr, nachdem man sich nach der 7oten Anmerkung des ersten Theils, mit deren Güte bekannt gemacht, und die Verbeßerungen hiernach mit Märgel, Kalkschutt, Ziegler- Seifensiederasche, Gaßenerde ꝛc. vorgenommen, 3 Morgen davon mit Winter Getreide, es sey nun Roggen, Spelz, (Korndinkel,) Weitzen ꝛc., den 4ten Morgen aber baue man im Frühjahr mit allen gebräuchlichen und benöthigten Wurzel- und Gartengewächsen, mit Kartoffeln, Kohlraben, Weißkraut, Wirsching, Rüben, Turnips, Bohnen, Zwibeln, Taback ꝛc. an; auf diese Weise fahre man ohne Anstand alle Jahre fort, so daß allezeit im 4ten, oder hat man nur 3 Morgen Aecker im 3ten Jahr das Getreideland zum Kartoffeln und Gemüseland aufbewahret werde. In dieser Periode nun, also alle 4 Jahre, wird ein Acker während dem Anbau dieser Gewächse nach und nach mit obig benannten Stoffen wohl überfahren, und in den folgenden Jahren allezeit entweder während, oder nach der Saat der Winterfrüchte, mit Gyps,

oder

der Brache, 3) bin ich im Stande beßer zu düngen, denn ich kann 4) da der Klee mehr als die beste Wiese abwirft, mehr Vieh halten, und 5) mein künftiges Kornland wird besser gearbeitet. Das was man mir einwendet ist dieses: 1) die Arbeit mit den Erdbirnen ist zu viel! Wie kann sie zu viel seyn, da sie, wie ich hin und wieder gezeiget habe, mit dem Vieh bis auf das Herausnehmen gethan wird? Arme Leute vollbringen dieses sehr geschwinde gegen das 10. 12te Maas. 2) der Klee ist sehr schwer zu dörren, und verliehrt im Dörren seine Blätter. Es ist wahr, wenn man ihn wie das Heu zu dörren gewohnt ist; der Klee muß aber anders gedörrt werden, so verliehrt er nichts von seinen Blättern. 3) Wie leicht könnte es geschehen, daß unser Kleefeld verfröre und wir also auf den Frühling keine Wiesen und Kleefelder mehr hätten? Besorgt man dieses, so säe man dreyerley Sorten Klee, der Esparset

oder Steinkohlen und etwas Haalbötzig gedüngt, hat man aber weder Gyps noch Steinkohlen, so nehme man gebrannten Kalkmärgel, Kalk, und alle 2 Jahre Haalbötzig, und gepochte Knochen und Klauen.

parset und Luzerner Klee verfrieret niemals, oder nur sehr selten. 4) Allein wenn alles Feld so benutzet wird, wo würde man die Schaafherrden füttern und weiden? Es bleiben den Schaafen auf und an den Bergen noch Strecken genug übrig, wo sie grasen, bis man zur Erndte das Feld wieder ableeret. Gesetzt aber dieses würde nicht seyn, so behaupte ich: es sey weit vortheilhafter die Schaafe gar abzuschaffen, und die Felder zu bauen, als Schaafe halten und die Brache begünstigen. Hundert Schaafe werfen höchstens 200 fl. ab, und können nicht von 100 Morgen Brachfelde leben; aber 100 Morgen gebauet müßen allerdings tausend Gulden jährlich tragen. Das vierte: wenn man Hofnung eines Vortheils bey der Abwechselung des Anbaues seiner Getreide, oder Grasorten gewinnen kann, so muß man diese Abwechslung machen. Hier aber hat man die Art der Erdgründe, und die Lage des Feldes vorher zu prüfen. Nach der Beschaffenheit des Erdreichs gerechnet kann jedes Land, die sumpfichte und die am Berge liegende Wiese ausgenommen in Aecker, und jeder Acker in eine Wiese vortheilhaft verkehret werden. Gesetzt eine Wiese hätte zu lockern oder zu schweren Grund, so ist bey dem Umbrechen derselben die Gelegenheit da, solche durch Märgel oder Sand in eine richtige Schwere zu setzen. Nun entstehen aber drey Fragen: 1) mit welchen Grassorten säet man die Aecker zu Wiesen? 2) mit

welchen Fruchtsorten werden die umgerißenen Wiesen, ein Jahr ums andere besaamet? 3) wie lange bleibt der Acker Wiese, oder die Wiese Acker? Auf die erste Frage zu antworten: halte ich dafür, daß keine Grassorten hiezu schicklicher sind, als die Kleesorten; entweder daß man sie jede besonders, oder sammt dem Raygras, aufsäet. Die zweyte Frage zu beantworten: ist ein Land sehr gut, so möchte es für das Korn im ersten, zweyten und dritten Jahr zu fett seyn, es wäre daher gut, dasselbe vorher mit Früchten, die sehr viel Saft *) brauchen, zu besäen, mit Weitzen, türkischem Korn, mit Gersten; ist der Grund aber mäßig gut, so kann das Korn nach den Kartoffeln sogleich aufgesäet werden **). Die dritte Frage: man kann die umgerißene Wiese, je nachdem der Grund gut ist, 3. 6 Jahre ohne allen Dung anbauen; so bald aber die Fruchtbarkeit mangeln will, wird es rathsam seyn, sie einmal zu düngen, sie mit Kleesaamen zu besäen, und Hafer, welchen man entweder zum Füttern oder zeitigen läßt, darunter zu sprützen. Genug, wie die Fruchtbarkeit der Felder für die eine Sorte abnimmt, so nimmt sie für die andere zu.

*) d. i. sehr viel auflösbare Erdarten, vorzüglich Kalkerde.

**) Wenn ein Feld nicht über 35. 40 Proc. auflösbare Theile führet, so wird es zum Kornanbau allzeit tauglich, ja unverbeßerlich seyn; doch der dritte Theil wird dieß näher zeigen.

XII.

Die
tüchtigste und wohlfeilste Zubereitung
des verschiedenen
Viehdungsmistes
in Absicht
auf die Verschiedenheit der Pflanzen und des Erdreichs.

Wenn ich von dem Dunge des Erdreichs und der Pflanzen reden soll, so ist allerdings nöthig die Natur dieser drey Gegenstände: des Erdreichs, der Pflanze und des Dunges zu erforschen, um das seine einem jeden zu bestimmen. Die Erde hat, so viel ich gelesen habe, noch keine passende Erklärung von irgend einem Naturlehrer, im abgezogenen Verstande betrachtet, erhalten. Ich zweifle auch, ob ich im Stande sey, dieselbe bestimmt zu entwerfen, wenn es nicht erlaubt ist, sie verneinungsweise abzufassen. Die Erde ist ein Körper der ohne Wasser, Salz, Oehl und Feuer betrachtet werden muß, der also weder Geruch noch Geschmack hat. So ist er in Abstrakto, in Konkreto aber ist er nie ohne Wasser, Oehl, Salz und Feuer, und folglich nie ohne Geruch und Geschmack. Bestünde irgend ein Gewächs nur aus Erde, so könnte es aus derselben seine Nahrung ganz allein erhalten; da es aber gewiß ist, daß auch nicht ein einziges Gewächs gefunden wird, so nicht aus mehreren Theilen,

als Erde, bestünde: so siehet man wohl ein, daß die Erde, wenn es viel ist, nur einen einigen Theil der Düngung aller Gewächse ausmachet. Daß die Gewächse alle aus mehreren Bestandtheilen als Erde bestehen, ist eine durch ihre Auflösung erwiesene Sache *). Man findet in ihnen Salze, Oehle und Wasser, Luft, Feuer und Erde, dahero wird kein Geschöpf ohne diese

*) Da wir den Gewächsen außer der Erde, den Metallen und einigen Salzarten, keinen der übrigen Bestandtheile zu geben im Stande sind, und die Erfahrung gelehret hat: 1) daß die Erde das gröβte Gewicht derselben ausmache, 2) daß in einem Felde, welches die erforderlichen Erdarten besitzet, ohne irgend einen Zusatz von salzicht- öhlicht- und mineralischen Dung, alle Gewächse fett und frech heran wachsen, und 3) daß ohne Erde keine Pflanze auch bei einem Ueberfluß von salzichten öhlichten Theilen gedeyhen könne; so ist man aus diesen und mehreren andern bereits angeführten Erfahrungen zu schliessen genöthiget, daß die Erde als eine ganz unentbehrliche Substanz, die übrigen angezeigten Bestandtheile aber als entbehrliche, als bloße Hülfsmittel, anzusehen seyen.

se sechs Dinge bestehen können *). Wer den Pflanzen also diese sechs Theile mittheilt, der giebt ihnen ihren nöthigen Dung. Wenn ich behaupte, daß auch die Erde einen Bestandtheil der Pflanzen ausmache, so verstehe ich hierunter die allerfeinste Erde, die fast bis auf das Einfache getheilt ist. Wie gar wenige und wie gar feine Erde sich mit den übrigen Bestandtheilen der Pflanzen verbindet, hat Helmont gezeigt. Er dörrte die Erde, wog sie, und setzte eine Weide von 5 Pfund in dieselbe, er vermachte den Zuber, begoß dieselbe immer mit Wasser, in 5 Jahren nahm er die Weide heraus, welche 169 Pfund ohne die Blätter gerechnet, die alle Herbst abfielen, im Gewicht hatte; er dörrte seine Erde wieder und es fand sich, daß dieselbe nicht mehr als 2 Unzen am

*) Erde, einige Salze und unter gewissen Umständen, Wasser, sind wir allein den Gewächsen zu übergeben fähig, Oehl aber, mehrere vegetabilische Salze, Luft, Feuermaterie und wenn wir auf das Ganze sehen Wasser, müssen wir der Natur, theils daß sie solche bilde, theils darreiche, überlassen und von ihr erwarten.

Gewicht verlohren hatte *). Ein deutlicher Beweiß, daß die Erde einen sehr geringen und viels

*) Nach der bereits angeführten Untersuchung des Hrn. Marggrafs führen 100 Quart Regenwasser, welches Helmont anwendete, 100 Gran Kalkerde. Da nun ein dergleichen Gewächs nach Herrn Bergmanns Erfahrung innerhalb 6 Monathen 1568 Schwedische Maas (a 5 1/2 Pfund) in 5 Jahren also 7840 dergleichen Maaße Wassers aufnimmt, und diese nach obiger Angabe 17725 Gran Erde führen, so ergiebt sich, daß durch das Wasser allein 14 Loth weniger 35 Gran Erde in die Weide gekommen sey. Nun liefern nach Herrn Bergmanns Versuchen, für deren Gültigkeit ich wohl keiner Beweise bedarf, 169 Pfund Weide nach dem Verbrennen 14 Loth Erde, mithin bleiben noch die abgegangene 4 Loth Erde, so wie die durch den Abzug des 5 Pfund schweren Setzlings abzurechnende 100 Gran Erde, welche erstere allerdings im Ruß, letztere aber in den abgefallenen Blättern zu suchen sind, übrig, und die Theorie gewinnt dadurch mehr als die entgegengesetzte. Denn können 4 Loth Erde in die Pflanzen eintreten, warum solte nicht bey denjenigen Gewächsen welche, da bekanntlich die Weide die geringste, Menge an Asche zurück läßt, mehrere Erde zur Bildung bedürfen, auch ein verhältnißmäßiges Gewicht derselben aufgenommen werden können?

vielleicht gar keinen Theil zu der Düngung der Pflanzen abgebe. Es müssen daher alle Theile der Pflanzen im Wasser im voraus schon liegen. Daraus erhellet zugleich, daß die grobe Erde die Vorrathskammer der Pflanzen nur allein seyn müsse. Die dichtesten Körper werden durch Wasser, Feuer und Luft entbunden, ihre Theile werden durch sie aufgelößt und ins Unendliche getheilt, dahero werden die Erde, die Salze, die Oehle ihrer auflösenden Kraft zu widerstehen nicht vermögen, sondern ihre Auflösung wird zur Nahrung für andere Körper sehr leicht erfolgen *). Ein Körper wird in eine auflößende Gährung gesetzt, wenn seine alkalische Theilchen mit den sauren Salzen der Luft gemischet werden, die darinnen enthaltenen Feuertheilchen müssen hiedurch in eine Bewegung gesetzt werden, welche die Körper zerreißen und theilen kann, kommt endlich das Wasser hinzu, so muß eine

*) Und die Ackererde, die so ganz der in den Gewächsen befindlichen ähnlich ist, die eins und eben das ist; diese soll, da man so große Wirkungen von ihr täglich siehet, und ihren Verlust unläugbar erfähret, nicht aufgelöset werden?

Subtilisirung nothwendig erfolgen. Der Mist ist mit alkalischen Salzen geschwängert, und die Luft mit sauren Salzen durchaus erfüllt *), gesetzt also daß diese beyde zusammen kommen, so muß die Gährung nothwendig erfolgen, tritt das Wasser hinzu, und nimmt diese aufgelößten Theilchen in sich, so müssen sie durch die Ausdünstungen des Alkohols in die Luft aufsteigen, sich da mehr reinigen und im Regen und Schnee wieder herab fallen **) sich an festere Körper anhängen, die Dungkraft derselben vermehren, und so die eigentlichen Dungsalze bilden. Es ist daher bey der Düngung eine Regel, die die Naturlehre an die Hand giebt: Man gebe sich Mühe die Dungkräfte, so viel nur möglich, in die Erde zu verschliessen, und sie den Pflanzen nahe zu legen, man

5) Von allen diesen, von den alkalischen Salzen des Mistes und den sauren Salzen der Luft, weiß, wie ich bereits erwähnte, der Chymiker so wie der Physiker nichts.

**) Wie salz- und öhlreich müßte nicht der Regen und Schnee seyn, daß Regen- und Schneewasser, das doch so geschmacklos, so arm an Oehl und Salz ist!

man erlanget dieß, wenn man die Regel beym Feldbau beobachtet, und dem Felde eine gehörige Schwere giebt. Ich habe den Dung in Wasser, Salz, Oehl und feine Erde hauptsächlich gesetzt, und ich werde dabey nicht irren. Genug, hieraus bestehen alle Körper, alles was ihre Bestandtheile vermehren kann, ist auch ihre Nahrung, ihr Dung. Da es eine durch die Erfahrung bestätigte Sache ist, daß die Natur keine 2 Dinge von einerley Beschaffenheit hervorbringt, deshalb die Bestandtheile von manchfaltiger Beschaffenheit seyn müssen, so würde man die Natur in ihrer Bearbeitung unterstützen, so man den Gewächsen die Speise vorsetzte, durch die sie sich sonderlich nähren. Die Versuche müßten ohne Zweifel so angestellt werden, daß man untersuchte: 1) wie vielerley die Bestandtheile der Pflanzen wären, 2) man müßte die Species der Generum der Bestandtheile entdecken, 3) man müßte erforschen, in welchem Maas jede Species gemischt in den Pflanzen angesetzt hätte, 4) und eben dieses müßte man bey allen Mistarten zu erfinden bemühet seyn, 5) sodann wären die Erdarten genau abzuwägen und ihre Kraft zu untersu-

chen. So lange dieses nicht vorangehet, so lange sind auch alle Vorschläge empyrisch, niemalen sicher erwiesen oder systematisch entworfen. Wüßte ich, daß der Klee aus vielen Salzen von dieser oder jener Art, und mehr aus Salz als aus Oehl bestünde, so würde ich mich, nicht ohne Vortheil zu ziehen, bemühen, meinen Dung mit dergleichen Salzen zu schwängern, so lange ich aber in dem ersten unerfahren seyn werde, so lange werde ich auch im zweyten niemal mit Gewißheit zu Werke gehen. Aber hier behaupte ich dreiste, daß eine vollkommene Erkenntniß hierdurch zu erhalten gänzlich unmöglich seyn müsse. Wir werden diese sehr feine Arbeit der Natur nie ausstudiren. Durch Feuer und durchs Auslaugen, wie viele der reinsten Theilchen werden nicht dadurch entgehen *)? Und wer wird im Stande seyn den eigentlichen Gehalt des gährenden Mistes zu bestimmen? dieß sind Geschäfte einer

*) Hier wiederhohle ich das, was ich bereits in einer der vorhergehenden Abhandlungen erwähnte, nehmlich, daß dem Chymicker nichts entgehet, und entgehen kann, wenn er genau arbeitet.

ner Weißheit zu der wir nie dringen, ihr Heiligthum blieb uns bishero verschlossen, und ich weiß nicht, ob ich glauben kann, daß jemals ein Mensch seyn werde, der es entsiegelt. Aber eben deswegen stehen wir auf dem Wege der Muthmassungen stille, und alle die Vorschläge in der Sache sind lautere Früchte purer Hypothesen! Man muß bey der Düngung auf 4 Stücke acht haben: 1) auf die Witterung, 2) auf das Erdreich, 3) auf den Dung, und 4) auf die Pflanzen. Das erste Augenmerk verdienet die Witterung, denn alle unsere Bemühungen, ohne daß diese sie unterstützet, sind vergebens. Man hat durch sie die Salze und Oehle, das Wasser und die feine Erde und die Auflösung aller äuserer Dungmittel; die Vorsicht allein hat sich dieses Hauptgeschäft zugeeignet und vorbehalten. Wir müssen also alle glückliche Erfolge unserer Arbeiten von ihr erwarten, und ihren Segen vorausgesetzt, können wir Plane entwerfen und glücklich ausführen *). Das Erd-

*) Wie vielen Einfluß die Witterungslehre auf den Feldbau habe, welchen Nutzen der Landmann durch sie erlangen, und wie vielem Schaden er

durch

reich fordert unsre Aufmerksamkeit auf. Aus dem schon beigebrachten ist ersichtlich, daß der beste Mist auf dem oder jenen Erdreich zu versagen gezwungen ist; ein allzulokeres, ein allzufestes Erdreich wird auch bey der besten Düngung den Vortheil nicht abwerfen, den wir zu erwarten im Stande sind. Der Dung ist in den wesentlichen Bestandtheilen allzeit einerley. Die Körper welche viel Salz und Oehl haben, denn an Wasser und feiner Erde mangelt es selten, sind zum Düngen die geschicktesten; aus dem Grunde ist der Dung der Taube, des Mastviehes, des Schaafes, des Menschen ꝛc. allzeit vorzüglich dungreicher, als der von dem Pferde, oder von dürrem mageren Vieh *). So ist es auch mit den übrigen Vegetabilien und allen andern Körpern beschaffen. Man muß, wenn man alles dieses zusammen verbindet, in der Düngungskunst nach

durch sie entgehen könne, dieß ist bishero sattsam entschieden worden, und es kann ein jeder Landwirth sich hievon selbst überzeugen, wenn er einzig und allein die Vortheile erwäget, welchen bey Saat und Erndte auch nur ein Barometer, ein Wetterglas bewirken kann, das ihm wenigstens einen Tag zuvor die Veränderungen des Wetters bestimmt anzeiget. Wie vieles Futter und Getreide sehe ich nicht schon allein in unserer Gegend zu Grunde gehen, das bey einiger Aufmerksamkeit auf das Wetterglas hätte können erhalten werden!

nach folgenden Regeln verfahren: 1) ihr müs-
set, damit die eigentliche Dungkraft im Was-
ser, Schnee und Thau mit dem Erdreich
leichter verbunden werde, solches öfters herum
arbeiten, 2) der Natur durch euren Fleiß zu
Hülfe kommen, und allem Felde mehrere Be-
standtheile der Gewächse ertheilen, 3) ihr kön-
net mit Mistsorten, die wenige Salze und
Oehle enthalten, Gewächse die aus wenig Salz
und Oehle bestehen, genug düngen **) Ge-
wächse aber 4) die fett und oehlicht sind,
müsset ihr mit dem fettesten Dünger nothwen-
dig versehen, und 5) wenn ihr euren Dung
aufführet, so müßt ihr ihn sehr bald unter die
Erde bringen, und euren Saamen und eure
Pflanzen alsobald aussäen und pflanzen. Den
Viehdung oder Mist auf die wohlfeilste Art zu-
zubereiten ist das letzte so ich bearbeite. Wenn
man wohlfeil düngen will, so muß das Erd-
reich vorhero wohl zubereitet seyn, hierauf be-
dürfen wir des Dunges nicht viel. Der Dung
der der beste ist und nur so viel kostet als der
schlechtere, ist der wohlfeilste. Der Dung der
der beste ist, und in der Zubereitung mehr ko-
stet als der schlechtere, erhält doch seine Wohl-
feile

*) Ich wiederhole hier das was ich hin und wie-
der schon oft sagte: die Pflanzen, das Erdreich,
die Einstreu und das Futter des Viehes bestim-
men die Güte und Wirkung des Dunges.

**) Und wie heißen diese und ihre Dungmittel?

feile gegen diesen wie der seine Theure gegen jenen. Aus diesen unwiderlegbaren Wahrheiten wünscht man sicher die wohlfeilste Zubereitung des besten und nicht des schlechten Dungs. Die Natur giebt uns den besten Dung, dieses ist der Mist von den lebendigen Geschöpfen; wollen wir ihn in Wohlfeile haben, so müssen wir 1) dasjenige lebendige Geschöpf welches den besten, und 2) den meisten guten Dung macht, und am wenigsten zu erhalten kostet, wählen, 3) wir müssen die Dinge damit verbinden die viele seiner Bestandtheile ansaugen: Stroh, Holz, Erde, Rasen, Aeste von Föhren, Tannen, Fichten, und 4) wir müssen so wenig Theile von dem Miste umkommen lassen als möglich, diese aber entkommen durch Regen und durch die Ausdünstung, um diesen allen zu entsprechen, ist man dahero bedacht, a) daß die Mistlache von Zeit zu Zeit auf die Aecker und Wiesen geführet werde, und zwar dieß allein und allemal bey regnerischer Witterung, b) daß der Mist so gut als möglich vor der Sonne und dem vielen Regen verwahret werde, man legt dahero die Miststätten allezeit gegen Norden an, und deckt sie mit Bretern zu c) daß der Ausguß aus der Küche, und was sonst im Hauße abgehet, dahin gebracht werde, und d) daß öfters der Staub von allerhand gestossenen Steinen, die Erde auf der Gasse ꝛc. zu solchem gebracht werde.

XIII.

XIII.

1.

Noch etwas vom Gyps, aber auch das Letzte.

2.

Streit über die Würkungen des Gypses mit der wohllöblichen Sächsischen Gesellschaft zu Leipzig.

3.

Vorschlag, wie das Getreide, welches öfters in der Erndte aus mancherley Zufällen häufig ausfällt, gleich dem sehr nützlichen Johannis-korn genutzet werden könne.

4.

Gedanken über den schartigen Roggen und tauben Dinkel oder Spelzen.

XIII.

I.

Noch etwas von dem Gyps, aber auch das Letzte.

Das Ausserordentliche, aber auch bisher nicht ganz Erklärte noch Begreifliche der Wirkungen des Gypses auf Aeckern, Wiesen und Gärten, verursachet immer mehrere Verwunderung, es reitzt jeden, mehr zu untersuchen und zu wissen: woher, und wie doch diese Wirkungen entstünden? Es setzt auch manche, da sie die Art und Weise der Wirkungen nicht einsehen, in ein Mißtrauen und Vermuthen, daß er zuletzt dennoch könnte schaden und versagen. Man sagt: Vielleicht zieht er alle Dungkraft aus dem Erdboden heraus, macht ihn ganz unfruchtbar, kraftlos und sogar zu einer Wiederherstellung ganz unfähig, und wäre dieß nicht, wer weiß ob nicht das Gras oder die Früchte durch dessen Dungkraft hervorgebracht tödtend

oder

oder schädlich sind, und wie leicht kann es geschehen, daß das Rind- oder Schaafvieh unter der Fütterung oder auf der Weide manche Theilchen des Gypses mit einfrißt, und dadurch seiner Gesundheit schadet, wer stehet uns da Bürge? Diesen furchtsamen Landwirthen zu gute, so viel ich auch für die Unschädlichkeit des Gypsdungs schon gesagt habe, habe ich folgendes gesammlet, in kurze Beweise gebracht, und mich überwunden, das immer zu schreiben was ich schon geschriebenhabe, um das Alte durch das Neue zu erklären und zu empfehlen. Der Gyps kann kein Land aussaugen oder von seiner ihm eigenen und schon vorher besessenen Dungkraft ausleeren.

Erster Beweiß.

Auf einem schweren ohnehin guten Boden hat er auf alle Frucht- und Grassorten wenig oder gar keine Wirkung, folglich muß er, weil er da, wo er Nahrungstheilchen im Ueberfluß vorfindet, keine ausziehet, seine Dung-

kraft

kraft nicht im Ausleeren des Erdbodens von den natürlichen und eigenen Dungkräften äußern *).

Zweyter Beweiß.

Der Gyps äußert gar keine Wirkung auf einer schattigten oder nassen Wiese; zöge er die Dungkräfte aus der Erde, und übergäbe er von daher solche denen Pflanzen, so wäre es ihm hier leichter möglich als auf dürren Gegenden **).

*) Dieses stimmt mit dem was ich bishero von der Wirkungsart des Gypses sagte überein. Wo die Erdarten nehmlich in gehöriger Menge vorhanden sind, da ist der auszeichnenden Wirkung des Gypses, die zwar eben so wie auf schlechtem Lande, nur wegen dem hohen Grad der bereits vorhandenen Fruchtbarkeit unmerkbar statt hat, ein Ziel gesteckt.

**) Wenn der Gyps auf nassen Wiesen sich unwirksam oder gar schädlich zeiget, so ist hieran entweder dieses Schuld, daß die darauf stehende Gewächse ihn nicht zur Nahrung bedurften oder aber, daß seine durch die Feuchtigkeit erzielte allzustarke Auflösung durch ihr Uebermaas Schaden verursachte.

Dritter Beweiß.

Der Gyps ist aber von ausserordentlicher Wirkung auf dürren ganz magerem Erdgrunde, wo niemals einen Zoll lang Klee oder anderes Gras gewachsen ist: hätte dieser Erdgrund Kräfte in sich gehabt, so hätte er auch in gutem Graswuchs seine Kräften äußern müssen, da er aber das nicht thut, so muß er keine Dungkraft in sich gehabt haben, hat er aber keine in sich gehabt, so konnte auch der Gyps aus ihm keine herausziehen. Der Gedanke ist also falsch, daß er ein Land jemahls werde verderben, ausleeren oder entkräften. Aber doch hat das aus dem Gypsdunge gewachsene Gras von den schädlichen Gypstheilchen in sich? Möchte man sich doch bescheiden natürlicher zu denken! Es zieht kein Gewächs das an sich, so seiner Natur nicht gemäß, oder mit seinem Urstoffe nicht eins ist; und gesetzt auch, es zöge dasjenige so Gift wäre an, so würde es augenblicklich oder nach und nach verderben. Wie aber da, wenn das Schaaf oder das Rindvieh auf den Weiden den Gyps der aufgestreuet ist, wie er ist, einfräße, würde dieser Gift etwa

nicht

nicht schaden? Wer sagt denn, daß der Gyps Gift sey? Wer hat es noch erwiesen? Und wie viel würde denn ein Schaaf, ein Rind des da verstreuten Gypses einfressen? etwa des Tages, wenn es recht viel ist, eine Handvoll. Sollte aber doch das Feld bey gar keinem andern Dung als dem stetigen Gypsaufstreuen versagen, und wenn das wäre, was alsdenn zu thun? Kein Mensch, der je, nach meiner Lehre vom Gyps, den Gyps auf Wiesen gesäet hat, kann leugnen, daß solche 2. 3. 4 mal mehr als ohne Gypsdung je an Heu und Grummet getragen und abgeworfen haben. Daraus folgt ganz natürlich, daß er vermöge dieses Ertrags 1. 2. 3. 4 mal mehr Vieh, als er zuvor hielte und ernährte, zu halten im Stande ist. Ist dieses unstreitig gewiß, so macht er auch 2. 3. 4 mal mehr Dung als zuvor, folglich kann er auch 2. 3. 4 mal mehr mit Miste düngen. Er verfahre nunmehro denn also. Er dünge die Wiesen das erste Jahr mit Gyps, das andre mit Mist, wechsle alle Jahre ab, so wird es ihm gewiß keinesweges fehlen, noch werden

seine Wiesen jemals versagen *). Mit dem Acker thue er auch also: man dünge ihn nur alle 6 Jahre mit Mist, da man sonst alle 3 Jahre, ehe man Gyps streute, düngen mußte, und glaube allen Einwendungen nur so lange nicht als man bemerket, daß ich die Wahrheit gesagt habe **). Ueberall fängt man an den Gyps-

*) Man überlasse den Aeckern und Gärten allein den Mist, und dünge die Wiesen mit Erden und Salzen: mit Märgel, Kalk, Seifen-, Ziegler- und Pottaschensiederasche, Kalkschutt, Steinkohlen, Gyps, Haalbötzig, Eisensteinen, Dornschlag, Weinhefen, Mistjauche (Gülle). Denn die in dem animalischen Dung vorhandenen salzichten Theile sind unzureichend, den Futter-Gewächsen, welche ein ungleich größeres Gewicht feuerfester Salze besitzen als jene, die erforderlichen Salze alle zu geben.

**) Da die Gewächse nicht aus Gyps allein, sondern auch aus mehreren Erdarten und salzichten Theilen bestehen, so muß man auch bey dem Gyps, wie bey allen Dingen, Maas und Ziel halten, und von solchem weder zu viel noch zu wenig, und diesen nie allein sondern vermischt, mit Kalk, Märgel ꝛc. alle 2. 3 Jahre freygebig ausstreuen.

Gypsstein für Kaufmannswaare zu erkennen, die Herrschaften sprechen die Gypsbrüche als ihr eigen überall an. Ich weiß Gypsbrüche die von Herrschaften von 100. bis auf 1000 fl. in jährliche Pachtung überlassen sind; ich kenne Herrschaften die jeden Wagen voll Gyps unter 1 fl. 30 kr. bis 2 fl. nicht aus dem Lande lassen; selbst aus unserm Lande werden jährlich dem hundert und tausend nach Wagen damit beladen, und überall hin auf 12. bis 15. und mehr Stunden weit und breit verführet.

Mich setzet dieß in Ruhe!
Postea sunt utiles urbi.

2.

Streit über die Wirkungen des Gypses mit der wohllöblichen Sächsichen Gesellschaft zu Leipzig.

Der Herr Recensent der Anzeige von der Leipziger Societät in der Michaelis-Meße 1774. in der Berlinischen Allgemeinen deutschen Bibliotheck 1. St. des 29. Bandes p. 291. hat mich zum Streit wider die Anzeige, daß der Gyps weder dünge

noch die Felder verbessere, gerufen; — Da bin ich! und — ich möchte mich, um bald wieder abtreten zu dürfen, gar zu gerne nur der Worte des Turnus außer dem Zusammenhang ganz allein bedienen:

En agros et quam bello Trojane petisti
Hesperiam metire jacens!

Aneid. XII. 359.

Ihr Herren von der Widerspruchspartey, warum wollt ihr über die Wirkung des Gypses noch streiten. Sehet doch die Aecker an und durchgehet ganz Deutschland, gehet über seine Gränzen hinaus, saget was ihr da, wo man den Gyps als Dung auffstreuet, sehet! — Gebt euch zufrieden!

Allein ich sehe wohl ein, daß weder meine Gegner, noch der auffsehende Landwirth mit diesem kurzem Auftritt vergnügt ist, sey es also, daß ich mich etwas weiter noch einlasse!

Gründe der Sächsischen Gesellschaft wider die Wirkung des Gypses als Dünger *).

»Bey dem allgemeinen Beyfall, den die vom Herrn Pastor Mayer in Kupferzelle zuerst in

*) Da dieser Aufsatz sehr weitschweifig ist, so habe ich ihn so wie den der Meißner Provinzial Versammlung ins Enge gezogen.

in Vorschlag gebrachte Gypsdungung, durch ihren guten Einfluß auf das Wachsthum des Grases, des Klees, der Esparsette und anderer Gewächse sich erworben hat, sind der Societät dennoch Gründe vorgeleget worden, nach denen sich Naturlehre und Chymie vereinigen, dem wahren Gyps alle Wirkungen gänzlich abzusprechen. Ist derjenige Gyps, der bishero mit so gutem Erfolg ist angewendet worden, wirklicher Gyps, nehmlich eine mit Vitriolsäure völlig gesättigte Kalkerde, und nicht vielmehr ein Gemisch von Gyps und Kalkerde: so ist die Untersuchung der Ursachen ihrer Wirkungen und des Widerspruchs, den hier die Erfahrung der Theorie giebt, gewiß einer der wichtigsten Gegenstände, den sie ihren geehrtesten Mitgliedern empfehlen kann *). Zu welchem Ende sie

*) Statt aller Beweise, daß der Kupferzeller, so wie der mehreste zur Düngung angewendete Gyps ein reiner von ungesättigter Kalkerde freyer Körper sey, führe ich hier aus dem Leipziger Intelligenzblatt An. 1776. die von der Gesellschaft selbst über diese Frage eingerückte Nachricht an, sie lautet also: "In der am 23 May gehaltenen Versammlung der Leipziger Oekonomischen Societät,

auch diese ihr wider die Wirkung des Gypses sowohl von einem Dresdner Mitgliede, als von der Meißner Provincial Versammlung gemachten Zweifel, denselben hierdurch bekannt machen will. Gyps ist in allerley Betracht ein zum düngen unfähiger Körper. Alles was düngen soll, mußgeschickt seyn, in der Erde solche Veränderungen zu leiden, als zum Wachsthum

cietät, hat ihr insonderheit die von dem Herrn Verwalter Walther zu Mönchswalde über die Wirksamkeit des Gypses angestellte Erfahrung denen wider die Wirkung des Gypses in den Michaelis Auszügen vom Jahr 1774 bekannt gemachten Gründen sowohl als auch denen unter verschiedenen Umständen mit dem Gyps angestellten Versuchen eines erfahrnen Oekonomen widersprechend geschienen, und da die von dem Herrn Verwalter eingesendeten Gypsproben nach ihrem Verhalten mit Säuren nicht die geringste Portion eines beygemischten Kalkes, dem man diese Wirkung zuschreiben könne, gezeigt, und dadurch die Außeinandersetzung dieser Widersprüche desto schwerer gemacht haben, so sey sie darauf bedacht gewesen, die fernere Untersuchung dieses Gegenstandes den Herren Mitgliedern der ersten Klasse zu empfehlen.

thum der Pflanzen erfordert werden. Alle Gewächse erfordern zu ihrem Wachsthum Wasser, Fett, Salz und eine feine Thier- oder Pflanzenerde *), je verhältnißmäsiger diese Stücke da sind, desto besser gedeyhen die Gewächse. Die Fäulniß ist das grosse Mittel, welches jene zum Wachsthum aller Gewächse erforderlichen Nothwendigkeiten unaufhörlich schaffet. Die Fäulniß löset die Thiere und Gewächse bis zum innersten auf, entbindet **) ihr Salz und ihre Fettigkeit, und gebiehret eine feine Thier- und Pflanzenerde, welche zum Wesen der Gewächse unentbehrlich ist ***). Was die Fäulniß zerstöret, verbindet die Natur wieder und bildet allerley Gestalten. So macht das durch die Fäulniß erzeugte flüchtige alkalische Salz, die öhlicht fettichten Theile zu

*) Ist diese denn aber von der des Mineralreichs verschieden?

**) Zerleget, wollte wohl der Herr Verf. sagen!

***) Die Erzeugung der Erde gehet wider alle chymische Begriffe und Erfahrungen, ausgeschieden wird sie, nicht erzeugt.

einer Art Seife *), sonst könnten sie in die feinsten Haarröhrchen nicht eindringen. Was auf gleiche Art in der Erde nicht wirket, kann als Dünger nicht angesehen werden. Der Kalk, diese Hervorbringung der Seethiere **) ist hier-

zu

*) Daß die öhlicht fetten Theile durch die Fäulniß zerleget werden, dieß ist längst entschieden; die Bildung einer Seife fällt also weg. Wie konnte ein Chymiker dergleichen Dinge reden!

**) Woher erhielten aber wohl diese die Kalkerde? bildeten sie solche aus nichts, oder überkommen sie dieselbe aus dem mit Kalkerde beynahe gesättigten (es verstehet sich der Eigenschaft gemäß) Meerwasser, und den in Menge vorhandenen Kalkfelsen? daß viele Kalksteine aus Conchylien gebildet vorhanden sind, dieß bestreite ich nicht, selbst unsere Gegend zeuget hiervon, allein ist man eben daher, besonders da diese Kalkerde außer einigen ihr beygemischten heterogenen Theilen ganz derjenigen entspricht, welche in den Felsen derjenigen hohen Gebürge enthalten ist, die wohl nie die Meeresfluthen bedeckten — auf eine Erzeugung und Schöpfung dieser so einfachen Erde, welche in so unermeßlichen Massen, und in so großer Menge in allen Theilen der Welt vorgefunden wird, zu schließen berechtiget?

zu vorzüglich geschickt, er löset sich in die feinsten Theilchen, die in großer Menge (!) ins Wasser treten, und demselben die Durchsichtigkeit und Farbe lassen *). Der Kalk ist vorzüglich geschickt diese öhlichten Theile **) in ein seifenhaftes Wesen zu verwandeln, mithin düngt er wirklich. Die Säure hindert den Wachsthum und das Gedeyhen aller Gewächse ***), der Kalk hingegen ziehet die Säure vor allen an sich, er verbindet sich mit derselben, und macht ihre ätzende Kraft denen feinsten Haarwurzeln unschädlich. Der Märgel der auser Thon, Sand ꝛc. auch Kalk bey sich hat †), thut dieses nach Verhältniß, und kann deshalb als

*) Wie sehr umgebet hier nicht der Herr Verf. die chymischen Wahrheiten, Kalk soll auflösbarer seyn als Gyps, der doch nur die Hälfte des zur Auflösung der Kalkerde erforderlichen Wassers verlangt.

**) Die nicht vorhanden sind.

***) Welch eine Säure meynet wohl hier der Herr Verf. im verfaulten Miste?

†) Eine schöne chymische Beschreibung des Märgels!

als Dünger betrachtet werden, und Gyps, dieser seinen erdichten Theilen nach, aus lauter Kalk- oder Seethiererde bestehende Körper sollte dergleichen nicht thun? nein, er thut es nicht. Wenn Kalk durch Vitriolsäure gesättiget wird, so entstehet Gyps; diese neue Hervorbringung, der Gyps, lößet sich roh gar nicht auf *), denn das allgemeine Auflösungsmittel, die Säure der Luft kann ihm nichts anhaben, da er mit derselben schon gesättiget ist **). Die rohe Gypserde kann

*) und doch findet man ihn beynahe in jedem Quellwasser!

**) Welch eine Säure der Herr Verf. hierunter verstehe, dieß ist schwer zu errathen! Meynet er die fixe Luft, so giebt er seine Schwäche in der Chymie sattsam zu erkennen; denn diese wird allezeit bey Entstehung der Mittelsalze durch die Säuren ausgetrieben. Verstehet er aber hierunter die Vitriolsäure, so fehlet er doppelt, denn was würde wohl aus der freyen Kalkerde werden, wenn sich die in der Luft vorhanden seyn sollende Vitriolsäure mit ihr verbände? Ich denke wohl Gyps, und zwar ein Gyps von welchem man sich dann (die Vitriolsäure in der Luft vorausgesetzt,) weit weniger zu versprechen haben würde, als von dem

kann also in die Haarröhrchen nicht eindringen *), und weder unmittelbar noch mittelbar etwas zum Wesen derselben beytragen **). Zubereiteter Gyps hat durch die Hitze nichts als Wasser verlohren, er bleibt dahero, gesättiget mit seiner Säure, ungeschickt das Seifenmachen der Fettigkeiten zu befördern, ja er wird gar zu einem Stein, wenn hinlängliche Feuchtigkeit ***) darzukommt, und verdienet um deßwillen nichtsweniger, als den Namen des Düngers. Wollte ein Freund der Gypsdüngung sagen: wenn auch der Gyps nicht eigentlich als ein Dünger wirket, so hält er doch die Feuchtigkeit lange an sich

dem bereits vorhandenen, denn dieser würde, da Gyps bekanntlich von dieser Säure auflösbarer gemacht wird, sogleich von ihr angegangen und dadurch aufgelöset werden, da andern theils die Kalkerde erst in Gyps verwandelt werden muß.

*) Roh, ohne Wasser allerdings nicht, so wenig als die Kalkerde; denn Steine von Pfunden und Centnern schlichen wohl nie in die Haarröhrchen ein.

**) Ein treflicher Schluß!

***) Und keine Erde?

sich; so antworte ich kürzlich folgendes: je dichter ein Körper ist, desto länger hält er die Feuchtigkeit an sich. Alle Kieselsteine haben gleiche Eigenschaft *), sie haben sie noch weit vollkommner, sie sind eher aller Orten, und noch überdieß wohlfeiler zu haben **), man dünge also die schweren Aecker damit ***), oder an deren statt mit grobem Kiese †). Der Gyps kann endlich den Boden nicht milde machen da er schwer ist ††), die Witterung mag ausfallen wie sie will. Der Kalk hingegen, der sich so gar roh d. i. ungebrannt, in grossen und kleinen Stücken nach und nach an der Luft und in der Erde auflöset, lieget nicht ruhig bis er die alleräuserste Staffel seiner möglichen Auflöslichkeit erreichet, oder er ziehet vielmehr die

*) Das war doch wohl nur im Scherz gesagt?

**) Welch ein landkundiger Mineralog!

***) Dieß gienge aber ja schnurstracks der alten Theorie entgegen, Schweres mit Schweren zu vermischen.

†) Von welcher Art?

††) Abermal aufs genaueste abgewogen!

die Feuchtigkeit aus der Luft an sich *), löset sich dadurch, und daß er immer feucht ist, auf, und wird selbst, und macht andere mit ihm verbundene und durch ihn erzeugte Körper geschickt in die Gewächse einzugehen. Der Märgel thut ein gleiches nach Verhältniß des beygemischten Kalks. Uebrigens ist und bleibt es gewiß, daß faulende Gewächse und Thiere die besten zum düngen sind." Anmerkung: Da das übrige des Aufsatzes andern Inhalts war, und weder zum Vor- oder Nachtheil des Gypses gereichte, so übergieng ich es als nicht hieher gehörend. Die von der Meißner Provincial Versammlung wider die Wirkungen des Gypses als Dünger angeführten Gründe sind folgende: "Der rohe oder ungebrannte Gyps, welcher entweder los und mürbe, oder als ein Stein gefunden wird, ist, wenn er vollkommen ist, nach den Erfahrungen unauflöslich **). Wird der Gyps gebrannt,

*) Daß der Kalk Feuchtigkeit aus der Luft an sich ziehe, dieß ist eine dem Herrn Verf. zugehörende neue Entdeckung.

**) Daß der Gyps unter die erdichten Mittelsalze gezählet werde und dahero auflösbar sey, dieß habe ich bereits im ersten Theil angezeigt; 1 Theil

brannt, so läßt sich zwar derselbe im Wasser auflösen, es kann aber solches nicht anders als durch das Kochen, und zwar mit 40. 50 Theilen Wasser gegen einen Theil Gyps gerechnet, geschehen. Ziehet man diese Erfahrungen in Erwägung, so muß man bey genauerer Anwendung derselben bey der Gypsdüngung auf die Gedanken kommen, daß der Gyps weder bey der Düngung der Felder noch der Wiesen einen besondern Nutzen leisten könnte. Wendet man ein, daß es viele Körper gebe welche vermittelst der Kunst nicht aufzulösen sind, und die dem ohngeachtet in der Erde mit der Zeit verwittern, und also eine Art der Auflösung erleiden, so ist erstlich aus der Erfahrung darzuthun, daß der Gyps eine solche Veränderung leidet, und denn, wenn er sie leidet, ist die Zeit bedarf 4. 500 Theile Wassers zur Auflösung. Würde er, würden die Erdarten auflösbarer seyn, welch ein trauriges Loos wäre nicht das unsrige! statt milder, wohlschmeckender Gewächse hätten wir ungenießbare steinichte, statt sanfter Leinwand steife unbrauchbare Fasern, und darben müßten wir endlich bey dem größten Ueberfluß! wie weise handelte also hier nicht die Vorsehung!

Zeit zu bestimmen, binnen welcher derselbe solche erlitten hat. Sagt man: die Rede sey nicht von ungebranntem sondern gebranntem Gyps, so dienet zur Antwort, daß zur Veränderung eines gebrannten Gypses, wenn er anders eine erleidet, eine Reihe von Jahren erfordert werde*), und daß hievon also keine geschwinde Düngung zu erwarten. Sagt man, daß der Gyps von der in der Luft befindlichen Säure eine Auflösung leiden könne, so erinnere man sich, daß ein vollkommen gesättigter Gyps in keiner Säure aufgelöset werde. Führet man aber Erfahrungen an, daß stark gebrannter Gyps in Säuren auflößlich seye, so wird hierauf folgendes geantwortet. Ein stark gebrannter Gyps verliehrt durch starkes Kalcinirfeuer etwas von der Vitriolsäure, und es wird hierdurch ein geringer

*) Wer hat's denen Herren denn gesagt, daß die Auflösung des Gypses erst nach einer Reihe von Jahren geschehe? die Erfahrung, die Vernunft etwa, oder eine Offenbarung selbsten? Ich sage aus Erfahrung und Wirkung: der Gyps muß innerhalb etlichen Wochen so verwittern, daß er die so weit und breit zugestandene Wirkung thun kann, denn sie erfolget in so wenigen Wochen unläugbar. Es muß möglich seyn, weil es so ist.

ringer Theil von der Kalkerde frey *), wenn man aber bedenket, daß diese freygewordene Erde einen geringen Theil ausmacht, so wird man gewahr werden, daß der Nutzen von einem solchen Gyps bey weiten nicht so zu erwarten ist, als der Nutzen einer völlig freyen Kalkerde ist. Wer wollte aber alsdenn sagen, daß der Gyps diesen Nutzen geleistet habe. Räumet man dieses ein, so fragt sichs billig, warum man mit mehreren Kosten durch den Gyps eine Düngung suche, die man weit wohlfeiler durch die Kalkerde, und noch dazu ungleich gröſſer erhalte? Sollten dem ohngeachtet alle angeführten Gründe einen Oekonomen, der blos auf Erfahrung dringt **), nicht überzeugen, so ist

*) Nicht durch die Stärke des Feuers (denn diese vermag beym Gypse nichts,) sondern durch den zufälligen Beytritt der Kohlen wird, weil hierdurch eine Schwefelleber entstehet, die Vitriolsäure von der Kalkerde, oder diese vielmehr von jener, entbunden.

**) Wer kann und wird denn aber, wenn die Erfahrung, wie hier der Fall ist, ganz anders redet als die Theorie, so blindlings dergleichen Macht-

ist nöthig, daß derselbe beweise, was für eine Art Gyps gebraucht werde, indem bekannt ist, daß Gypssteine gefunden werden wovon ein Theil in dem Säuren sich auflösen läßt ꝛc.

3.

Vorschlag, wie das Getreide, welches öfters in der Erndte aus mancherley Zufällen häufig ausfällt, gleich dem sehr nützlichen Johanniskorn genutzt werden könne.

Es war jederzeit ein betrübter Anblick, wenn ich auf dem Boden der abgeerndteten Wintergetreidefluren eine so grosse Menge Körner bemerkte, welche von Vögeln, Mäusen aufgefressen, oder aber von Schaafen, Schweinen ꝛc. zertreten wurden; ich stand oft und sann nach, wie da zu helfen wäre, daß entweder das Getreide die Körner in seinen Schalen behalten, oder

 doch

Machtsprüchen beystimmen? Was Hundert und Tausende, die es auch zuvor nicht glaubten, sahen und bestätigten, das gilt doch wahrlich mehr als alle Demonstration dieser Art.

doch ein Vorschlag geschehen möchte, durch dessen Befolgung dieser Getreide-Verlust zum Gewinn werden könnte. Dieser mein Wunsch hat mich verpflichtet nachzudenken, und jetzt da ich neben den erlangten Erfahrungen meine Gedanken bekannt machen zu dürfen glaube, so will ich beydes dem Publikum zur weitern Ueberlegung überlassen. Der bekannte häufige Ausfall des Sommer- und Wintergetreides wird durch verschiedene Ursachen bewirkt: da schon, wenn diese Früchte noch nicht ganz gezeitiget sind, verursachen heftige Winde, den Ausfall dadurch, daß sich die Aehren an einander schlagen, hierbey leiden der Weitzen und die Gerste am meisten, noch mehr aber wenn diese Früchte zeitig oder überzeitig sind. Solche Ueberzeitigungen geschehen vor der Erndte aus mancherley Zufällen: erstlich, wenn der Landmann zu lange anstehet Erndte zu machen; zweytens, wenn in der jetzt zu besorgenden Erndte ein anhaltender Regen mit untermischtem Sonnenschein entstehet; drittens, wenn das Getreide abgeschnitten auf dem Acker lieget, anhaltende Regen erfolgen, und es öfters herumgeleget werden muß; viertens, wenn

wenn man sich weigert, statt der Sichel den Korn- oder Haferrechen zum Aberndten zu nehmen, und fünftens, wenn die Schnitter oder die wegnehmende mit dem Getreide zu plump verfahren. Weiß man nun die Ursachen, welche diesen Ausfall bewirken, so weiß man wohl auch die Mittel solche zu verwehren: man thue die den Ausfall bewirkende Ursachen hinweg, so erfolget die Wirkung wohl nicht mehr. So weit ganz gut gerathen! allein nun auch weiter! — da fehlt es wieder! wer will die Witterungen, so wie man sie wünschet, schaffen? wer die Mäuse und Vögel verscheuchen und fangen? da ist der Mensch zu unvermögend. Doch ich will sagen wie ich es meyne: erstlich, nicht eine Fruchtsorte wie die andere fällt gerne aus, der Roggen unter allen am wenigsten, weiß man nun dieß, so säe man, wo man kann, mehr Roggen als sonst was, und ist Gefahr des Ausfallens da, so nehme man die Früchte, die zum Ausfallen vorzüglich geneigt sind, von dem Acker zuvor weg, oder hat man Gelegenheit, so säe man das zum Ausfall geneigte in Gegenden, wo es wider stürmende Winde mehr

Schutz hat, und streue den Roggen da hin wo dieser mangelt. Die Westwinde sind allezeit heftiger, wirbelnder als die andern, man säe also die Früchte, welche gern ausfallen so, daß sie gegen Westen hin Schutz, Berge, Bäume, Hecken, Gebäude ꝛc haben, so wird der Verwüstung doch in etwas gesteuert. Zweytens, es ist wohl wahr, daß wenn der Bauer seine Erndte übereilt anfängt, er sich durch eine zu frühe Erndte in offenbarsten Schaden setzet, sein Getreide schrumpft ein, ist leicht und nicht Mehlreich. Doch sage ich auch dieß, daß eine zu weit hinaus verschobene Erndte eben so schädlich werden kann. Ich sage noch mehr: ich wollte lieber, daß der Landmann seine Erndte etwas zu früh als zu spät anfienge, die Ursache: drittens, denn so man bey der Erndte im Anfang schon die ganze Härte der Körner erwarten wollte, so würde das Ausfallen am Ende nothwendig erfolgen. Diesem Aufenthalt zu entgehen, sollte man die Menge der Schnitter vermehren, oder welches noch besser wäre, den Haferrechen durch den ein Mäher mehr als vier Schnitter abmähet, wählen und

nehmen *). Viertens, durch eine also abgekürzte Erndte würde auch dem Schaden am Dinkel vorzüglich und wenigstens zum Theil vorgebeugt werden. So würde fünftens bey geschwinder gehender Arbeit in der Erndte das Getreide nicht lange auf dem Feldboden liegen bleiben, und also durch den Regen nicht so leicht in Gefahr des Ausfallens versetzt werden, welches denn auch sechstens in Absicht auf das Ungeziefer sehr rathsam und gut wäre. Würde siebentens der Haferrechen statt der Sichel gewählt, so würde man das Ausfallen des Getreides im Hinwegnehmen um die Hälfte vermindern. Man mache die Probe mit der Sichel und dem Haferrechen, so wird man sehen, daß auf den ersten noch halb so viel aufkömmt als auf dem zweyten. Achtens, man halte die Schnitter und so auch die Mäher stark an, so-

 wohl

*) Der Vorwand, daß der Haferrechen nur auf Aeckern könne angewendet werden, wo das Getreide und die Früchte sehr dichte stehen, ist grundloß. Man forsche nach, und man wird auch ohne bewaffnete Augen sehen, daß die dünne stehenden so wie die verworrenen Früchte leicht und gut können von dem Felde abgemähet werden.

wohl beym Wegnehmen, als Umwenden, Auf-sammlen, Aufladen nicht so plump und rasch zu verfahren; sie werden dadurch sehr viele Körner erhalten, welche sonst auf dem Felde zurück-bleiben. Doch mit allem diesen ist noch nicht ganz gerathen, je nachdem die Zufälle, das Ohngefehr erfolget, je nachdem werden auch wenigere oder mehrere Körner auf dem Felde zurück bleiben. Meine Idee eines Vorschlages: „Möchte man doch dieses auf den Verlust da liegende Getreide alsogleich unterpflügen, und von demselben entweder nur auf den Herbst eine grüne Fütterung für das Vieh bereiten, oder auf künftigen Sommer eine gute Erndte erwarten, die doch einträglicher ausfallen müßte, als die, welche man, so man künftigen Frühling den Acker mit Hafer besäete, einsammlen würde, seyn könnte!“ So oft ich aber bey mir den Wunsch selbst that, so oft ich ihn auch den Landleuten äuserte, so konnte ich doch lange keinen Landmann bewegen ihn mir zu gewähren, bis endlich einer meine Gedanken doch annahm, und in der Stille meinen Vorschlag befolgte. Ich gieng wohl oft im Frühling bey dem Acker vorbey, und glaubte einen Stoppelfrucht-Acker, das ist, ei-

nen solchen zu sehen, den manche Bauern, wenn das Wintergetreide darauf abgeerndtet ist, umstürzen, düngen, zwey dreymal pflügen und ihn wieder mit Wintergetreide besäen; allein ich betrog mich, es war wirklich ein Acker, auf welchem der Besitzer nach der Erndte eine große Menge ausgefallenen Roggen und Dinkel bemerkte, ihn also wie ich wünschte herumpflügte und eine ganz gute Erndte einerndete. Er verfuhr dabey also: gleich nach der Aberndtung hielt er die Viehhirten und die armen Leute, oder welches bey vielen eben das ist, die Faullenzer von seinem Acker ab, stürzte nun den Acker, welcher Mittelfeld war, herum, überführte nach tüchtigem Beegen die Hälfte mit Dung, breitete ihn obendrauf aus; die andere Hälfte bestreuete er mit Gyps und erwartete nunmehro Regen und Keimen. Drey Tage giengen kaum hin, so erfolgte der Regen, das Getreide gieng auf, und bis etwas über die Saatzeit hinaus, hatte er einen Acker voll des dichtesten Saamens, den schnitt er ab, fütterte ihn auf und überließ so zuletzt seinen Saamen der Vorsicht; er grünte im Frühling schön auf, und die Erndte auf diesem Acker stellte sich

10 Tage vor der Erndte des später gesäeten Feldes ein. Er der Bauer und ich selbst verschliefen einen so glücklichen Erfolg vielleicht dieserwegen, weil ein solcher Ausfall des Getreides in so grosser Menge nachher einige Jahre nicht mehr erfolgte. Das vergangene Jahr aber, da wir 1775 einen so starken Wetterschlag hatten, den ich sogleich erzählen werde, und so viele Bauern das ausgeschlagene Getreide unteracketen, auch eine sehr gute Erndte davon erhielten, wachte ich abermal auf und wünschte beynahe ein solches Jahr, um mit mehr Genauigkeit jenen Versuch wiederholen zu lassen, aber Gottlob! es erfolgte nun nicht *).

Der

*) Ich höre Klagen in der Nähe und Ferne, Klagen die von mißlungener Nachahmung reden, die den Vorschlag verwerfen, und ihn als unbefolgbar erklären. Allein welch ein Unrecht üben sie nicht hierdurch aus! nicht der Vorschlag, (denn dieser ist befolgbar und nachahmungswürdig,) sondern die schlechte Güte ihrer Felder, der Mangel, nicht an Dung sondern an gehöriger Erdenmischung, erzielte ihre Klagen. Ein gutes Feld, das reich an den erforderlichen Erdarten ist, oder ein Feld mittler Güte, wird wenn man kurz vor dem Herumstürzen dasselbe beym Korn, Gerste

und

Der verdienstvolle Herr Kammerrath (jetzo Hof- und Kammerrath) Braun, der ein lehrreiches Muster für jeden Kammerrath seyn kann, der seinen Fürsten und den Unterthanen schon in mehreren Fällen die besten Proben seiner Aufmerksamkeit auf ihre Vortheile gegeben hatte, schafte mir auf der einen Seite das, was mir auf der andern bisher abgieng, hier lese man seine Nachricht an mich.

P. P.

Euer ꝛc. ist das große, auch den hiesigen herrschaftlichen Hof Lipfersberg total betroffene den 4. Julii 1774 eingefallene Hagelwetter, bekannt. Die Winterfluhr auf diesem Hof hat, hochherrschaftlicher Intention nach, völlig umund die häufig auf dem Felde gelegene, obschon nicht völlig zur Reife gediehene Frucht, untergeackert werden sollen. Von sothaner Flur wurde

und Weitzenanbau, mit kalkartigen Stoffen, Gyps und etwas Haalbötzig, bey dem Dinkel (Spelz,) Einkorn ꝛc. aber neben den kalkartigen und salzigten Dungmitteln auch thonigte Körper beysetzet, jederzeit die Güte und Vortreflichkeit des Vorschlags bestätigen.

de aber aus Eigensinn des Hofbauern, der durchaus nicht glauben wollte, daß eine Frucht davon hervor und zur Perfection kommen könnte, nach einigem Zaudern, und nicht wie es befohlen war, nur ein Drittel mit Verdruß und nicht mit gehörigem Fleisse umgeackert, und er hätte wohl keine Hand angelegt, wenn ich nicht nach einer achttägigen Abwesenheit selbst Anstalt mit mehreren als denen Hofpflügen gemacht, und die hohe Willensmeynung zu exequiren gesucht hätte. Eine eingefallene Dörrung, und dieses, daß die Schaafe schon einmahl über die Feldung gelaufen, sistirte das weitere Umackern, und es verblieb bey ohngefehr 6 bis 8 kleinen Morgen, jeden zu 180 Ruthen à 12 Schuhe, davon ein Theil den gehörigen Fleiß im Eggen nicht bekam. Die Feldung grünte, wie die so aus der Brach angesäet worden, und andere reizte das veranstaltete Umackern zur Nachahmung. Wäre es dem Hofbauern nachgegangen, so würde diese umgeackerte Feldung im Frühling, da der Saame etwas abgestorbener aussah, als der andere, wieder umgerissen, und das Feld mit Sommerfrüchten besäet worden sey, gleich es viele zu

ihrem

ihrem Schaden gethan haben. Man ließ aber den Saamen stehen, wachsen und zur Zeitigung gelangen. Wo das Umackern und Eggen mit Fleiß und gehörigem Bedacht geschah, stand die Frucht eben so schön und dicht, als in ordinärer Winterflur, und man sammelte 28 Schober (à 60 Garben) und 21 Garben gute reife Frucht, von welcher 67 Malter (à 9 Sri. dieses à 20 bis 25 Pfund) und 1 1/2 Sri. erdroschen worden, da, wenn gleich nach dem Wetterschlag der Pflug eingeschlagen worden wäre, es wohl und gerne noch zweymahl so viel gegeben haben würde. Ingelfingen, den 20. Febr. 1776.

J. B. Braun.

P. S.

Euer ꝛc. wollte ich noch melden, daß ich den nach dem Wetterschlag erwachsenen Dinkel allein schütten, allein gerben, nach Hof mahlen lassen, und daß er nicht nur reichlicher im Gerben an Kern, sondern der Kern auch das schönste Mehl gab. Die in Lipfersberg wohnenden Unterthanen haben dem herrschaftlichen Exempel gefolget, und nicht minder eine doppelte Winterernde vorigen Sommer erhalten, welches sie

nur

nur gestern auf hiesiger Kammer abermahl dankbarst gerühmt haben. Füge ich noch an, daß die Umackerung auch unter dem Präterte: die erschlagene Frucht sey noch nicht reif, erschweret werde ꝛc. Es ist wahr, es war der 4te Julius, da der Wetterschlag geschah, man schneidet auf diesem Hof gemeiniglich erst im August, mithin war die Frucht noch nicht reif, aber auch dieser Zweifelsknoten hat sich durch den schönen Wuchs gehoben, da, wo mit Fleiß gepflüget wurde. Ingelfingen, den 21. Febr. 1776.

Braun.

Gleiche Versuche wurden mit gleichem Glücke in den angränzenden Gegenden gemacht, und Sommer- Winter- und Hülsenfrüchte größtentheils gerettet. Ich schliesse nun aus diesem allem und aus dem Anbau des Johanniskorn, welches eigentlich nichts anders als gemeiner Roggen ist, der gleich nach Johannis gesäet und nicht lange nach Johannistag im folgenden Jahr wieder geerndtet wird: so kann der Roggen so früh, und also früher als der ausgefallene, und nach Jacobi erst untergepflügte fortwachsen, und gewährt

währt auf das folgende Jahr dennoch die allerbeste Erndte, eine Erndte so gut, ja vielfältig noch eine bessere an Körnern und Geströh, als nach der gewöhnlichen Weise gesäet; so kann auch dieser zu eben der Vollkommenheit aufgrünen und fortwachsen. Es kommt ja nur darauf an, daß man seine rechte Behandlung geschickt auswählt, und das lohnt sich der Mühe allerdings. Man hat bey uns lang nicht geglaubt, daß die Gerste die kalte Witterung, vielweniger den Winter vertrage; unsere Bauern säeten alle ihre Gerste erst kurz vor Johannisfeyertag ein; ich säete sie mit dem Hafer, sie gerieth allemal sehr gut; endlich säete man sie im Herbst mit dem Getraide, auch da hielte sie sich den Winter hindurch gut; und man hat schon ganz grosse Aecker mit solcher besäet, die sehr guten Gewinn giebt. Ich könnte immer noch mehr dergleichen ausgeartete Gewächse hinzuthun: man hat Sommer- und Winterreps, Sommer- und Winterroggen u. s. f. Alle diese Gewächse sind von einerley Art und nur durch Versuche etwas an der Natur verändert und anders. So sehe ich öfters was die Lage eines Landes auf die Zeitigung vermag. Die Entfernung von uns bis in das Anspachische zur Altmühl, beträgt

etwa

etwa 12:14 Stunden Wegs; öfters säet man bey uns den Hafer schon ein, wenn dorten noch Schnee liegt, und doch im Herbst, wenn man bey uns an die Aberndtung des Hafers nicht gedacht hat, ist er dort schon in die Scheune gesammlet *). Es ist daraus zuverlässig zu schliessen, daß sich die Gewächse in ihrem Wachsthum nach den Arten der Witterung richten, dieselbe so zu sagen beobachten, in was für einem Klima sie auch verpflanzet sind. Ich will mich nun aber hierbey weiter nicht aufhalten, man hat hievon mehrere Nachrichten, Abhandlungen, Erfahrungen. Ich will nur sagen, daß ich einsehe: 1) daß der Bau des Johanniskorns allgemein

*) Ein Unterschied, der diesem, obwohl in einer minderen Entfernung, nur von 2 Stunden, gleich kommt, zeigt sich in Ansehung der Saat und Erndte in Kupferzell und Ingelfingen. Hier gestattet die Wärme des Thals die Saat der Sommerfrüchte schon zu einer Zeit, in welcher es in Kupferzell noch unter 4 Wochen nicht daran zu gedenken ist; denn schon sind solche hier beynahe zum Schossen hoch erwachsen, wenn man erst auf dieser Ebene anfängt zu säen, und eben so gehet es mit der Wintersaat, welche hier um 2, 3 Wochen später geschiehet, und dennoch erndtet man zu gleicher Zeit.

meiner werden möchte, und 2) daß man das bey der Erndte öfters sehr häufig ausgefallene Getreide durch Unterpflügungen besser, als bisher geschehen ist, zu nutzen beliebt. Mein verehrungswürdigster Gönner, Herr Hofkanzler von Kaiser bey Fuld, hat mir die Art von dessen Anbau mitgetheilt, und zu seiner Ehre steht sie auch hier.

Versuchmäsige Anleitung, wie das sogenannte Johanniskorn anzubauen und zu benutzen ist.

1) Wähle dir ein zur künftigen Winterfrucht schon bestimmtes gutartiges Feld, dünge es wohl und bereite es, wie du es sonst mit deinem Winterfeld zu thun pflegest. 2) Um Johannistag bis zu Ende des Brachmonats ackere es endlich zum Säen; dann 3) nimm recht gut gesäubertes, von aller Trespe wohl gereinigtes, voriges Jahr gezogenes Winterkorn. 4) Fasset sonst ein gewähltes und bereitetes Feld oder Beet ein Maas Aussaat, so säe nur 3 Metzen schön gleich darauf aus, und egge dein Feld wie gewöhnlich. Merke hier, daß immer ein

Viertel Saamen weniger gesäet werden muß. 5) Ist dein Saame 6. 8 Zoll hoch erwachsen, so wird er abgegraßt, und grün verfüttert, dieses kann, nachdem es bis im Herbst bey günstiger Witterung schnell wieder wächset, 2. 3 mal geschehen. 6) Den Winter hindurch wird er wie die Wintersaat ohne weitere Sorge sich selbst überlassen. 7) Hat er im Frühling die 7, 8 Zoll Höhe wiederum erreicht, so kann er noch einmal abgegraßt und verfüttert werden, alsdenn läßt man ihn aufschießen. Die von diesem Versuch zu hoffende Vortheile sind folgende: a) du sparst ein Viertheil Saamens, b) du fütterst für dein Vieh 3. 4 mal grünes, c) du kanst nach dem Abgrasen ohne Schaden auf den Acker gehen, die Distel und andern Unkräuter ausstechen und das Vieh damit füttern, d) die Saamenstauden werden durch das Abschneiden so stark, daß ihnen keine böse Witterung im folgenden Frühjahre so leicht einigen Schaden thun kann. e) du wirst ehe mehr als weniger zu gleicher Zeit mit deinem Winterkorn erndten, und dein Stroh wird weit vollkommner als sonsten werden.

4.

Gedanken über den schartigten Roggen und tauben Dinkel oder Spelzen.

Tauben Dinkel oder Spelzen heissen wir diejenigen Dinkelhalme, deren sonst richtig geformte Aehren keine Körner enthalten, und also zum Theil oder ganz leer sind. Schartiger Roggen ist der Roggen dessen Aehren kornleere Räume oder Scharten aufwerfen. Es giebt Jahre, in welchen man beydes, schartiges Korn und tauben Dinkel neben einander vorfindet, und Jahre, in denen man diesen und jenes nicht antrift. Sie können in einem und eben dem Sommer, auf denselben Acker und Felde vorgefunden, in einem andern aber gar nicht angetroffen werden. Die Güte der Erndte hängt von diesem sehr viel ab, und kann durch sie schlecht und gut ausfallen; dem Landmann ist also der schartige Roggen und taube Dinkel eine der Aufmerksamkeit würdige Sache. Die Ursachen, durch welche jener zwiefache Schade an Dinkel und Roggen entstehet, sind billig das erste so wir zu entdecken uns bemühen. Man wird in dem Jahr, in dessen Frühlings-

lingszeit es vom April bis Anfange Julius öfters, und dabey doch erwünscht, regnet, gar keinen Taubdinkel vorfinden. In einem solchen Jahre aber, sonderlich wo es zu viel regnet, nimmt man dagegen eine Grasart, welche dem Dinkelstroh sehr ähnlich siehet, und Branddinkel heißt, gewahr; es geschiehet auch, daß sich wenn der Regen sehr rieselnd sachte herab tröpfelt, er sich so mit ans Roggengetreide anhänget, es beschweret und niederleget, und es also dadurch niedergedrückt vor der Blüte in einander liegen bleibt, daß die Roggenähren taub werden; am Dinkel, dessen Halme aufrecht stehen bleiben, wird man so bald etwas nicht sehen, und auch am Roggen, wenn weiter nichts hinzu kommt, keine Scharten vorfinden, wohl aber hier und da das Mutterkorn, (grosse unförmliche Körner,) wahrnehmen *). In einem

*) Alle diese und die in der Folge erwähnte Fehler und Mängel des Getraides rühren, wie dieses theils die Hebung derselben durch Kalk, womit man den Saamen anfeuchtet, theils die hier sogleich angeführten Erfahrungen beweisen, grösstentheils von dem Mangel an irgend einer der erforder-

einem Jahr aber, in welchem in der Zeit, da der Dinkel aufschiessen und denn blühen soll, der Regen ausbleibt, kalte Winde die Aecker sehr austrocknen, kurz, in einem Jahre wie das heurige 1780, da wird man wie gesagt den Taubdinkel allezeit in großer Menge antreffen; so fand man ihn heuer wohl nicht auf allen, doch auf sehr vielen Aeckern. Begierig zu wissen welche, suchte ich ein ganzes Feld durch, erforschte die Gedanken meiner Bauern, und zog auch aus andern Gegenden die möglichsten Nachrichten ein. Ich fand ihn auf allen den Aeckern, die ohne nöthigen Dung, ohne Märgel, ohne genugsamen tiefen Boden oder Erde zu haben schmachteten, doch fand ich ihn auch auf solchen die sehr wohl gepflegt worden, wo das Getreide sehr dichte stund, am meisten auf solchen Feldern welche eine rauhe, zu sehr gebundene braune, schwarze Erde aufhaben, und so

 wie

forderlichen zur Nahrung gehörenden Erdarten und der Feuchtigkeit her. Bey dem Roggen verursachet solchen der Kalk, und bey dem Dinkel, die Alaun- und Kalkerde. Man erforschet dieses durch Scheidewasser; starkes Brausen giebt nehmlich den Mangel an Alaun, und schwaches, den an Kalkerde zu erkennen.

wie ich ihn daselbst fand, so fanden ihn auch da meine Freunde. Wir haben überdies wahrgenommen, daß die Aecker welche im Herbst 1779. am spätesten besäet wurden, unter jenen Umständen am allermeisten dergleichen Taubdinkels zeigten. Wir sahen aber auf Aeckern weniger oder gar keinen, wenn solche Jahrs vorher Klee aufgehabt hatten und derselbe mit Gyps bestreuet worden war*); wo man wenige Jahre zuvor gemärgelt hatte **), nicht auf Aeckern die mit Dung wohl versehen, gepfercht und wohl gebauet waren, wo dabey das

*) Daß Gyps, der hier noch von dem folgenden Jahr vorhanden war, ein Bestandtheil des Roggen und Dinkels sey, dieß ist bekannt. Wenn ein Feld also, wie es sehr viele giebt, arm an Kalkerde ist, so kann dessen Erzeugung nicht von statten gehen, und es müßte nothwendiger weise ungünstige, das Wachsthum hindernde Witterung, sich zu diesem Mangel gesellen um diese Ausartung, durch die heterogene Nahrung erzielt, und durch den Mangel an Feuchtigkeiten bewirkt, entstehen zu machen.

**) Das in den vorhergehenden Anmerkungen Gesagte gilt auch hier.

das Gras nicht so dichte stand, und sonderlich da nicht wenn das Ackerfeld stark mit kleinen Steinen besteckt oder besäet war*). Wenn die Aecker im Herbste früh eingesäet wurden, wenn die Aecker weiß und Fruchtfeld waren. Einiger von diesem Taubdinkel auf jenen Aeckern hatte gar keinen Ansatz zu Körnern; einige Aehren hatten dergleichen Ansatz, allein er war mager, schrumpfte zusammen und gab kaum ein halb großes Korn**). Alle solche Aehren aber

*) Auch diese, die ganz aus Kalkerde bestehen, gewähren neben der Feuchtigkeit, die sie erhalten, etwas Nahrung. Nahrung, die der fallende Regen von ihnen wegnimmt.

**) Alles dieses zielet auf Mangel. Man halte die Aehren der auf den fruchtbarsten Feldern gewachsenen Früchte mit den von mittelmäßigem Felde zusammen, und man wird finden: a) daß die Kornähren von letzterem kaum die Hälfte der Körner enthalten, als die von ersteren, und b) daß bey dem Dinkel 1) sehr viele unvollkommene leere Saamenbehälter, und 2) in jedem derselben statt 3. nur 2 Körner vorhanden seyen. Eine Unvollkommenheit die leider mehr als allzuviel zu sehen ist, und welche 10. 15 Körner Verlust für jede Aehre verursachet.

waren bis auf den Boden, Anfang des Julius, schon weiß und gleichsam ganz abgezeitiget. Dieses alles ist Erfahrung und Thatsache, von der man die Ursache nun anzeigen soll. Die wirkende Ursache oder der Hauptgrund war nichts anders als die allzugroße Trockne. Es ist ganz der Natur angemessen gedacht, wenn man das Wachsthum des Halms und des Korns aus dem Saft erkläret, dessen Feuchtigkeiten aus Wasser, Oehl und Salz durch die Wärme zubereitet werden. Beym Mangel des Regens und der Wärme aber muß gedachter Saft mangeln, der Halm im Wuchse zurückstehen, folglich die Erzeugung des Korns in der Aehre versagen. Warum aber ist nicht aller Saame so taub? warum nur auf mehr oder weniger Stücken kornleere Aehren? Wenn es erlaubt ist in einem Gleichnisse zu reden, so kann ich mich hierauf ganz kurz erklären: wer unter vielen am ersten zu Tische kommt, ißt sich satt, wer zu spät kömmt, da die Schüsseln schon leer sind hungert allerdings; so giengs auf Aeckern von wenigem Dunge, so bey denen, die die Feuchtigkeiten bald verfliegen ließen, so bey denen welche spät

besäet wurden, so da wo das Getreide dichte stand. Ich wundre mich nicht, daß man auf andern Feldern, welche anders behandelt wurden, einen Unterschied bemerkte, es läßt sich erklären: Aecker die gut gedüngt, gemärgelt, oder vorher mit Klee bewachsen und begypst worden waren, hatten weniger oder gar keinen Taubdinkel. Es ist ohne allen Streit wahr, daß sich die Feuchtigkeiten aus dem Regen in dem modernden Miste allezeit am längsten erhalten, ist dieß, so wirds begreiflich, warum man auf solchen Aeckern, wenn das Getreide anders nicht gar zu dichte stund, keinen Taubdinkel vorfand. Der Gyps mag wirken wie er will, so ist es gewiß, daß ein Feld mit solchem überstreut immer mehr bethauet und feuchter ist als ein anderes, das bemärgelte Feld erlangt durch den Märgel seine benöthigte Schwere, und verliehrt die Feuchtigkeiten weniger als ein zu leichtes. Dieses machts also begreiflich, warum man auf solchen Feldern wenig oder gar keinen Taubdinkel antrift. Begreiflich ists, daß auch auf den bestens besorgten Feldern, wenn das Getreide auf denselben sehr dichte stehet, Taubdinkel vorfindlich sey, und da nicht gesehen werden

kann, wenn sie in keinem Uebermaaß ebewachsen sind. Unerklärbarer möchte es seyn wenn man auf steinigten Aeckern bey aller der Trockne doch gar keinen Taubdinkel anträfe, sollte man da nicht glauben, daß die Steine, von der Sonne stets beschienen, hitziger würden als andere Körper, und nicht hieraus die häufigere Verflüchtigung der Feuchtigkeiten zu folgern, das Recht haben? So scheint es allerdings, und doch sahe man sich dabey allerdings irre. Sey die Witterung noch so heiß, so wird man doch unter jedem Stein, den man aufhebt, noch Feuchtigkeiten antreffen. Getreide, welches im Herbst 1779 früher gesäet wurde, wuchs vor der eingefallenen Trockne schon vorzüglicher und früher auf; das Erdreich hatte dadurch mehr Schatten, und da sich auch die Aehren früher ansetzten, so war es kein Wunder, daß, da noch Nahrungssäfte vorhanden waren, der Dinkel Nahrung und Körner gewann. Soll ich hiebey und aus diesen Ereignissen einen Vorschlag zu Abwendung eines Schadens aus dem erzeugten Taubdinkel ertheilen, so werde ich ihn, der Natur zufolge, auf folgendes einschränken. Man säe das Wintergetreide im Herbst eher zu

früh,

frühe, als zu spät, man entgeht dadurch der Gefahr, welche eine bald einfallende Kälte anzurichten im Stande ist; der Saame schosset im Frühjahr; der Boden hat seine Winterfeuchtigkeiten noch, wenn sich die Aehren formen und blühen; die Wärme ist noch nicht so heftig sonderlich da, wo das Land mit dem schon aufgeschossenen Saamen bedeckt ist. Gewiß aber dieß zu bestimmen, ist eine ohnmögliche Sache. Gewisser rathet man an, wenn man rathet: die Aecker an Dung nie mangeln zu lassen. Märgel, Gyps, aufgestreut oder aufgeführt, werden das nehmliche gewähren.

Mir ist noch übrig, etwas vom schartigen Roggen zu sagen. Der schartige Roggen entsteht, wenn die Körner sich nicht ansetzen, oder wenn sie sich angesetzt haben, wieder wegfallen; beydes kann geschehen. Das erste, wenn die Blüthen versagen, dieses erfolgt aus dreyerley Ursachen, 1) dadurch, daß die Aehren, wenn sie kaum etwas aus dem Schafte herausgeschossen sind, verfrieren; 2) dadurch, daß heftige Winde hin und her die hervorkommende Blüthen,

ehe

ehe noch der Saamenstaub zu fliessen Vermögen hatte, wegblasen und abschlagen; und 3) dadurch, daß in dem Augenblick, da die Blüthen nach und nach herfürtreiben, Kälte erfolgt oder auch Sonnenregen fallen. Das zweyte: daß die vollkommensten Körner, öfters die schon gezeigten Körner, hin und her aus den Aehren wegkommen, erfolget: 1) durch Kieselwetter, wenn nehmlich die Kiesel ganz klein fallen; 2) durch heftige Sturmwinde, wodurch die Körner ausgerieben werden. Aus diesen Zufällen wird man sehen, daß beynahe menschliche Klugheit zu schwach ist, etwas darwieder zu vermögen. Es ist hier gar nichts zu sagen, als etwa dieß noch: Die Engländer halten die lebendigen Einfassungen ihrer Felder für nützlich; ich gestehe es ihnen in keiner als in dieser einzigen Absicht zu, daß dadurch die Sturmwinde etwas gebrochen werden, und ihre größere Kraft verlieren. So ist die Sache des Branddinkels und Brandroggens, der Flederwische, des Mutterroggens, der Trespen ꝛc. beynahe auch. Das Entstehen des Branddinkels und Roggens schreiben einige gewissen Insekten zu; es ist aber sicher ein Erfolg

des

des in der Blüthe gefallenen Regens *). Warum aber, da der Regen auf alle Aehren fällt, bekommen sie nicht alle den Brand? Ich antworte: daß ja auch nicht alle diejenigen Pestbeulen bekommen, die in einer Stadt leben, wo die Pest wüthet. Allerley Umstände treffen da zusammen, die einige erhalten, andere tödten. Der Mutterroggen mag aus dem Stich gewisser Insekten, die ihn anstechen, wenn er noch zart ist, entstehen; er mag nun aber erwachsen, wie er will, so kanns doch Niemand verwehren; zum Glück kommt er aber selten in Menge und schadet wenig oder gar nichts. Flederwische und Trespen sind Gewächse auf schlechten nassen Aeckern; Märgel und gute Bearbeitung tilgen sie

*) Und ich setze hinzu; des Mangels an irgend einer der erforderlichen Erdarten. Wie verschieden das Erdreich öfters auf den Aeckern, vorzüglich auf solchen, bey welchen eher Mangel als Ueberfluß herrschet, auf einem Raum von 5. 6 Zollen sey, (wodurch die einzelne Entstehung des Branddinkels und Roggens erklärbar wird,) dieß werden alle diejenigen erfahren, welche sich mit Untersuchung desselben einlassen werden, oder bereits eingelassen haben.

sie aus. Wer unter seinem Getreide viel Trespen hat, siebt sie weg, oder er kauft sich sonst woher Saamenfrüchte ein, die von dergleichen Saamen befreyet sind; das sicherste, erprobte und von sehr vielen Landwirthen längst ergriffene Mittel *).

*) Wenn das Feld nicht gehörig gebauet, das heißt, alle 3. 4 Jahre mit Gewächsen, deren Anbau eine fleißige und öftere Bearbeitung erheischet, versehen wird, und man außer diesem nicht bedacht ist demselben durch Erdarten die gehörige, oft erwähnte, Vermischung und Bestandtheile zu geben, so hilft, wie mich dieses die Erfahrung lehrte, weder reiner Saamen, weder Brache, weder Klee noch sonstiger Grasgewächse Anbau.

XIV.

1.

Schreiben an Se. Hochwürden T. Herrn Canonicus Wöllner zu Halberstadt in Berlin.

2.

Welche Art von Gemenge findet man zur grünen Sommerfütterung am besten? Das ist, von welchen Sorten, ob von Gerste, Hafer, Erbsen, Linsen, Wicken ꝛc. und in welcher Proportion?

Verehrungswürdigster Gönner und Freund!

Dießmal einen ganz grossen Brief, den mir meine Verwunderung und dann mein guter Wille, etwas zum Besten ihres Vaterlandes zu sagen, an sie in aller Eyl abfordern. Ich lese heute in der allgemeinen Deutschen Bibliotheck des Herrn Nicolai, im 2ten Stück des 36 Bandes S. 594. »Nirgends sind bessere Verordnungen und landesherrliche Edikte für die Landwirthschaft als in den Preusischen Staaten, aber auch nirgends werden sie schlechter befolgt als eben da. Suche ich hiervon den Grund im Nichtkönnen, oder im Nichtwollen, oder in beyden zugleich? ich kann hier nur rathen, und werde wohl das Geheimniß nie ganz deschiffriren. Ich möchte sagen, Brandenburg, Pommern ist Sandland, zum Anbau kaum fähig, oder muß erst durch lang anhaltende schwere, kostsplitterige Arbeit zu einem bezahlenden Ertrag zubereitet werden; das Land ist Heyde, Einöde mit wilden Gesträuche, Dorn und dergleichen bewachsen, mit der Haue gehet

es langsam, der Pflug kann darauf gar nicht gebraucht werden. Kein Land, es sey einsame Sandwüste, oder Sumpf, oder Heide, ist von jeher ganz unfähig zum Anbau, oder zu dem die Arbeit auf ihm bezahlenden Ertrag; der Herr Graf von Borke, in der Beschreibung der Stargardtischen Wirthschaft ꝛc. hat es durch die vortreflichste Kultur seiner Heiden erwiesen, und mehrere dergleichen Erweise liegen zerstreut im Brandenburgischen da. Es versagt aber dennoch auf dem Flugsand, mit welchem viele Gegenden im Brandenburgischen bedeckt sind, selbst um Berlin her sieht es so aus! —" Als ich mir eben diese Einwendungen machte und hinwarf, trat der Herr Bauinspektor Klenck aus Hall in Schwaben, jetziger Baurath und Salinen-Direktor in Weißbach, in meine Stube, dieser brachte einige Jahre in Berlin zu, die Baukunst und alle die Wissenschaften die in solche einschlagen, bey Herrn Lambert und Silberschlag zu studiren und zu erlernen; was schreiben sie da, fragte er, von Berlin? ich sagte: von Mist und Dung, von Sandfeldern und untragbaren Einöden, die ich nach dem Wunsche des Königs gerne urbar und tragbar machen möchte, was-

rum, das wissen sie schon, — meine Wünsche sind alle für Friedrich und seine Staaten! — hm, sprach er, da will ich ihnen wohl rathen, sagen sie das Berlin und noch mehreren Brandenburgischen Städten, was ich ihnen sagen zu können schon lange gewünscht habe; damals, als ich da war, sahe, und es doch übersahe, nicht achtete, nun aber überdacht habe und ihnen jetzt nicht mehr sagen kann. — Ich stand so oft an der Spree, wo man allen Baukummer, Kalk, Gyps, Leimen, — alles Gassen- und Strassenkehricht, alle natürliche Menschenauswürfe einschüttete, und damit endlich die ohnehin seichte, mit Sand und Schlamm gefüllte Spree verstopfet und unbrauchbar gemacht. Meines Erachtens wären ja diese dreyerley Materien der allerbeste und dungreichste Zusatz zu den Flugsandfeldern, sie zu binden und ganz tragbar zu machen; so wie es in Berlin ist, ist es auch in sehr vielen Gegenden zu sehen. Ich weiß es selbst, daß des Königs Majestät zur Verschönerung Berlins alle Jahre eine große Summe verwenden, daß alte Gebäude niedergerissen und ansehnlichere dagegen aufgeführet werden, was ist nun vortreflicher für den Feldbau als solcher Schutt, solcher

Auswurf und Kehricht? wäre es zu viel für die Felder um Berlin, wie leicht könnte es mittelst der Spree und Havel sonst wohin verführt und genützt werden? Mir sind freylich mehrere Städte bekannt, wo dieß und anderes, sonderlich der Abgang in den Schlachthäusern, welches ein Dung ohne gleichen ist, eben so wenig genutzt, und letzteres durch hergeleitete Bäche und Flüsse weggeschwemmt wird; dagegen aber weiß ich doch auch viele Städte, wo aller Schlamm aus den Stadtgräben ausgefischt, wo das Ochsen- und Kühblut sorgfältig aufbewahrt und nachher als der beste Dung an die Bauern verkauft, von ihnen ausgeführt und aufs beste genutzt wird. Seitdem man am Rhein fast nichts mehr als Reps und Taback bauet, seitdem kauft man dergleichen Waare den Wagenvoll zu 6. bis 7 Gr. und den Kübel Blut zu 24. auch 30 kr. in den Städten, und führet es fern weg auf das Land. Auf eine solche Operation müßte das von Natur armselichste Land in das fetteste in kurzer Zeit verwandelt werden. Versuche und Proben hievon hat man ja aller Orten, und doch ist man nicht ohne Grund, aus so vielen Beyspielen belehrt, besorgt, daß Lehre

und fremder Vorgang bey dem Landvolk, so jenes niemals getrieben hat, auf eine freywillige Folge versage, was ist da zu thun? — Da ist freilich kein Vorschlag passender als der, den der Herr Recensent dieses nehmlichen Stückes mit diesen Worten gab: "Ein Oekonomischer Generalfiskal in jeder Provinz, der die Landwirthschaft daselbst und die Edikte zugleich im Kopf hätte, und dem der Edelmann sowohl als der Bauer Rede und Antwort über jede Vernachläßigung einer Königlichen Verordnung geben müßten, würde ein ausserordentlich nützlicher Mann für das gemeine Beste und die Aufnahme der Landwirthschaft seyn, zumal wenn er die Erlaubniß hätte, unter den Gutsbesitzern den guten und schlechten Wirth dem König anzuzeigen, oder ihn brevi manu selbst in Strafe zu nehmen. Ich weiß Fürstenthümer und Herrschaften, wo man schon vor vielen, vor mehr als zwanzig Jahren Männer auftreten sahe, die sich vor sich und mit der Autorität ihrer Fürsten bewafnet alle Mühe gaben, die besten Vorschläge in einzeln abgedruckten Bögen, in periodischen Blättern, in Edikten zu geben, den Bauer selbst mündlich und durch die Amtleute zu lehren, wo doch

bis daher auf den meisten Feldern der meisten Dörfer kein Blättgen Klee wächset, vielweniger Märgel aufgefahren, Gyps gestreuet oder eine Gülle ausgeschöpft und genutzt wird, wo alles noch ist wie es bey den Zeiten der Großund Urväter war. Man sehe dagegen aber auch wieder auf andere Länder und Staaten, wo man den Voschlag des Herrn Recensenten im voraus schon als nothwendig einsahe und ihn befolgte, da grünt alles in der Landwirthschaft ganz voll kommen auf; ich nenne hier Baaden-Durlach, Pfalz, wo der Vater des Vaterlandes, der Durchl. Churfürst bald durch diesen und jenen Beamten dieß und jenes Feld umschuf, und wo die Güte bey dem Bauer nichts verfangen wollte, unter der Ausrückung ganzer Executions-Kommando Soldaten der Ernst auf Ablassung grosser Sümpfe verfangen mußte. Sie werden wohl wissen, daß das Darmstädtische, sonderlich die Gegend um Darmstadt herum, mit Flugsand, auf welchem von jeher gar nichts erbauet wurde, und vor sich auch gar nichts erwuchs, bedeckt ist oder den Urstoff seiner Felder ausmachet. Man hat nun angefangen diese Felder umzubrechen, mit Klee, Erbsen, Wicken, Saubohnen und dergleichen zu besäen;

man

man bestreute die aufkeimende Früchte mit Gyps, und 1778. wo doch auch in andern nicht so hitzigen Feldern sehr viel Erdgewächse von der starken, langen, anhaltenden Hitze ganz vertrockneten und umkamen, erhielten sich diese nicht nur vortreflich, sondern wuchsen auch zu einer außerordentlichen Größe auf, und zeitigten vollkommen gut aus. Man stellte die Versuche so an, daß man ein Land, welches mit Saubohnen, ein anderes so mit Klee angesäet war, halb begipsete halb nicht, Saubohnen und Klee, die nicht begipset waren vergiengen, und die begipst waren, wuchsen zu ihrer Größe und Reiffe aufs vortreflichste an. Wäre nun also der Gyps zu dem Brandenburgischen Flugsand, sonderlich für den um Berlin her nicht auch das erwünschteste Mittel ihn zu befruchten, das unfruchtbare Feld in ein nützliches Grün zu verwandeln, um damit neben der Schönheit viele Tonnen zu gewinnen? ich denke allerdings. Aber woher den Gyps? Ich weiß es, mein verehrungswürdigster Freund, daß der Gyps auf den Sandländern ganz und gaz nicht zu Hause ist; so ist es auch in den Darmstädtischen Landen, allein von sei-

ner Güte nun überzeugt, wurden aus der Ferne auf dem Necker, Rhein und Mayn in dieselben verführt, das löbliche Landkommissionsinstitut erbaute Häußer, in solchen ist die Niederlage errichtet; nach dem Akkord der mit den Schiffern gemacht ist, wird der Centner für 16 kr. geliefert, und so dem Bauern wieder ausgewogen und ohne Aufschlag gegeben, diesen führen sie noch auf mehrere Meilen zu sich ins Land, und nutzen ihn mit dem besten Gewinn *). Die Spree, die Havel, die Oder und andere Flüsse in Brandenburg dienen zu dem nehmlichen, und man würde, wie ich es wohl weiß, hin und her Gegenden genug auffinden, wo man den Gyps in Menge ausgraben und nach Brandenburg zu bringen vermöchte. Mein Wunsch ist übrigens dieser, daß,

*) Statt des Gypses kann man mit gleichen, ja noch größerm Vortheil Steinkohlen, Märgel, Kalkschutt und Backofenerde ꝛc. alle diese Stücke auf das feinste zermalmet und mit dem Saamen gleich im Frühjahr auf die Oberfläche des Sandes ausgestreuet, nehmen; und denn wenn alles einer Handhoch aufgewachsen ist, mit Haalbötzig düngen.

daß ich forthin die Ehre geniſſen möge, daß ſie mein Freund ſeyn wie ich von Herzen der Ihrige. Kupferzell, den 4 Jenner 1789.

Meyer.

Welche Art von Gemenge findet man zu grüner Sommerfütterung für die beſte? das iſt, von welchen Sorten, ob Gerſte, Hafer, Erbſen, Linſen, Wicken ꝛc. und in welcher Proportion?

Wenn man von Gemenge, welches man in Franken Gemiſche oder Gemeſche heiſſet, als einer grüner Sommerfütterung redet, ſo ſieht man dabey nicht auf Pferde, Schaafe oder Schweine, ſondern nur auf das Rindvieh. Unſtreitig iſt es wahr, daß man von dem Rindvieh, ſonderlich von den Kühen im Sommer den meiſten Nutzen aus der grünen Fütterung erwartet, und zu dieſer grünen Füttterung rechnet man billig das Gemenge, doch auch nicht geläugnet, daß unter dem vielerley Gemenge auf die Nutzbarkeit geſehen, nicht ein geringer ſondern ein ſehr großer Unterſchied ſeyn müſſe. Das Gemenge oder Gemiſche ſo aus allerley beſteht, wird auch von allerley

Saamen gesäet, dieser Saame wird entweder lauter, oder einer mit dem andern zugleich ausgestreuet, man säet sie aus, um sie etwas aufgewachsen abzugrasen, und sie grün zu verfüttern; man nimmt dazu Gerste, Hafer, Roggen, Buchweizen oder Heidekorn, Erbsen, Linsen, Wicken u. s. w. diese Saamen werden zu allen Zeiten des Frühlings und Sommers und gegen den Herbst angesäet. Der Gemengebau ist aber gegen den Kleebau nicht deswegen, als wenn der Klee eine fettere Fütterung wäre, verwerflich, gewiß ists, daß einiges Gemenge als das von Wicken, Hafer, Erbsen, den Klee an Güte oder Fettigkeit noch zurück läßt oder ihm vorangeht. Die Ursachen sind diese: die erste, das Gemenge, wenn es nur etwas hoch aufwächst und anhaltende Regen einfallen, legt sich gar bald, wird faul, das Vieh frißt es sodann gar nicht mehr gern; die zweyte, die meisten Gattungen als Erbsen, Wicken, Linsen können nur einmal abgemähet werden; die dritte, man säet es gemeiniglich in das Brachfeld, so auf nächsten Herbst mit Wintergetreide besäet wird, man säet es auch in das um Jacobi abgeerndtete und umgestürzte Winter-

getreidefeld ein, im ersten Fall mag man den Acker düngen und bauen wie man will, so versagt doch auf den nächsten Sommer das Getreide gewaltig und die Erndte wird schlecht*). Im zweyten Fall ergiebt sich beynahe eben so viel schädliches, ein Acker wird aufs folgende Jahr an den Sommerfrüchten abbrechen und man wird es vielleicht auf folgender Wintersaat noch sehen. Die vierte, der darauf auszustreuende Saame könnte, wo man ihn nicht darauf verwendete und aussäete, zu andern Absichten, zur Fütterung, zur Mastung u. dergl. genutzt werden. Wenn man nun aus diesen Gründen den Liebhabern des Gemengebaues ihre Liebhaberey aus der Landwirthschaft ausmerzet und den Kleebau empfiehlt, so möchten sie aus eben denselben den Kleebau verwerfen und das Gemenge wieder anpreisen, könnten sie doch sagen: auch der Kleesaame ist theuer, auch der

Klee

*) Wenn man die dem Felde abgegangenen Erdarten wieder ersetzet, und das Gemesche selbst mit Gyps, Haalbötzig, Kalk, gestossenen Märgel, Seifensiederasche ꝛc. dünget, so wird der Acker das folgende Jahr sich eher fruchtbarer als unfruchtbar zeigen.

Klee saugt die Felder aus, auch der Klee hoch gewachsen, alt, ist nicht mehr die angenehme Speise für das Vieh! gleich zur Sache. Man muß von allem genannten Gemenge sagen, daß es Fettigkeit genug habe, der Bauer hat einen Handgriff sich dasselbe wohlfeil auf den Herbst zu verschaffen, er ist dieser: siehet er, daß auf seinem Acker viel Roggen vom Hagel ausgeschlagen, oder von Sturmwinden abgerieben worden, so säet er noch etwas Erbsen oder Wicken darunter, stürzt seinen Acker flach- um und gewinnt so das wieder, was ihm zu entgehen schien; so verfährt er auch bey der Wintergerste, das ist, bey der Gerste die er im Herbst säete, welche noch eher zeitigt als der Roggen. Das übrige Gemenge, so der Bauer aus der Baarschaft seiner Körner aussäet, kommt ihn nun freylich allezeit höher zu stehen als jenes; säet er aber so, so wählt er dazu die Sorte welche im gerinsten Preiße stehet. Das gewöhnliche Gemenge bestehet aus Erbsen und Wicken, er hat den vollkommensten Grund, diese zwey Sorten zu wählen, denn Erbsen und Wicken können zu allen Zeiten ausgesäet werden, ihr frecher Wuchs bringt sie zur Abfüt-

terung

terung bald her, und da das Rindvieh beyde Sorten nur gar zu gerne frißt, und solche auch Fettigkeiten und Milch geben, so zieht man sie, wohl nicht ohne Grund, andern Schottenfrüchten, sonderlich den Linsen weit vor, denn der Wuchs der Linsen ist nicht so frech, das Gras bleibt kurz, es giebt sehr weniges aus und schickt sich hieher wohl gar nicht. Besser dient hierzu der Buchweitzen oder das Heidekorn, dieses wächst sehr schnell und hoch auf, das Rindvieh frißt es auch gerne, es suchet oder fordert keinen allzuguten Boden, und wirkt auch auf die Fettigkeit des Rindviehes, auf viele und sehr gute Milch. Wenn diese dreyerley Sorten schon das gute alles an sich haben, so mangelt ihnen doch eines, nehmlich, daß sie einmal abgeschnitten nicht wiederum nachschieben, ein allerdings sehr wichtiger Fehler! diesen Fehler haben Gerste und Hafer nicht, werden sie einmal in ihrem besten Wuchse zu halb Ellen hoch abgemähet, so treiben sie auf einem mäßig guten Acker allezeit noch einmal und in ungleich größerer Dichtigkeit nach, die Gerste und der Hafer sind einander hierinnen

ganz gleich *), doch muß die Gerste dem Hafer in Ansehung seines Grases, welches, wenn der Stock kaum eine drittel Elle hoch aufgeschossen ist, solches auf seinen Seiten mit so scharfen Enden oder Stacheln dichte an einander besetzt wird, daß das Vieh ohne verwundet zu werden kaum im Stande ist es zu kauen. Noch mehr, wenn es nur etwas regnet und solcher Saame noch jung ist, so ist er so mast, wird so batzig und fault so gerne, daß man sich nicht wohl rathen kann. Der Hafer sticht in allem diesen und in noch mehrern über die Gerste herfür, einmal ist die Ansaat eines Gemenges mit Hafer nicht so kostbar als die mit Gerste, Erbsen, Wicken, Linsen, Roggen; — sie ist schlechtweg die wohlfeilste unter allen, wenn das Malter Hafer mit zwey Gulden bezahlt wird, so gelten die andern Sorten gewißlich drey, vier, fünf und mehr Gulden. Zweitens, das Hafergras, Halmen, Blätter sind und bleiben immerhin milde, dem Viehe freßbar und schmackhaft, fast bis dahin,

*) Da der Hafer mit einem minder guten Erdreich zufrieden ist als die Gerste, und dasselbe weniger entkräftet als diese, so muß man ihn billig dieser vorziehen; eben dieses gilt auch bey dem Heidekorn, welcher auch in einem Lande von einem halben Procent in Scheidewasser auflösbarer Erden gedeyhet, und das Erdreich theils dadurch daß es das Unkraut erstücket, theils die für Weizen, Roggen, Gersten ꝛc. minder brauchbaren wegnimmt, sehr verbessert.

dahin, daß es abstirbt. Drittens, wie die Haferfaat auf allen Feldungen, auch auf dem Sandfelde gut fortkommt, so achtet sie auch Trockne und Näsſe nicht viel. Viertens, wenn man den Hafer mit Erbsen, Wicken, Linsen vergleichet, so giebt er allezeit ein vorzüglicheres Gemenge als alle diese dreye; säet man also Erbsen, Wicken, Linsen zusammen, oder jedes derselben allein, oder zwey von ihnen unter einander, so hat man ihr Gutes und Schlechtes einmal wie das andere zu erndten. Die vorzüglichste und beste Ansaat eines Gemenges ist also diese, wenn man Hafer, Erbsen, Wicken untermenget und sie zusammen unter einander ausstreuet, die Ursachen hievon sind diese: 1) daß alle drey schnell und behende aufwachsen, 2) dem Vieh die beste Fütterung abgeben, 3) der Hafer allerwenigstens nach dem Abgrasen noch einmal aufwächst, 4) durch den Hafer, das was an den Erbsen und Wicken als Fehler bemerkt, hinweg gehoben wird, und sie auf alle Zeit aufs brauchbarste herstellt. — Dieses Gemenge im Frühling auf das Brachfeld gesäet kann bis Jacobi zweymal genutzt werden. Wird es auf die um Jacobi abgeerndtete gestürzte Wintergetreidefelder ausgestreut, so dient es noch um und nach Michaelis zur Spatfütterung gar sehr wohl. Der Bauer welcher bey uns mästet, säet sie in die Sommerflur ein, wenn alles eine halbe Elle hoch gewachsen ist, graset er es nach und nach ab,

füttert

füttert Mastvieh und Kühe damit, bestreut das abgegraste Stück mit Gyps und erhält in kurzem wieder so viel als er das erstemal wegnahm, läßt er es aber stehen, bis alles anfängt Schoten und Körner zu gewinnen, so schneidet er es auf der Häckerlingsbank, und schüttet es so den Kühen und Mastvieh vor. Zu Zeiten, sonderlich wenn er zu viel dergleichen Gemenge ausgesäet hat, läßt ers auch auszeitigen, bringt es heim, und bedient sich der ausgedroschenen, so gemengt geschrotenen Körner, als der allervortreflichsten Fütterung vor allem. Noch eine Art eines solchen Gemengs ist, Hafer und dreyblättrigter rother Klee, bald nach Pfingsten schneidet man den Hafer ab, begypset das Feld und in kurzen wächst Hafer und Klee untereinander vorzüglich schön auf, die folgende zwey Jahre ist der Acker nun Kleefeld. So kann es allezeit mit dem Gemenge, welches im Frühling gesäet werden soll, und aus 2/3tel Hafer und 1/3tel Erbsen und Wicken bestehen soll, gehalten werden; will man aber erst nach der Wintergetreideerndte säen, so ist Hafer und Wicken nicht so geschickt dazu als Erbsen, diese wachsen schneller als jene, und vielfältig; wenn nicht recht erwünschtes Wetter im Herbste noch eintritt, erhält man gar nichts vom Hafer und Wicken, glückt es aber, so ziehe ich abermals den Hafer den Erbsen, und die Wicken beynahe beyden zugleich vor.

XV.

XV.

Ob es rechtlich und nützlich sey den Schaafen die Weide auf den Brach- und abgeerndteten Wintergetreideflu- ren zu verstatten, und darüber dem Bauersmann den Anbau derse- ben zu erschweren oder gar zu untersagen?

Daß der Kleebau für den Landwirth eine der allernützlichsten Arbeiten sey, wird wohl Niemand, der die ganze Wirthschaft eines Bauern überdacht hat, zu leugnen begehren. Er ist es als Fütterungsbau für sich schon, da er eine sehr große Menge Fütterung verschaffet, und da die fette Kleefütterung das magere Gras als eine fettmachende Fütterung bey weiten übertrift, wer wird denn auch den vorzüglichsten Werth des Klees verkennen? zumal da er mit dem schlechtesten Boden vorlieb nimmt; da einiger, als die Esparsette, auf dem dürresten Erdreich, wo vorher nicht eine Schmelle herfür kam, auf das frecheste ganz dichte heran wächst, sehr früh vor allen andern Grasarten da ist, bis in den spätesten Herbst dauert, und drey bis viermal Ellenhoch abgemähet werden kann. Das alles ist der Klee als grüne Fütterung verfüttert, das ist er aber selbst auch als geheuet; alles Vieh, bis auf die Schweine, frißt ihn gerne, wird fett davon, giebt viel und gute Milch. Das ist er aber auch in Betracht der

Felder auf denen er gebauet wird, das schlechteste kann durch ihn genutzt, und er weiset weder Korn noch Gerste noch irgend eine Saat von der Stelle, wo er aufwächst, hinweg, er liebet sie vielmehr und fördert sie, und dann wenn er etwa nach drey, zehn, zwanzig Jahren ausstocket, so ist das Feld durch ihn gar nicht entkräftet, daß vielmehr durch ihn die allermagerste Feldung zum Anbau aller Fruchtsorten der ergiebigste Grund wird *). Man

würde

*) Wenn man die Felder, worauf der Klee, vorzüglich der dreyblättrichte (denn die übrigen Kleearten, der ewige und der türkische, holen ihre Nahrung größtentheils aus der Tiefe,) gebauet wurde, alljährlich gut mit Gips, Steinkohlen, Kalk, Asche, Haalbötzig ꝛc. dünget, dann ist die Umänderung eines schlechten Grundes in einen guten, durch den Kleebau möglich und richtig, im verneinenden Falle aber nicht. Daß die Kleewurzeln das Erdreich etwas zu verbessern geschickt sind, dies habe ich bereits angezeiget, allein die Verbesserung ist nicht andaurend, und währet nur so lange als noch etwas von denselben vorhanden ist. Ein schelchtes Feld wird also allezeit, ist es auch nicht im ersten Jahre sichtbar, durch den Anbau des Klees, es sey denn unter obigen Bedingnissen, ent-

würde ohnmöglich bey allem Dunge auf einem und eben den Boden so viele Jahre an einander Kartoffeln, die die Baukosten bezahlen gewinnen, aber auf dem Lande, auf welchem mit dem Klee und Kartoffelbau gewechselt wird, gedeyhen sie und der Klee beständig aufs beste *). Ich weiß ganz große Ländereyen, wo man immerfort Kartoffeln gebauet hat, welche nach und nach so entkräftet wurden, daß darauf weder Kartoffeln noch irgend eine Gattung Getreide mehr gebauet werden konnte, der

entkräftet und zum Anbau des Roggens, Weizens, der Gerste ꝛc. untüchtig gemacht, nur allein ein Feld 30, 40 Procent auflösbarer Erden zeiget das Gegentheil, trägt Roggen, Weizen, Gersten besser als jener.

*) Auch hier wiederhole ich das in der vorhergehenden Anmerkung Gesagte: der verfaulte Klee giebt den Kartoffeln Nahrung, aber eben durch den Anbau dieser beyden Gewächse, welche sehr viele auflösbare Erdarten, theils zur Bildung der Salze, theils zur Formirung ihrer übrigen Theile verlangen, wird das Feld nach und nach entkräftet.

Kleebau aber alles bald wieder her stellte **). Man kann keine bessere Bauart mehr vorfinden als die, da man alle Jahre alles Ackerfeld nutzet und durch den Kleebau ist man dieß zu thun vollkommen imstande. In die Gerste, Erbsen, oder auch in den Hafer, dreyblättrichten Klee mit unter gesäet, der im Herbste, so man ihn mit Gyps wohl überstreuet hat, wohl genutzet künftiges Jahr dreymal abgemähet werden kann, und dann wenn man die Winterfrüchte einsäen will, den Kleeacker herumgebrochen, so ohne weitere Arbeit oder Dung mit Spelzen besäet, giebt sonderlich auf schwerem Felde, nur nicht auf weißen leichtem Felde, so nicht gerne für sich zerfällt, die reichlichsten Erndten. Wie viele Mühe, da man ein solches Kleefeld den ganzen Sommer hindurch nicht bauen darf, wird nicht hierdurch erspart?

diese

*) Durch den Anbau des ewigen und türkischen Klees konnte dieses allein geschehen, durch den des rothen Klees ohne Dung aber nie, denn selbst diese Art Klee wächst in einem dergleichen Felde nur mager und dünne empor, und vergehet in kurzen ganz, wenn auch in der Tiefe Mangel an auflösbaren Erdarten vorhanden ist.

diese ersparte Zeit auf andere Gegenstände gewandt muß ja den Bauer nothwendig beglücken. Immer noch zu wenige Aecker, zu wenige oder zu schlecht gepflegte Wiesen, zu wenige Fütterungen, zu weniges Vieh, immer noch anhaltende Weidgänge, und daher immer noch zu wenig Dung. Der Klee ist das einzige Mittel gegen dieses alles; zwey, drey Morgen Acker mit Klee angebauet setzen jedweden Bauer in den Stand seine ganze verderbliche Wirthschaft zu ändern. Der Dung ist und bleibet den Bauren alles, und diesen verschaft ihn der Kleebau in aller Absicht in Menge. Ich habe von der Erleichterung der schweren Bauerarbeiten gesagt, ich habe den Kleebau gepriesen, ich frage jetzo, warum? kann man sich etwas beschwerlicheres als das Grasen mit der Sichel in Wäldern, auf Saamenfeldern, auf diesem und jenem Plätzchen denken? ich habe Landleute ohne Wiesen und Kleebau gesehen, die mit Taschenmessern auf allen Wegen, da und dort im Frühling die einzelnen Gräschen abschnitten, zusammenlasen, in ihren Korb einzählten und heimtrugen, und doch nicht genugsame Fütterung erhielten; und wie viele Zeit versäumen

nicht die Mägde? statt einer bedarf man zwey, drey, was machet da nicht jährlich Speise und Lohn? alles dieses nimmt der Kleebau vollkommen hinweg, eine Magd kann hierbey mehr thun als drey oder vier, sie nimmt ihre Sense, in einem Hui hat sie für alles ihr Vieh Grasung genug, der Knecht führt sie auf einmal nach Hause und so bekommt die Magd Zeit ihre Ställe besser zu besorgen. Ist denn auch in einer Wirthschaft etwas, auf welches der Kleebau nicht mächtigen Einfluß hätte, zu finden? oder, daß ich frage: ist es denn Wunder, wenn alle und jede Oekonomen den Kleebau über alles erheben *)? schon unter den ältesten Römern war er bekannt; Varro, Columella, Pelladius, Virgilius redeten von ihm, und empfohlen

*) Warum setzte man aber dabey den Anbau der übrigen gleich nützlichen Futter Gewächse, den Anbau des Honig- Ray- Ruch- Melten- Thimotheus- und Spergelgrases, der Pimpinellen, des Spinats ꝛc. so ganz auf die Seite? sollte nicht die Verschiedenheit des Futters dem Viehe zuträglicher und willkommner seyn als die so einfache, oft gefährlich werdende Speise des Klees? doch mehreres hievon im folgenden Theile.

pfohlen ihn sehr, mich wundert nur dieses, daß er nachher wieder verkam; doch was wundere ich mich hierüber? so lange ein Land der Felder zu viel, und der Einwohner zu wenig hat, so lange sucht man so was nicht hervor. Länder voll Menschen und voll Mangel sind die Länder der Erfindung. Bisher war immer der Wille, der den Landleuten noch abgieng, das wichtigste Hinderniß des Kleebaues, sie hatten sein Nützliches noch nicht hinlänglich erkannt, und der alte Schlendrian saß in ihnen zu feste, sie hatten nicht überall Vorgang, wörtliche Lehre ist bey ihnen Arbeit in den Wind. Alle Oekonomen betrogen sich selbsten, die ihren Unterricht an die Landleute schriftlich entwarfen, wer las ihn? wer las und verstand ihn? und denn waren die Hindernisse auch außer ihnen zu mächtig: da war kein Saame, kein Geld, da war das Wildpret. Der Erfinder einer Sache ist der erste, wenn sich aber von ihm eine Sache mehr ausbreitet, so breitet sie sich durch ihn selbst, oder durch den aus, der bey ihm stehet und lernet, was Wunder, wenn auch so der Kleebau sehr langsam in Stand kommt, und wenn er sich noch langsamer unter den Land-

leuten ausbreitet? Man weiß den Erfinder des Klees noch nicht, das weiß ich aber gewiß, daß die drey Gattungen Klees als deutsche und einheimische Produkte erkannt sind; man findet sie allenthalben in einzelnen Stücken für sich empor kommen, wohl alle dreye nicht allezeit in der Größe, aber allezeit von einer und eben der Gattung, die dreyerley Kleesorten werden nun beynahe allenthalben gebauet, die Berge und Einöden werden mit Esparsette und Luzerner, und die Aecker mit dreyblättrichtem Klee besäet. Vortreflich! schon auf den Feldern fällt es so jedem ins Auge, in allen Ställen nimmt der Viehstand alle Jahre mehr zu, und kaum ein Stall oder Scheune wird gefunden, die nicht eine Erweiterung erhält. Ist man zufrieden? mit jedem alle Menschen wohl nie; vormals da es mit dem Kleebau nicht fort wollte, da klagten die Oekonomen, nun da es sich allenthalben gut anläßt, die Schäfer und die Bauern; vormals baueten die Bauern den Oekonomen zu wenig, und jetzt den Schäfern zu viel, dieser weidet den Bauern den Klee auf den Brachfeldern weg, er schonet ihn nicht, wenn die Sommer- und Wintererndte herein ist, so fre-

het er ihn durch seine Schaafe bis in den tiefen Frühling verderbend hinweg *), der Bauer und der Schäfer sind beyde Vorwürfe des Oekonomen, der Oekonom wiegt alles nur nach dem Nützlichen ab, er bekümmert sich so wenig um das Recht als die Observanz, er wünschet, thut Vorschläge und überläßt den Juristen die Entscheidung, den Kameralisten die Ausführung. Er ist froh wenn er siehet, daß er dem Staate wirklich genutzt hat. So weit und weiter nicht gienge nun auch mein Beruf, allein nun bitte ich um Vergebung, der Streit der Schäfer und der Bauern über ihre Brache, ob diese solche mit Klee anzubauen das Recht haben, oder ob jener das Recht hat es ihnen zu verwehren; ob der Bauer schuldig ist um der Schaafe willen Brache zu halten, oder ob er nach freyem Willen damit thun kann, was ihm belie-

*) Wie glücklich lebet hier nicht auch in diesem Betracht der Landmann unter der weisen Regierung unseres so gnädigen Fürsten! Kein Schäfer darf, und dieß bey schwerer nie ausbleiblicher Strafe, die mit Klee bestellten Brachfelder, auf welche wegen Mangel an Wiesen das Glück des Landmanns gegründet ist, auch nur berühren.

beliebet? Ich sage meine Meynung, doch bitte ich um Nachsicht vor allem. Ein klein wenig Historie. Seyen die ersten Menschen, was sie haben seyn wollen, gewesen: Leute, die sich von Kräutern, Baumfrüchten, oder vom Ackerbau, oder dem Vieh ernährt haben, mir gilt es zuletzt gleich viel; doch meine Gedanken hiebey zu äussern, will ich sagen, daß ich glaube, die erste Nahrung möchten Baumfrüchte gewesen seyn; daß sich unser aller Mutter darnach umsieht, und daß die beyden ersten Menschen davon essen, das giebt mir die Muthmassung, und daß Cain älter als Abel den Ackerbau betrieben, das läßt mich schliessen, daß der Ackerbau älter seyn möge, als die Viehzucht. Ich glaube nicht, daß die Thiere vormahls so wild waren, als heutiges Tages. Wir haben beynahe von allen Gattungen wilder Thiere auch zahme von den nehmlichen Arten. Ist es nun so, so sieht man wohl ein, daß die ersten Menschen, welche sich auf die Viehzucht legten, ihre Thiere nicht erst aus der Wildniß herholten, sondern diese schon um sich her hatten. Mit Deutschland gieng es wohl auch nicht anders, da seine Bewohner noch in Wildnissen lebten, da waren sie Jäger und Viehhirten, endlich nach und nach Ackersleute. So

blieb es bis Clodovanus mit seinen Franken die Deutschen überwande, und sein Sohn die Ueberwundenen mit Sclavenketten bande, sie auf gewisse Gegenden, die Felder zu bauen, verwieß, von ihnen jährliche Dienste bedingte und ihnen gewisse Abgaben auflegte. In dieser Verfassung stund nun Deutschland bis in die weitere Jahrhunderte hin. Der Bauer war Sklave, viele Herren Tyrannen und Barbaren. Die mehresten Felder lagen öde und wenige Bauernhöfe wurden aus Mangel der Menschen nur so obenhin gebauet; es war also damahls in Deutschland die eigentliche Epoche der Armuth. Dieß fühlten die Herrschaften, sie lernten den Werth des Ackermanns schätzen, und den wieder zu erhalten, begnadigten sie jeden mit aller möglichen Freyheit. So wurde der freye Reichsbürger und Bauer nach und nach geschaffen, und das Gesetz natürlicher Freyheit: das Seine nach eigenem Gefallen nutzen zu können, gebildet. Die Feldgüter waren des Bauern eigene Sache; die Jagd und die Schaafweide blieb das Eigenthum der Herrschaften. So war Unterthan und Herr durchaus getheilt. Keines konnte zwar bey dem andern ohne Schaden bestehen; aber jedes konnte fern von dem andern sich voll-

vollkommen erhalten. Ich will mich hierüber näher erklären. Die Schaafe finden ihre Weide und Nahrung im Grase, wenn nun der Bauer die Grasstücke herumbricht, so müssen natürlich die Schaafe solche entbehren. Sollten aber die Schaafe diese Aecker oder Wiesen auch nur in gewissen Zeiten wieder überweiden, so würden doch Aecker und Wiesen durch sie nicht wenig verlieren. Gesetzt, daß eine Heerde Schaafe darauf weidet, das wachsende Gras oder Unkraut hinwegfrißt und im Dunge nichts mehr herträgt, muß nicht dadurch den Aeckern und Wiesen von ihren Kräften sehr vieles entgehen *)? Ich glaube wohl ja. Es ist augenscheinlicher Dung für Aecker und Wiesen, wenn das, was auf ihm wächst, durch den Pflug hinabgebracht wird, oder auf ihm verfaulet, haben ja die alten und jetzt die neuern Oekonomen schon lange mit aufgesäeten Feigbohnen, Erbsen, Wicken ꝛc. ganz allein gedünget. Dieses von unsern Alten etwa überdacht, und Land genug, einiges zum

Ackers

*) Dieser Verlust ist so unbedeutend daß er kaum angeführt zu werden verdienet, eine kleine Gabe von Gyps, Haalbötzig, Steinkohlen ꝛc. ersetzet ihn zwiefach.

Ackerbau und einiges zu Weiden, kann ich mich niemahlen überreden, daß sie nicht den Ackerbau und die Schäfereyen, die nicht bey einander bestehen können, von einander getrennt, und nicht jedem seine besondere Stelle angewiesen hätten; zumahl da ich sehe, daß sie zwischen dem Ackerbau und Schäfereyen einen Unterschied gehalten haben. Ueberall, wo man von Weiden liest, da lieset man von Weiden in locis in cultis, in montibus et collibus, in sylva, in saltu pascuo, in saltensibus fundis, in nemoribus pastioni deputatis. So reden die Bücher der Römer und Griechen; auch so die heilige Schrift, und die vom Schäferleben genommenen Gleichnisse von Schaafen in Wüsten. Dergleichen Stellen gab es so viele, daß sie selbsten sehr wünschten, daß sie nach und nach umgebrochen und mit Unterthanen besetzt würden; dieses geschah und geschieht immer noch alle Jahre. Die Schäfereyen trieb man also hierdurch in die Enge. Beweise hievon liegen in Erfahrungen gar viele am Tage. Der Bauer, welcher das Recht hatte, seine Güter zu nutzen, wie er wollte, hielt sich zu seinen Kleidern nur einige Schaafe; die Schäfer der Herrschaften, welche diese Weidungen wahrnahmen, suchten sich solcher zu

bedie-

bedienen, und nachdem fast gar keine Weiden mehr in ungebauten Gegenden da waren, so erhub sich überall Streit; was soll aber der Streit des Unterthans gegen seine Herrschaft? Das ist nun aber die Epoche in der man die Frage aufwirft:

Wenn der Bauer sein Wintergetreide nach Haus hat, darf er diese Felder umstürzen, und sie noch einmahl ansäen? Ist er berechtigt, auf der Brache Früchte, Flachs, Rüben, Klee ꝛc. zu haben? Oder hat der Schäfer das Recht, ihm solchen zweyerley Anbau zu verwehren und solche Früchte abweiden zu lassen?

Ich sage nun hierauf meine Gedanken: Ich halte nicht dafür, daß die Aecker der Bauern, die als Eigenthum denenselben geworden, jemahls zugleich für einen Schäfer ausgesetzt waren; weil es widersinnig wäre, 1) den Schäfereyen solches zu erlauben, da Eigenthum auf diese Weise nicht mehr Eigenthum wäre; 2) die Schäfereyen ohnedem Weiden genug, ja in so vielen Wüsteneyen im Ueberflusse hatten. 3) Die

Weid-

Weidgänge auf Aeckern und Wiesen sehr großen Schaden verursachen; unsre Alten ab er au beyde gar sehr gesehen haben, daß ihnen keine Hindernisse in Weg gelegt würden. Der Kaiser Honorius setzte einem Soldaten, der einem Bauern eine Wiese beschädigte, schon zwölf Pfund Strafe; 4) da die daselbst geweidete Schaafe wohl eine fette, aber für sie eine ge sunde Weide niemahls vorfinden. Wie man denn 5) auch aus der ältesten Erklärung des Worts: Wiese, gar wohl ersehen kann, daß sie zur Weide gar nicht bestimmt war. Die Gesetze sagen: es ist ein großer Unterschied zwischen Wiesen und Weiden. 6) Kann ich Jedermann mit der Ueberzeugung: daß mir keiner werde genug thun, herausfordern, durch irgend ein Document einen Beweis zu ertheilen, daß je eine Herrschaft in ältern Zeiten das Recht, die Aecker und Wiesen der Bauern mit seinen Schaafen zu betreiben, vorbehalten habe. Es ist wahr, Lehnbriefe, wo von Triften geredet wird, hat man genug; aber die Trift auf den Feldern zu haben, heißt noch nicht die Weide auf den Aeckern und Wiesen haben. Ich glaube übrigens, daß dem Bauern durchaus nicht verwehrt werden könne, seine abgeernd-

tete Winterflur gleich nach der Erndte, entweder zur Gerstensaat durch mehrere Umackerungen tüchtiger zu machen, oder sie mit Gemische ꝛc. sogleich wieder zu besäen, und daß ihm ganz unverboten bleibe, nach eigenem Belieben auch die unnütze Brache zu benutzen. Denn 1) ist es die allgemeine Regel und das Recht der Freyheit, sein Eigenthum ohne Einrede eines andern zu nutzen, so gut als man vermag. 2) Ist der Bauer überall im Besitze von kaum denklichen Jahren, nach dieser Regel, auf den abgeerndteten Fluren sogleich wieder, was ihm beliebt zu bauen, und kein Schäfer hat sich von jeher unterstanden, ihn daran zu hindern. Was will man also einwenden, wo Gesetz und Besitz zugleich für den Bauern sprechen; alsdenn tritt noch 3) der allgemeine Vortheil des Staats, welcher dem Gewinn einzelner Personen vorgeht, hinzu; nichts aber ist klarer, als dieß, daß der Gewinn aus dem Anbau der Feldungen weit wichtiger sey, als der Gewinn eines Schäfers. Und 4) sollte auch die ganze Sache auf einigen Zweifel beruhen, so halte ich immer dafür, daß man der Gerechtigkeit nach, eher für die Sache des Bauern, dem Besitzer, als für den Schäfer, zu sprechen haben werde.

Allein,

Allein wendet man gegen alles dieses ein: es haben doch die Schäfer ein bestimmtes niedergeschriebenes Recht, die Brachfelder zu betreiben und auf solchen zu weiden. Sey es; die Freyheit habe er immer, die abgeerndteten leeren Felder zu betreiben, dieß aber würde mich eben doch nicht verhindern, zu sagen, daß der Schäfer, wenn der Bauer keine Brache mehr hält, verpflichtet sey, dieselbe mit seinen Schaafen zu weiden; denn obgleich dem Schäfer erlaubt ist, die Brache zu betreiben, so ist deßwegen den Bauern doch durch ein Verbot nicht untersagt worden, seine abgeerndteten Aecker nach eigenem Gefallen zu bauen. Man wendet aber ein: dieses ist es eben, so ihm durch jenes Recht des Schäfers untersagt ist. Ich frage: wo ist denn das Interdikt? — Dieß ist es: weil der Schäfer das Recht hat, die Brache zu betreiben. Ich antworte hier kurz: Wenn die Obrigkeit, das Recht hat, einen Galgen zu haben, und die Diebe ihres Landes zu hängen, folgt hieraus: also müssen im Lande Diebe zum hängen sich vorfinden? Der Schäfer hat das Recht zur Weide, muß also im Lande Brache gehalten werden? Zwischen posse und esse ist der Unterschied groß. Ich will es aber gleichwohl noch zugeben, daß

der Bauer seine Brache niemahls wo angesäet hätte; was würde denn dieses gegen seine Freyheit beweisen? — Weiter wohl nichts, als daß er seinen Vortheil bisher nicht recht verstanden habe, und nun der Schäfer seine Güte gegen ihn zu mißbrauchen gedenke. Und was hat der Schäfer denn auch besessen? Nur so viel und nicht mehr: Er hat das Feld, wenn es brache lag, also nicht besäet war, mit seinen Heerden betrieben. Gut! so viel soll er allemal wiederum haben, denn die Rechtsregel lautet so deutlich: tantum est praescriptum, quantum est possessum, mehr aber auch nicht, nehmlich daß der Bauer seine Güter nach Gefallen nicht anbauen dürfte; denn dieß wäre ja kein Possess. sondern ein Schluß aus dem Possess. und eine praescriptio negativa: der Bauer soll die Brache nicht anbauen, setzt allerdings 1) das Verbot: Niemand soll die Brache abschaffen, voraus, und fordert auch ferner, 2) daß der Bauer bey einem solchen Verbote die Verjährung ruhig eingegangen hätte. Ich frage hier billig: wo ist aber ein solches Verbot dem Bauern gegeben? Fehlet nun dieses oder jenes, so hat alle praescriptio negativa gegen ihn keine Kraft; denn wenn es auch schon Rechtens ist, daß ein

Gut, auf welchem ein Servitut haftet, zum Schaden des Domini servitutis nicht abgeändert werden soll, so heißt doch solches nur so viel, daß das tantum possessum, quantum praescriptum bleiben, und der Dominus servitutis nicht gehindert werden soll, sich desselben zu bedienen. Gesetzt aber, daß irgendwo der Anbau untersagt und die Weide festgesetzt wäre: ein Verbot, das zwar wider die Geschichte, wider Recht und Billigkeit laufen würde, was müßte ich hier als Oekonom rathen? Ich weiß es gar wohl: die Schäfereyen sind, wo es gut geht, eine sehr einträgliche Sache: für Obrigkeiten? — Nein — aber für Privatleute, denn alle solche Dinge, die durch andere administrirt werden, sind für Obrigkeiten insgesamt nichts; es kostet alles zu viel. Fleiß, Treue, Einsicht fehlet. Jedoch ich will auch das letztere zugeben, so sage ich doch wohl mit den besten Gründen: daß bey allem dem, daß Schäfereyen grossen Gewinn zu geben vermögen, solcher gleichwohl gegen den Schaden, den sie auch anrichten, wie nichts wäre. Hundert Morgen Brachland ernähren im Sommer keine hundert Schafe, und setze man, daß nach Abzug aller Unkosten dieselben doch noch 200 fl. reinen Gewinn

abwürfen, was wären wohl 200 fl. gegen den Ertrag von 100 Morgen gebauten Aeckern? Ich darf wohl annehmen, daß ein Morgen fünf und zwanzig Neunling erträgt, so tragen 100 Morgen zweytausend fünfhundert Neunling, den Neunling (à 9 Garben) nur zu einem Gulden gerechnet, wäre der ganze Ertrag 2500 fl. und der Zehend davon schon allein 250 fl. Und wenn die Bauern auch die Brache nur für ihren Klee nützten, so würde dennoch eben dieser Gewinn abfallen, weil ich gewiß bin, daß ein Morgen Kleefeld mehr einträgt, als ein Morgen mit dem allerbesten Getreide dicht bewachsen. Ich will die Berechnung nur schlechtweg ansetzen. Ein Morgen von 256 Ruthen (à 16 Schuh) trägt zu dreymahlen abgemähet wenigstens 6 volle Wagen Heu, welche allerdings 60 fl. Werth haben. Gesetzt aber, daß man den Klee um Johannis abmähte, so hätte man von 2 Wagen voll 20 fl., würde man nun den zweyten Wuchs zu Kleesaamen stehen lassen, so hätte man ohnfehlbar 2 Malter, à 8 Sri., das Sri. zu 16 Maas, die Maas zu 2 1/2 Pfund, das Pfund nur zu 10 Kreuzer bezahlt; so ertrüge der Morgen an Kleesaamen 109 fl., das Heu, aus welchem der Kleesaamen gedroschen würde,

nur

nur mit 5 fl. angesetzt, so wäre der ganze Ertrag eines solchen Morgens 134 fl. Wo würde jemahls ein solcher Gewinn für den Bauern oder am Zehenden für die Herrschaften abfallen? Alsdenn, wenn das Feld so im Klee daliegt, welch ein weiterer Vortheil für ein Land? 1) Der Bauer erspart darauf seine Arbeit und wendet solche auf andere Gegenstände nützlicher an. 2) Das Feld wird durch den Kleebau selbst fetter und verbessert. 3) Der Bauer ersparet seinen Dung, denn er braucht es gar nicht zu düngen, die fettesten Kleewurzeln düngen es selbst. 4) Die Erndte auf einem dergleichen Kleefelde ist allemal so gut als die auf einem Acker, der Sommers hindurch bestens gedüngt wurde *). 5) Durch den Kleebau wird die Stallfütterung aufs allerbeste erleichtert, man hat des Grasens nicht nöthig, man mähet den Klee mit der Sense, das Vieh wird weit schöner und fetter und der Dung wird um 2/3tel vermehret. 6) Damit gehen die Weiden auch ein, und

*) Nur auf Feldern von angezeigter Güte finden dergleichen Erndten statt; auf schlechten Gründen aber geschieht das Gegentheil.

können gebauet eine große Menge Futters und Getreide allezeit abgeben. 7) Wollte man dieß nicht, so wären die vorigen Rindweiden am schicklichsten für die Schaafe, so daß also allem Streite auf einmal ganz abgeholfen wäre, und wenn dadurch, daß das Vieh durch die Kleefütterung im Stalle erhalten würde, keine Rindviehweiden auch eingiengen, so ist es doch allemal rathsam dem Bauer die Freyheit zu lassen seine Felder zu besäen, wie ihm selbsten beliebet, und entgienge auch dadurch den Schäfereyen vieles, so könnten sie dennoch bestehen. Die Brache, die abgeerndtete Sommer- und Winterflur werden gewiß nie durchaus mit Kleesaamen bestreut *). Wenn man nun sich mit einander zu vertragen gedächte, so könnten immerhin Bauer und Schäfer neben einander bestens bestehen, will man aber das nicht, so bin ich immer für die Abschaffung aller Schäfereyen, und für die Aufnahme des Feldbaues. Das heißt sich widersprechen, wendet hier der Freund der Schäfereyen ein, so würde der treffliche Schafdung aus den Stallungen, und der

Pferch

*) Und es würde auch nie anzurathen seyn.

Pferch den Feldungen entgehen. Es ist wahr; allein der durch die Schaafe bisher verhinderte nun aber eingeführte Kleebau, wird so viele Fütterung geben, daß der Bauer durch Anstellung mehreres Rindviehes diesen Dung der Schaafe ersetzet. So aber, fährt man fort, wenn ein Land gar keine Schäfereyen hätte, würde es doch an der Wolle wohl Noth leiden, und baares Geld gienge für die Kleidungen der Einwohner hinaus? ich antworte, es ist ökonomisch gedacht alle Gelder in einem Lande durch die selbst gebaute und verarbeitete Produkte zu erhalten, allein es ist auch ökonomisch böß gethan, tausend Gulden wegzuschmeissen, um hundert dagegen zu erhalten; so ist es in Ansehung des Ackerbaues und der Schäfereyen. Jedoch ich fordere ja dieses nicht, beydes kann neben einander bestehen, man schränke nur die Schäfereyen etwas ein, man begehre nur nicht allenthalben eine Schäferey, man weide von der Beschließung der Wiesen an bis zur Aberndtung des Winterflurs auf abgelegene Einöden, und nach der Erndte wieder in diesen Gefilden, so wird es sich alles wohl geben. Und dann ist es ja so der Natur Wink und Wille, es ist

kein Land das von Natur alles hat, jedes Land hat seine Eigenheit. Das größte Unglück der Bauern ist dieß, daß die mehresten Schäfereyen das Eigenthum der Herrschaft sind, dadurch geschieht es, daß sich die Schäfereyen wider die Klagen der Landleute behaupten und sichern. Suchet endlich die Kammer nur immediaten Gewinn und weiß den entfernten größeren nicht zu berechnen, so ist alsdenn ohnehin für den Bauer alles verlohren; in Wahrheit aber, das wäre nicht kammeralistisch gedacht. Vielleicht sind doch einige die mit mir hierinnen noch eins sind, nur wird hierbey die Frage entstehen: wie ist es aber zu machen? ich will meine Gedanken auch dabey noch sagen. Vor allem muß man bey dem Kleebau so verfahren, daß das Nützliche so man schon bewirkt hat, auch erhalten wird, was hülfe es auf der einen Seite so viel zu gewinnen und auf der andern Seite dagegen wieder eben so viel zu verliehren? dieses also vorausgesetzt, wünschte ich, daß die Schäfereyen neben dem Ackerbau bestünden, und sie könnten bestehen, wenn man sich selbst vorher unter einander verstehen wollte. 1) Hätte man einige öde Plätze wo Menschenhände nichts sammeln könnten, so

müßten

müßten die Schaafe von dem Frühling an bis nach der Wintergetreideerndte dahin gebracht werden und daselbst weiden; 2) könnten sich auch nicht alle Schaafe da erhalten, so könnte das Schaafvieh, die Hammel die gemästet werden sollen, die Brache zur Weide haben; 3) giengen durch den ausgebreiteten Kleebau die Rindweidungen ein, so könnten sich die Schaafheerden gar wohl auf den Weiden in der Zeit begnügen, wäre aber dieses nicht thunlich, so dürfte man nur 4) die Menge der Schaafe verringern, so würden für sie die Schaafmenge und die noch übrige Brache auf die kurze Zeit, von Georgi bis Jakobi, wohl zureichen, und will man indessen doch 5) seinen Schaafstand beybehalten, so führe man auch dabey die Stallfütterung ein, baue für sie Klee und füttere sie damit zu Hause, oder man schlage auf die mit Klee bepflanzten Felder den Pferch, rücke damit, so wie ein Stück abgefressen ist, auf das andere fort, und man wird damit nicht nur in Ansehung des Ertrags seiner Ländereyen nichts verliehren, sondern auch selbst seine Schaafe besser besorgen, und in größerer Anzahl halten können. Herr von Gemmingen zu Rapenau bey Heilbronn verdient hier genannt zu

werden,

werden; dieser würdige Edle hat eine Schäferey von 2000 Stücken, für alle diese hat er ein Kleeland, erhält sie darauf stets im Pferch, um seine Unterthanen in Stand zu setzen, ihre Brache durchaus nutzen zu können; seine Schafe sind groß, fett, gesund, haben die feinste Wolle und erzeugen die stärksten Lämmer. Versagte aber alles dieses, so bleibe ich bey der ökonomischen Meynung, daß die Schäfereyen dem Ackerbau in cultivirten Ländern schlechterdings ausweichen, und in weniger cultivirte oder bergichte Gegenden versetzt werden sollten. Und da ist es, um auch den Schäfern zu rathen, ihnen ihren Schaden zu ersetzen, nothwendig und gerecht, daß die Bauern den Schaden, weil sie den Nutzen davon ziehen, bezahlen. Ich denke dieses als den kürzesten Weg unter allen, und es scheint, daß man ihm hin und wieder nachzugehen anfange.

Consuetudo maiorum desuevit
De cuniculo pedetentim!

XVI.

XVI.

1.

Antwort auf die Anfrage eines Freundes über den Wurmfraß auf den Saamenfeldern, und über die Raupen.

2.

Vom Flachsbau, und von der Zubereitung des Flachses.

XIX.

Consuetudo malorum desuevit
me cuniculo pudendam!

Sie schrieben mir von nichts als Mäusen, Schnecken, Raupen und Würmern, warum nicht auch von Käfern? Sie klagen über die gräulichen Verwüstungen, die solche diesen Frühling und Herbst, und das vergangene Jahr allenthalben angerichtet haben. Sie befragen mich über ihr Entstehen, und wollen wissen, wie man sie vertilge oder sie von ihrem Entstehen zurück halte. Sie sagen: daß Sie in dem vorigen und in diesem Jahre bey der Wintersaat, da solche im Oktober schönstens hervorgekeimt habe, auf einmal eine Ausstockung des Saamens bemerkt hätten; Sie hätten die Sache untersucht und gefunden, daß der Saame unter der Oberfläche abgenagt gewesen, und endlich gesehen, daß die Würmer diesen Schaden verursacht hätten. Wunderbar hätte es ihnen geschienen, daß ganze Felder von diesem Zufall verschont geblieben, daß in einem andern Feld nur hie und da ein Acker, ein Fleck auf einem Beete mehr als ein andrer diese Abnagung erlitten habe. Sie hätten Feldboden gegen Feldboden gehalten und

ge-

gefunden, daß dieser Wurmfraß sich auf schwerem und Sandfelde weniger als auf leichtem vorgefunden, und daß man ihn auf jenen beinahe gar nicht bemerket habe; Sie sagen, daß Sie weder den wahren Grund, noch ein zulängliches Mittel dawider zu erforschen vermöchten. Sie verlangen also hierüber meine Vorschläge. Nachdem ich nun selbst der Sache nachgeforscht, die Mittel dagegen aufgesucht, und meinen Versuch zweymal erprobt gefunden habe, so hoffe ich etwas brauchbares hierauf sagen zu können. Sie haben ganz richtig bemerkt, daß diese Ausstockung des Saamens 1) nicht alle Jahre und nur seltner geschehe, 2) daß sie weniger auf schwerem und Sandfelde, mehr aber auf leichtem Felde geschehe, 3) haben Sie die Würmer als die Hauptursache ganz richtig entdeckt. So weit sahen Sie nun selbsten, und ihr Auge hat Sie gar nicht betrogen, dieses alles bemerkte auch ich, aber damit war ich noch lange nicht zufrieden, ich sahe noch 5) daß die Ausstockung nur in denjenigen Herbst- und Spät-Jahren, wie die Herbste 1775. und 1776. waren, da es tief in dieselbe hinein nur etwas regnerisch, meist Sonnenschein und warm war, erfolget und wahrgenommen wird, 6) daß der

Wurm-

Wurmfraß nur meistens auf leichten Feldern, wo stark gedünget, und der Dung spät aufgeführt, und nachläßig in großen Stücken umgebreitet wird, vorzüglich geschiehet, 7) daß die Würmer, welche in dem noch unverfaulten Dung häufiger wachsen als in andern Stellen, wo vermoderter Dung war, sich vorfanden und den Saamen dort also auch häufiger abnagten. 8) Bemerkte ich deutlich, daß die Würmer bey kalter Witterung tief in den Erdboden hinabkrochen, daß sie aber auch, wenn die Sonne etliche Tage schiene, wieder herauf kamen und ihren Fraß fortsetzten. Der Wurmfraß hat seinen Grund von der bis in den Herbst lang andaurenden warmen Witterung, bey welcher die Würmer wachsen, da sie sich sonsten bey einer kälteren tief unter die Erde verkriechen *), und wie andere Insekten unter der Erde schlafen. Bey Projekten ist nöthig die Sachen vielmahls umzuwenden, und mit andern zu vergleichen, gehet es nicht so, so gehet es doch wohl noch anders. Hier, wenn ich die Sache hin und her überdachte, so fand ich zwar allesmal,

*) Oder vielmehr ihre Erzeugung verhindert wird.

mal, daß die warme Herbstwitterung die letzte und entfernteste Ursache seyn müsse, da ich aber auch auf den Aeckern eine Verschiedenheit im Wurmfraß wahrnahm: so schloß ich, daß noch etwas anderes seyn müsse, welches die Würmer in ihrem Entstehen begünstige. Ich sahe, daß schwere Feldungen, Sandboden und nicht die Wohnungen der Würmer sind. Die Ursachen davon kann ich wohl so genau nicht bestimmen, vielleicht deswegen, weil das schwere Feld von ihnen seiner Härte wegen schwerer zu durchgraben ist, und der Sand den Gang der Würmer verschüttet. Ersteres mag seyn, und zu letzterem mag noch hinzu kommen, daß seine Magerkeit dem Wurm die Nahrung versaget; könnte man nun das leichte weisse Feld, welches locker ist, schwerer machen, oder in Sandfeld umsetzen, so würde man die Würmer wohl abhalten. Ich habe von mehr als einem Dutzend Aecker, weissen leichten Bodens, die Erfahrung, daß diejenige, die erst vor 3 bis 6 Jahren mit Märgel beführet wurden, von dem Wurmfraß befreyet waren, andere von Natur ihres gleichen aber, welche lange keinen Märgel erhalten hatten, von demselben sehr litten. Ich habe Aecker bemerkt, welche von Natur von leichtem

Boden,

Boden, die nicht, oder wenn sie auch stark gedünget waren, doch gut bearbeitet wurden, durch Wurmfraß weniges oder gar nichts von ihrem Saamen verlohren hatten. Keine andere Ursache hievon ist, als daß die Würmer, in beisammen liegenden unverfaultem Mist, worinnen sie sich aufhalten, sich ausbreiten und die Verwüstungen anrichten, durch jene starke Bearbeitung aber die Nester nicht vorfanden. Sollte ich Ihnen nun aus diesen Wahrnehmungen rathen, so wäre es dieses: 1) daß man die leichten Ackerfelder mit dem in allen Aussichten nützlichen Märgel, von 20, 25, zu 30 Jahren überführe. Wie nun dieser für sich schon den lockern Boden bindet, so setzet er auch den Landmann in Stand, mit der Hälfte Mist seine Aecker bedüngen, und damit meinen zweyten Vorschlag leichter befolgen zu können. 2) Nichts zeuget mehr Würmer als frischer, zur Fäulniß übergehender, Mist. Es ist wahr, auch alles dieses dünget die Felder recht vorzüglich, doch da man weiß, daß zu vieler Mist auf dem Acker mehr schade als nütze, auch gewiß ist, daß man dadurch im Verhältniß mehr Würmer auf seinen Ackerfeldern zeuget, so ist allerdings rathsam seine Felder zwar hinlänglich,

aber ja nicht überflüßig zu düngen, und 3) da man bemerket, daß die Würmer hauptsächlich nur in dem eben jetzt in die Fäulniß übergehenden Mist wachsen, ihn aber, wenn er in Erde verfallen ist, wieder verlassen, oder darinn umkommen; so rathe ich keinen neuen Mist aufzuführen, und den alten Mist im Frühjahr, ehe man stürzet, auf dieselben zu bringen, somit hat er bis an den Herbst, die zum Verfaulen benöthigte Zeit, und verwandelt sich den Sommer hindurch vollkommen in Erde. 4) Würde der Mist unter der Erde ruhen, so würde er gewißlich nicht so bald als beym Gegentheil faulen, noch in Erde verkehret werden; daher ist es nöthig, das Ackerfeld den Sommer hindurch wenigstens viermal zu ackern und zu eggen, 5) muß man den Mist, der untergepflügt werden soll, auf den Aeckern recht gut zerschütteln, zerstossen, und wohl und tüchtig verbreiten. In diesen 5 Aufsätzen habe ich also das, so ich wider den Wurmfraß zu rathen weiß, gesagt; mir ist nun freylich nicht unbekannt, daß andere wieder andere Mittel vorschlagen, ich will nur eines davon anführen.

"In neu umgemachten Aeckern naget ein Wurm

die

die Wurzeln der Pflanzen ab. Man tödte ihn durch ungelöschten Kalk oder Kalkwasser" *). Das Mittel so den Wurm tödten solle, wäre also der Kalk, oder das Kalkwasser, es ist aber zu kostbar, und wer würde es, wenn man den Schaden auf den Saamenfeldern bemerkte, ohne größeren Schaden anzurichten, anbringen **)? Es ist alles bald gesagt, aber nicht gleich gethan. Nun noch etwas von den Raupen: Es giebt Kohl- und Baum-

*) s. Kurzer, doch gründlicher Begriff des gesammten Feldbaues ꝛc. Stutgard, 1764. pag. 82. lit. a.

**) Wenn Kalkwasser ein Mittel wider den Wurmfraß ist, so ist dessen Anwendung leichter als irgend eine andere. Man bringt nehmlich kurz vor einem Regen einige Säcke voll zermalmten frischgebrannten Kalk oder Kalkasche auf die Felder, streuet den Kalk ganz dünne, gleich dem Gyps, aus, und erwartet den Regen. Das Regenwasser löset den Kalk, seiner Eigenschaft gemäß auf, und formiret dadurch das sogenannte Kalkwasser, welches, sollte es auch nicht zur Vertilgung der Würmer dienen, dennoch allezeit, weil es den mehresten Gewächsen als Nahrungsmittel angenehm ist, die Auslagen reichlich vergütet.

raupen, beyde Gattungen sind von zweyerley Arten; nehmlich hellgrüne, kleine, ohne Haare, auf Bäumen und Kohl sich aufhaltend, diesen stellen die Vögel sehr nach, und größere, haarichte, grünlichte auf dem Kohl, und braune größere auf den Bäumen, welche kaum irgend ein Vogel wegnimmt. Jene, die kleinen hellgrünen Raupen, schaden an den Bäumen und Kohl am allermeisten; durch sie gehet Blatt und Blüthe dahin, und den Kohl füllen sie, indem sie ihn abnagen, mit Koth. Man kann die großen Baumraupen gar leicht vertilgen. Sie wissen meinen großen Baumgarten, der beynahe 1300 Bäume enthält; alle Jahre finde ich in dem Frühling diese Raupen in Menge auf meinen Bäumen. So bald sie halb ausgewachsen sind, komme ich mit einem Stock etliche Morgen, ehe noch die Sonne recht warm scheinet, an jeden Baum hin, und da bemerke ich sie alle beysammen an einem dicken Ast, gemeiniglich aber oben an dem Stamm gelagert, und zerquetsche sie alle mit dem Stock sehr leicht. In weniger als 8 Tagen ist mein ganzer Garten von ihnen gereiniget. Mit der haarichten Kohlraupe aber ist es

frey-

freylich wieder was anders, sie schadet mehr, und ist schwerer zu vertilgen, sie abzulesen ist mühsam, beynahe unmöglich, und ein anderes Mittel ist doch kaum noch bekannt*). Ich habe gegen ihre Verwüstungen allerhand versucht, Feuer, Dampf, Kalk, Asche wider sie gebraucht, allein bey allem gieng ihr Fraß fort. Ich ließ an mehreren heißen Tagen, zu Mittage, alle meine Bäume durch mehrere Personen heftig schütteln, dadurch gewann ich so viel, daß sie haufenweis und beynahe alle herabstürzten, doch fielen auch viele Blütknospen; Verlust, doch mehr Gewinn, dachte ich als Verlust. Rings um am Baume lagen meine Feinde, ich ließ sie zertreten, mit einem Besen zerschlagen, man tödtete sie, wie man nur konnte; kaum war man von dem abgeschüttelten Baum hinweg, so schlichen sich die noch lebenden auf allen Seiten zum Stamm des Baumes wieder eiligst hinauf, und alle davon abzuhalten war nicht in meinem Vermögen **).

*) In Gemüsegärten verlohnet es sich allerdings, daß man die Raupen, besser noch, die Eyer, ehe sie ausschliefen aufsuchen, tödten und zerquetschen läßt.

**) Wenn man den Stamm, noch ehe sie zurückgehen rund um, ein paar Hände breit, mit Theer, Vogelleim oder Terpentin bestreichet, so bleiben sie hängen, können nicht weiter und krepiren.

Vom Flachsbau und von der Zubereitung des Flachses.

Der Flachs ist eine zur Bequemlichkeit der Menschen nothwendige Sache. Das Land meiner Wohnung, wo doch die Landleute in dem meisten der Landwirthschaft andern noch vorgehen, und als Beyspiel angesehen zu werden verdienen, stehet hierinnen andern noch nach *). Der Wunsch, mich selbst in der rechten Behandlung desselben zu unterrichten, veranlaßte mich, von einem Freund mir den rechten Unterricht zu erbitten. Diesen nun lege ich nach dem Original mit einigen Zusätzen im Zusammenhang vor.

Nachricht wie der Flachsbau auf dem Estorfischen Gute Versen bey Uelzen im Herzogthum Lüneburg behandelt, der Flachs präparirt und in der Folge genutzt wird.

1) Vom Leinsaamen und der Saatzeit.

Man erhandelt den besten Saamen aus Lief-

*) Seit mehreren Jahren ist der Flachsbau auf der Kupferzeller Ebene, gegen die vergangene Zeiten gerechnet, sehr beträchtlich.

Liefland, welcher von Riga in Liefland gesandt wird *), (der kleinkörnichte und ins Gelbe fallende ist der beste) reiniget ihn, wenn er auch schon für reinen Saamen geliefert worden ist, sorgfältig, vorzüglich von dem sogenannten Dotter, durch verschiedene Siebe und bewahrt ihn an einem trocknen Orte. Weil man in hiesiger Gegend früh Flachs bauet, der zu Ende Julii oder Anfangs Augusti gezogen wird; so wird solcher gegen den 10ten May gesäet. Man meidet hiebey die gar zu nasse Witterung, so wie die Nässe des Ackers, indem ein starker Regen das Land bindet und dadurch den guten Auflauf hindert; und sollte gar nach der Besäung ein Platzregen fallen, so läßt man durch eine eiserne Egge den Acker aufeggen. Auf einen Acker, so 1 Himbten Roggensaamen hält, säet man 1 1/2 Himbten Leinsaamen.

2) Von der Zubereitung des Landes. Zum Flachsbau wird gutes, nicht gar zu

 nasses,

*) Daß selbst gezogener, oder in der Nähe erkaufter, 3, 4, auch mehrere Jahre, alter Saame eben so gut als der Rigaer sey, dieß ist nunmehro längst entschieden.

nasses, mit Leimen vermischtes Land gewählt*), und je öfter der Acker dazu umgebrochen ist, desto besser ist es, wenn es auch inclusive der Besämung 5 mal geschiehet **). In hiesiger Gegend geschiehet die Beackerung mittelst des sogenannten Haackens, welcher durch zwey Ochsen gezogen wird, das Land mürber als der Pflug macht, in schweren Boden aber selten gebraucht werden kann, das Land wird, so es möglich, vorhergehenden Sommer zweymal um-

*) Ein Erdreich von 25, 30 bis 40 Procent auflösbarer Erde ist das beste, er wächst in solchem 4, 5 Schuh hoch auf. Will man ihn von feinem Beste, und dennoch hoch haben, so mähet man ihn in dergleichen Erdreich, bey feuchter Witterung, wenn er handhoch gewachsen ist, bis auf 1 Zoll hoch ab, und jeder Halm setzt etliche Zweige an, die hoch wachsen, zarten Bast und vielen Saamen geben. Ich bauete im verflossenen Jahr, auf einem Feld das 36 Procent entsprach, den schönsten Flachs, von 5 1/2 Schu Höhe, der Flachs war aber etwas grob. Will man ihn feiner haben, so säet man ihn dichter, und schneidet ihn, wie gesagt, ab.

**) Eine sehr wichtige Regel.

umgeackert, und jedesmal scharf geeget, im Herbst geschiehet die Düngung, und wird nach Befinden des Ackers Schaaf- oder Kuhdünger, auch Strassen- oder Teicherde angewandt *), welcher Dünger denn so fort untergepflüget wird, im Frühjahr wird also zum 4ten und mit der Bestellung im Anfange des May, der Acker zum 5ten mal umgebrochen, gesäet und geegt.

Vom Aufgehen und Gähten des Saamens. Hierbey dienet zu wissen, daß alter Saame früher als neuer lauft †). Nach Maaßgabe gelinder und warmer Witterung lauft er früh oder spat, gemeiniglich der alte Saame im 9ten, der neue wohl erst im 12ten oder 14ten Tag. Wenn der Saame seine gehörige

*) Auf Feldern von 6 bis 20 Procent ist Schaafmist, auf Feldern von 25 bis 30 Procent Kuhmist, und auf Feldern von 1, 6 bis 30 Procent kalkartiger Teichschlam, am vortheilhaftesten angewendet.

†) Anmerk. Daß alter Saame eher als der jüngere aufgehe, weiß ich nicht, man hat mir das Gegentheil gesagt.

Mayer.

hörige Reife nicht erlangt, oder auch wohl vermischt ist, so entstehet daraus ein Flachs der theils kurz, theils lang ist, und nach hiesiger Mundart zweyläufig genannt wird; jedoch kann auch dieses daher rühren, wenn entweder zu dicht gesäet, oder das Land schlecht bearbeitet worden ist. Wenn der Flachs gut 6 Zoll hoch ist, so suchet man denselben vom Unkraut zu reinigen, welches Gähten oder Wuthen genannt wird, wobey zu observiren, daß der Boden nicht zu trocken seyn muß, weil sonst das Unkraut abreisset und die Wurzel in der Erde bleibt, mithin wählet man gemeiniglich den Tag nach einem Regen dazu. Eine abwechselnde Witterung, von Nässe und Wärme, ist dem Flachs, gleich allen Pflanzen, am zuträglichsten; gar zu starke Dürre hindert dem Wachsthum und bewirket dasjenige, was man hier verbomt oder verbrannt nennt, so den Flachs roth werden läßt.

4) Von Kenntniß der Reife des Flachses. Ob man sich zwar in diesem Punkt an verschiedenen Orten nach der Wochenzahl gerichtet, indem man dafür hält, daß nach Verlauf von 12 Wochen, nach Ausstreuung

des

des Saamens, der Flachs wieder gezogen werden kann, so ist doch solches irrig, denn wenn der Stengel gerade stehet, so muß die Farbe, wenn der Flachs, und besonders der Saame reif ist, gelblich seyn; ist er noch grün, so ist es eine Anzeige, daß er noch nicht reif ist; wenn aber der Flachs sich gelegt hat, so ist dieses nicht abzuwarten, indem er sonst auf dem Lande zu trocken wird, und alsdenn in der Verarbeitung entzwey bricht. Von solchem Flachs, der sich gelegt, also nicht seine wahre Reife hat, kann man keinen guten Flachs erwarten, und dessen Saame ist nicht zur Aussaat tauglich. Das legen des Flachses zu verhindern, ist gut, den Saamen sparsam, nicht zu dick, zu säen, man hat angerathen, von Schuh zu Schuh, vor dem Aufkeimen, dünnes Reißig von Laubholz auf dem Acker zu stecken, und das Umfallen bey starken Regen dadurch zu verhindern. Mir hielt es Probe.

5) Vom Aufziehen des Flachses. Wenn der Flachs zu seiner Reife gekommen, wird er ausgezogen, in doppelte Strohseile gebunden, (wenn der Flachs gut gerathen, rech-

net man dieser Bunde ohngefähr auf einen Himbten Einfall 40, 50 Bund,) und ist die Länge eines sehr guten Flachsstengels 3, 4 Fuß zu rechnen, dann eingefahren, abgerapt, (gerissfelt,) und alsdenn in ein einfaches Stroh, zu sogenannten Wasserboten, (starke Hände voll Flachs, die mit ein paar Halmen Flachs nicht feste umwunden werden,) gebunden, und gleich ins Wasser gebracht, wobey zu beobachten, daß wenn der Flachs von Lande gefahren, er nicht lange in dem Rautboden liegen muß, damit er sich nicht brenne, auch muß er nach dem Abrappen nicht liegen, damit er nicht trocknet, welches dem Flachs schädlich ist, wie denn auch Rücksicht zu nehmen, daß das Abrappen der Saamenballen nicht bey Nachtzeit geschehe, um die Arbeit besser observiren zu können, auch die Leute nicht zu große Hände voll nehmen, weil sonst zu viel zerrissen wird.

6) Von dem Rothen des Flachses. Die Beschaffenheit einer Flachsrothe, (das Loch) in welches der Flachs zum rothen oder rösten geleget wird,) ist, daß man dahin Rücksicht nimmt, daß das Wasser stehend, jedoch nicht

unrein

unrein oder Schlammicht sey, weshalb eine solche Flachsrothe zuvor wohl ausgeschlagen, und rein gemacht werden muß. Liegt der Flachs im Wasser, so muß er mit Leitern, worauf Steine und schweres Holz gelegt werden kann, bedeckt seyn, damit das Wasser wohl über ihn stehe. Das Nothwendigste beym Rothen ist: 1) daß man das Loch neben einem Bach habe, von welchem aus es sich unterirdisch füllt, 2) daß das Wasser nicht kothig werde, 3) daß man den Flachs in kleinen Bündeln kreutzweis einlege, damit das Wasser, durch Hülfe der Zwischenräume, überall wohl ein- und durchdringen könne, und 4) daß das Loch wo möglich an der Sonne, damit das Wasser immer warm bleibe, liege. Der Gebrauch, den Flachs mit Erdschnollen und Gesträuchen, zu bedecken, ist schädlich, macht ihn unrein und schwarz. Der Frühflachs ist feiner, weil zu seiner Rothezeit das Wasser noch wärmer ist als im Herbst, da allererst der späte Flachs gerothet werden kann.

7) Von der Kenntniß, ob der Flachs genugsam gerothet. Die Zeit

des Rothens ist unbestimmt, und läßt sich nicht auf 5 bis 6 Tage, wie an einigen Orten gebräuchlich ist, festsetzen, sondern die eigentlichen Kennzeichen sind: daß man ihn nach 3 oder 4 Tagen probiret, dieß muß nach drey Tagen alle Tage darnach versucht werden, damit der Flachs nicht versäumet wird, verrostet, oder welches eben so viel ist, damit das Bast nicht verfaulet. Je wärmer die Nächte sind, je wärmer ist das Wasser, je eher erfolgt das Rothen; das Kennzeichen, ob der Flachs genug gerothet habe, ist dieses: wenn der Stengel entzwey gebrochen wird, und die Schären sich alsdenn selbst durch das Bast stossen. Ist der Flachs wohl und rein ausgewaschen, so nimmt man ihn aus dem Loch, wäscht ihn in reinem Wasser wohl aus, löset jedes Bündchen vom Band auf und loß, stellt den Flachs aufrecht, handvollweis auf freyem Felde, an die Sonne, gegen einander liegend häufgenweis auf, oder welches noch besser ist, man schlägt hin und her einige Hölzer oder Stückel ein, bindet an solche hölzerne Stangen und leget den Flachs wohl ausgebreitet, daß die Sonne, Luft, Wind und Regen wohl durchgehen, oder durchfallen könne,

an

an dieselben an; wenn er in dieser Verfassung wohl beynahe 14 Tage gelegen, so lege man den Flachs nun auf diese Art hin, daß die äußere Seite, bey der Aufstellung des Flachses, nun auf die Erde zu liegen komme, damit die inwendige Seite auch gebleicht werde, wodurch er denn noch mehrere Geschmeidigkeit erhält, welches denn dem Uelzer Flachs, so auf diese Art gebleichet wird, den Vorzug giebt. Wenn nun nach 10, 12 Tagen, welches sich nach der Witterung richtet, denn regnet es viel, so kann auch hier noch Schaden geschehen, das Bast verfaulet, und aus dieser Ursache muß man wohl acht haben, ob der Flachs Fasern bekommt, kurz, wenn er zwischen den Fingern gerieben wird und wohl bricht, so wird er aufgebunden, nach Hause gefahren, abgeladen und sortirt; nehmlich der lange vom kurzen, und in ein Strohseil gebunden, welches man Pochbote nennet, alsdenn wird es nach der Pochmühle gebracht, welches eine Art Stampfmühle, deren Stampfe wie die Preßstampfe in der Oehlmühle ist, von recht festen Holze, und unten ganz platt, als wovon ein solcher Pochbote auf beyden Seiten einen Stoß bekommt,

welcher ihn genug weichmachen muß. Anmerkung: In der Zubereitung des Flachses gehet man nun fast in allen Ländern von einander ab. Die Zubereitung bey uns geschiehet also: man heitzt den Backofen mäßig, feget Kohlen und Asche sehr genau aus, und schiebt sodann den Flachs handvollweis, in denselben, mittelst einer Gabel hinein, ist er vollgestampft, so wird er verschlossen, alle Oefnungen werden mit Häfnersleim wohl verstrichen, und so bleibt der Flachs 24, auch noch etliche Stunden länger liegen, dann kommen die Weibsleute mit ihren Brechstöcken zusammen, ein Mann nimmt ihn handvollweis heraus, und schlägt ihn, mittelst eines runden Holzes, auf einem hölzernen Blocke wohl durch, giebt ihn den Brecherinnen, die ihn wohl durchbrechen, wobey ihnen denn der Bast allein zurück bleibet, und die Acheln unter die Breche hinabfällen; nun wird er von der Pochmühle wieder in Grasbündel gebunden, nach Hauß gebracht und an die Sonne gesetzt, damit er recht trocknen kann. Dieses geschiehet, 1) wenn der Flachs trocken genug ist, so wird er auf dem Revellblock gerieben, zuvor aber werden aus einem Pochboten 20, 30 Risten, zu

einer

einer mäsigen Handvoll, gemacht, eine Riste wird in beyde Hände genommen, kurz gefaßt, und zwischen den Händen auf erwähnten Block gerieben, dergestalt, daß es sich etwas theilet, und die Scheren darinn loß werden, 2) alsdenn wird er geschwungen, und 2, 3 Risten in eines genommen, dann 3) auf einem mit Leder überzogenen und ausgestopften Kopf, auf den mit der einen Hand die Risten aufgelegt, und mit der andern durch ein dazu gemachtes Ribbeisen abgeribt, alsdenn wird er 4) gehechelt, welches das erstemal durch eine Braunschweigische Vorziehhechel, und das zweytemal, wenn er zuvor nochmahlen geribt, durch eine feinere Hechel geschiehet, denn in 2, 3 Sorten sortiret. Wenn der Flachs sehr gut geräth, so muß ein Himbten kein 5 Stein wohlpräparirten Flachses geben.

8) Von den abgereppten Knoten oder Samenbollen. Wenn die Knoten abgereppt sind, so werden solche ausgeharkt, d. i. mit dem Rechen vom groben Unrath gereiniget, in Haufen gebracht, gewurft und vom Unkraut gereinigt. Wer denn Raum hat, läßt solche auf dem Boden trocknen, und so dünne als möglich aus-

breiten, auch alle Tage, bis sie völlig trocken sind, mit einer hölzernen Harke (Rechen) wenden. Der ausgerechte Unrath ist gut für die Kornwürmer, wenn er um die Kornhaufen geleget wird, weil sie den Geruch nicht vertragen können. Sind sie völlig trocken, so werden sie gedroschen, und der Lein von der Kapsel gereiniget, jedoch macht man dasjenige, so man auf das künftige Jahr etwa wieder zum Saamen gebrauchen will, den Herbst nicht ganz rein, sondern läßt etwas Staub dazwischen, thut es in Beutel, und hänget es in Rauch, damit es vor dem sogenannten Memelwurm und Mäusen gesichert bleibe. Derjenige Lein, so nicht wieder zum Saamen verwendet wird, wird geschlagen, und das Oehl, sowohl als die Oehlkuchen, in der Haushaltung gebraucht, auf jeden Himbten rechnet man 8 bis 9 Pfund Oehl, und 4 Kuchen, jeden ohngefehr 2 Pfund schwer.

Bayerische Staatsbibliothek München

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Rückert, Georg Christian Albrecht, 1763-1800

Der Feldbau chemisch untersucht um ihn zu seiner letzten Vollkommenheit zu erheben

Bd.: 2

Erlangen (1789)

Oecon. 2177 p-1/2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11012099-5
VD18 90259912